

THEOREMATA CIRCA DIVISORES NUMERORVM IN HAC FORMA $aa + bb$ CONTENTORVM.

In sequentibus theorematis litterae a et b designant numeros quosunque integros, primos inter se, seu, qui praeter unitatem nullum alium divisorem communem.

Theorema 1.

Numerorum in hac forma $aa + bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2, vel huius formae $4m + 1$ numeri.

Theorema 2.

Omnes numeri primi huius formae $4m + 1$ vicissim in hac numerorum formula $aa + bb$ continentur.

Theorema 3.

Summa ergo duorum quadratorum seu numerus huius formae $aa + bb$ diuidi nequit per ullum numerum huius formae $4m - 1$.

Theorema 4.

Numerorum in hac forma $aa + 2bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2, vel numeri in hac forma $8m + 1$ vel in hac $8m + 3$ contenti.

Theorema 5.

Omnes numeri primi in hac $8m + 1$ vel in hac $8m + 3$ forma contenti vicissim sunt numeri huius formae $aa + 2bb$.

Theo-

Theorema 6.

Nullus numerus huius formae $aa+2bb$ dividi potest per vllum numerum huius $8m-1$ vel huius $8m-3$ formae.

Theorema 7.

Numerorum in hac forma $aa+3bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2 vel 3, vel in vna harum formularum $12m+1$, $12m+7$ contenti.

Theorema 8.

Omnis numeri primi in alterutra harum formularum $12m+1$, vel $12m+7$ sive in hac vna $6m+1$ contenti simul sunt numeri huius formae $aa+3bb$.

Theorema 9.

Nullus numerus sive huius $12m-1$ sive huius $12m-7$ formulae, hoc est nullus numerus huius formae $6m-1$ est divisor vllius numeri in hac forma $aa+3bb$ contenti.

Theorema 10.

Numerorum in hac forma $aa+5bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2, vel 5 vel in vna harum 4 formularum $20m+1$, $20m+3$, $20m+7$, $20m+9$ contenti.

Theorema 11.

Si fuerint numeri $20m+1$, $20m+3$, $20m+9$, $20m+7$ primi, tum erit vt sequitur
 $20m+1 = aa+5bb$; $2(20m+3) = aa+5bb$
 $20m+9 = aa+5bb$; $2(20m+7) = aa+5bb$

Theo-

Nullus
20m-
visorNumeri
primi
formul28
28
28

funt cc

Si fueri
14m-
+ 7 tNullus
vllum

28

28

28

contine

Numeri
Tom

Theorema 12.

Nullus numerus in vna sequentium formularum contentus
 $20m - 1$; $20m - 3$; $20m - 9$; $20m - 7$ potest esse di-
 visor vllius numeri huius formae $aa + 5bb$.

Theorema 13.

Numerorum in hac forma $aa + 7bb$ contentorum divisores
 primi omnes sunt vel 2 vel 7 vel in vna sequentium sex
 formularum

$28m + 1$	$28m + 11$	$14m + 1$
$28m + 9$	$28m + 15$	$14m + 9$
$28m + 25$	$28m + 23$	$14m + 11$

sunt contenti.

seu in vna harum trium

Theorema 14.

Si fuerint numeri in istis formulis $14m + 1$, $14m + 9$,
 $14m + 11$ contenti primi, tum simul in hac forma aa
 $+ 7bb$ continentur.

Theorema 15.

Nullus numerus huius formae $aa + 7bb$ potest diuidi per
 vllum numerum, qui in vna sequentium sex formularum

$28m + 3$, $28m + 5$	$14m + 3$	seu harum trium
$28m + 13$, $28m + 17$	$14m + 5$	
$28m + 19$, $28m + 27$	$14m + 13$	

contineatur.

Theorema 16.

Numerorum in hac forma $aa + 11bb$ contentorum
 Tom. XIV. V omnes

154 THEOR. CIRCA DIVISORES NUMER. cclv

omnes diuisores primi sunt vel 2 vel 13 vel continentur in vna sequentium.

sive 10 formularum	sive 5 formularum
$44m + 1$	$44m + 3$
$44m + 9$	$44m + 27$
$44m + 37$	$44m + 23$
$44m + 25$	$44m + 31$
$44m + 5$	$44m + 15$
	$22m + 1$
	$22m + 3$
	$22m + 9$
	$22m + 5$
	$22m + 15$

Theorema 17.

Sii fuerint numeri in his sive decem sive quinque formulis contenti primi, tum simul erunt vel ipsi vel eorum quadruplici numeri huius formae $aa + 11bb$.

Theorema 18.

Nullus numerus huius formae $aa + 11bb$ potest diuidi per vnum numerum, qui continetur in vna sequentium

sive 10 formularum	sive 5 formularum
$44m + 7$, $44m + 29$	$22m + 7$
$44m + 13$, $44m + 35$	$22m + 13$
$44m + 17$, $44m + 39$	$22m + 17$
$44m + 19$, $44m + 41$	$22m + 19$
$44m + 21$, $44m + 43$	$22m + 21$

Theorema 19.

Numerorum in hac forma $aa + 13bb$ contentorum omnes diuisores primi sunt vel 2 vel 13 vel continentur in vna sequentium 12 formularum.

52 m

THE

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

$52m + 1$	$52m + 7$
$52m + 49$	$52m + 31$
$52m + 9$	$52m + 11$
$52m + 25$	$52m + 19$
$52m + 29$	$52m + 47$
$52m + 17$	$52m + 15$

Theorema 20.

Omnis numeri primi, qui in priori formularum istarum columnna continentur, simul sunt numeri huius formae $aa + 13bb$. Numerorum autem primorum, qui in altera formularum columnna continentur, dupla sunt numeri formae $aa + 13bb$.

Theorema 21.

Nullus numerus huius formae $aa + 13bb$ diuidi potest per vllum numerum, qui continetur in vna sequentium formularum.

$52m + 13$	$52m + 35$
$52m + 5$	$52m + 37$
$52m + 21$	$52m + 41$
$52m + 23$	$52m + 43$
$52m + 27$	$52m + 45$
$52m + 33$	$52m + 51$

Theorema 22.

Numerorum in hac forma $aa + 17bb$ contentorum omnes divisores primi sunt vel 2 vel 17 vel in vna sequentia formularum continentur.

$68m + 1$	$68m + 3$
$68m + 9$	$68m + 27$
$68m + 13$	$68m + 39$
$68m + 49$	$68m + 11$
$68m + 33$	$68m + 31$
$68m + 25$	$68m + 7$
$68m + 21$	$68m + 63$
$68m + 53$	$68m + 23$

Names
di
in vna

76

Theorema 23.

Omnis numeri primi, qui in priori harum formularum columnna continentur ad, quos 2 referri debet, sunt formae $aa + 17bb$ vel ipsi quidem vel eorum noncupla. Numerorum autem primorum in altera columna contentorum tripla sunt numeri formae $aa + 17bb$.

Theorema 24.

Nullus numerus huius formae $aa+17bb$ dividendi potest per illum numerum, qui contineatur in aliqua sequentia formularum.

Omn tinenti ius fo

68m- 1	68m- 3
68m- 9	68m-27
68m-13	68m-39
68m-49	68m-11
68m-33	68m-31
68m-25	68m- 7
68m-21	68m-63
68m-53	68m-23

Nullu
per v
o for

Theo-

Theorema 25.

Numerorum in hac forma $aa + 19bb$ contentorum omnes diuisores primi sunt vel 2, vel 19, vel continentur in vna sequentium

18 formularum		vel harum 9
$76m + 1$	$76m + 5$	$38m + 1$
$76m + 25$	$76m + 49$	$38m + 5$
$76m + 37$	$76m + 9$	$38m + 7$
$76m + 45$	$76m + 73$	$38m + 9$
$76m + 61$	$76m + 7$	$38m + 11$
$76m + 35$	$76m + 23$	$38m + 17$
$76m + 39$	$76m + 43$	$38m + 23$
$76m + 63$	$76m + 11$	$38m + 25$
$76m + 55$	$76m + 47$	$38m + 35$

Theorema 26.

Omnis numeri primi, qui in vna harum formularum continentur, sunt vel ipsi, vel saltem quater sumati numeri huius formae $aa + 19bb$.

Theorema 27.

Nullus numerus huius formae $aa + 19bb$ dividiri potest per vllum numerum, qui continetur in aliqua sequentium 9 formularum

$38m - 1$
$38m - 5$
$38m - 7$
$39m - 9$
$38m - 11$

V 3

38m

§8 THEOR. CIRCA DIVISORES NUMER. cet.

 $38m - 17$ $38m - 23$ $38m - 25$ $38m - 35$ Numero
 bb con-
vel in

His igitur theorematis continetur indeoles formularum $aa + qbb$, si q fuerit numerus primus, ac primum quidem vidimus omnes divisores primos huiusmodi formularum esse vel 2 vel q , vel in talibus expressionibus $4qm + \alpha$ ita comprehendi posse, vt nullus divisor in iis non contineatur, tum vero, vt omnis numerus primus $4qm + \alpha$ simul sit divisor formulae cuiusdam $aa + qbb$. Deinde etiam hoc colligere licet, si numerus primus formae $4qm + \alpha$ fuerit divisor cuiusquam numeri $aa + qbb$, tum nullum numerum formae $4qm + \alpha$ divisorum esse posse eiusdem expressionis $aa + qbb$. Cum igitur inter formas divisorum formulae $aa + qbb$ semper contineatur haec $4mq + 1$, manifestum est, nullum numerum $aa + qbb$ dividi posse per yllum numerum formae $4mq + 1$. Denique attendenti manifestum fiet, si q fuerit numerus primus formae $4n + 1$, tum divisorum formas ad numerum duplo minorem redigi posse, ita vt ad formulas $2qm + \alpha$ reuocari queant, quod fieri nequit, si q sit numerus primus formae $4n + 1$. Si igitur pro hac forma $aa + (4n + 1)bb$ divisor fuerit $4(4n + 1)m + \alpha$, tum nullus numerus formae istius $4(4n + 1)m + 2(4n + 1) + \alpha$ poterit esse divisor eiusdem expressionis $aa + (4n + 1)bb$. Plures annotationes faciemus, cum etiam formulas $aa + qbb$, quando q non est numerus primus, fuerimus contemplati.

Omnes
continer-
istam fi-
pressionNullus
potest
rum. scNumeri
5bb c
5 vel

Theo-

Theorema 28.

Numerorum in hac forma $aa + 6bb$, vel hac $2aa + 3bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2 vel 3 vel in vna sequentium formularum continentur

$$\begin{array}{ll} 24m+1 & 24m+7 \\ 24m+5 & 24m+11 \end{array}$$

Theorema 29.

Omnis numeri primi formae vel $24m+1$ vel $24m+7$ continentur in expressione $aa + 6bb$; at numeri primi istam formam $24m+5$ et $24m+11$ continentur in expressione $2aa + 3bb$.

Theorema 30.

Nullus numerus sive $aa + 6bb$ sive $2aa + 3bb$ dividitur per nullum numerum, qui contineatur in aliqua harum formularum

$$\begin{array}{ll} 24m-1 & 24m-5 \\ 24m-7 & 24m-11 \end{array}$$

Theorema 31.

Numerorum in hac $aa + 10bb$ vel hac forma $2aa + 5bb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2 vel 5 vel in vna sequentium formularum continentur

$$\begin{array}{ll} 40m+1 & 40m+7 \\ 40m+9 & 40m+23 \\ 40m+11 & 40m+37 \\ 40m+19 & 40m+13 \end{array}$$

Theo-

Theorema 32.

Numeri primi in priori harum formularum columnna contenti simul sunt numeri huius formae $aa + 10bb$ et numeri primi in altera columnna contenti sunt numeri huius formae $2aa + 5bb$

Theorema 33.

Nullus numerus sive huius $aa + 10bb$, sive huius $2aa + 5bb$ formae diuidi potest per vnum numerum, qui in aliqua sequentium formularum contineatur.

$40m - 1$	$40m - 7$
$40m - 9$	$40m - 23$
$40m - 11$	$40m - 37$
$40m - 19$	$40m - 13$

Theorema 34.

Numerorum in hac $aa + 14bb$ vel hac $2aa + 7bb$ forma contentorum divisores primi omnes sunt vel 2 vel 7 vel in vna sequentium formularum continentur

$56m + 1$	$56m + 3$
$56m + 9$	$56m + 27$
$56m + 25$	$56m + 19$
$56m + 15$	$56m + 5$
$56m + 23$	$56m + 45$
$56m + 39$	$66m + 13$

Theorema. 35.

Numeri primi in priori harum formularum columnna contenti simul sunt numeri vel huius $aa + 14bb$ vel $2aa$

+ 7

Tom

+ 7bb formae, quae autem in altera columnna continentur, eorum tripla demum in altera istarum formularum comprehenduntur; sicut in uno istius capituli proposito.

Theorema 36.

Si in superioribus $a^2 + 7bb$ gena, et in $-$ continentur, tum nullus numerus in ipsis formulis contentus, quare et vel formae $aa + 14bb$ vel $2aa + 7bb$.

Theorema 37.

Numerorum in hac $aa + 15bb$ vel hac $3aa + 5bb$ forma contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2, vel 3 vel 5, vel in una sequentium formularum continentur.

$60m + 1$	$60m + 11$	$60m + 19$	vel harum 4
$60m + 17$	$60m + 47$	$60m + 17$	
$60m + 49$	$60m + 49$	$60m + 19$	
$60m + 23$	$60m + 53$	$60m + 23$	

Theorema 38.

Numerorum in hac $aa + 21bb$, vel hac $3aa + 7bb$ forma contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2, vel 3 vel 7, vel in una sequentium formularum continentur.

$84m + 1$	$84m + 5$	
$84m + 25$	$84m + 41$	
$84m + 37$	$84m + 17$	
$84m + 55$	$84m + 11$	
$84m + 31$	$84m + 23$	
$84m + 19$	$84m + 71$	

Theorema 39.

Numerorum in hac $aa + 35bb$ vel $5aa + 7bb$ forma contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2, vel 5 vel 7, vel in vna sequentium formularum continentur.

	vel harum
$140m + 3$,	$70m + 1$
$140m + 9$,	$70m + 3$
$140m + 21$,	$70m + 9$
$140m + 29$,	$70m + 11$
$140m + 121$,	$70m + 13$
$140m + 109$,	$70m + 17$
$140m + 11$,	$70m + 27$
$140m + 99$,	$70m + 29$
$140m + 51$,	$70m + 33$
$140m + 39$,	$70m + 39$
$140m + 71$,	$70m + 47$
$140m + 79$,	$70m + 51$

Theorema 40.

Numerorum in aliqua harum formularum contentorum

$$aa + 30bb, 2aa + 15bb$$

$$3aa + 10bb, 5aa + 6bb$$

diuisores primi omnes sunt vel 2, vel 3, vel 5, vel in vna sequentium formularum continentur.

$120m + 1$;	$120m + 11$
$120m + 13$;	$120m + 23$
$120m + 49$;	$120m + 59$
$120m + 37$;	$120m + 47$

Theorema
mandas
cum p

Formul
mul di
tio facil
pia +
hoc est
sufficiet
quae ra

Inter m
mula "a
binarius.
a et b
divisibili
mula qu
merus T
visor fo
perspicui

Reliqui
istiusmor

$120m + 17$	$120m + 67$
$120m + 101$	$120m + 31$
$120m + 113$	$120m + 43$
$120m + 29$	$120m + 79$

Theorematā haec sufficient ad sequentes annotationes formandas, ex quibus natura diuisorum huiusmodi formulaū $paa+qbb$ penitus perspicietur.

Annotatio 1.

Formula $paa+qbb$ nullum habet diuisorem, quia sit simul diuisor formulae $aa+pqbb$. Cuius quidem rei ratio facile patet; nam qui numerus est diuisor formulae $paa+qbb$, idem diuidet hanc formam $ppaa+pqbb$, hoc est hanc $aa+pqbb$, posito a loco $p a$. Hancobrem sufficiet istam unicam formam $aa+Nbb$ considerasse, quippe quae ratione diuisorum hanc $paa+qbb$ in se complectitur.

Annotatio 2.

Inter numeros primos, qui ullum numerum in hac formula $aa+Nbb$ contentum diuidunt, primū occurrit binarius. Si enim N sit numerus impar, sumendis pro a et b numeris imparibus, formula $aa+Nbb$ fiet per 2 diuisibilis; at si N sit numerus par, sumto a pari, formula quoque per 2 fit diuisibilis. Deinde vero ipse numerus N vel quaelibet eius pars aliqua poterit esse diuisor formulae $aa+Nbb$, quod sumendo $a = N$ est perspicuum.

Annotatio 3.

Reliqui diuisores primi omnes formulae $aa+Nbb$ in istiusmodi expressionibus $4Nm+\alpha$ comprehendī possunt

X 2 ita,

ita, ut etiam vicissim omnes numeri primi in formis istis
 $4Nm + \alpha$ contenti simul sint diuisores formulae $\alpha a + Nbb$. Praeterea si expressio $4Nm + \alpha$ praebeat diuisores formulae $\alpha a + Nbb$, tum nullus numerus huiusmodi
 $4Nm - \alpha$ poterit esse diuisor ullius numeri in formula $\alpha a + Nbb$ contenti.

Annotation 4.

Habebit autem α certos quosdam valores, qui ab in-dole numeri N pendebunt; ac semper quidem vnitas erit vnuis ex valoribus ipsius. Tum vero, quia de numeris pri-mis in formula $4Nm + \alpha$ contentis quaestio est, perspicuum est neque ullum numerum parem, neque ullum num-erum, qui cum N communem habeat diuisorem, valorem ipsius α constitui posse.

Annotatio. 5.

Valores autem ipsius & omnes erunt minores quam $4N$, si enim qui essent maiores, per diminutionem numeri m minores, quam $4N$, reddi possent. Hinc valores ipsius & erunt numeri impares minores, quam $4N$, atque ad N primi. Neque vero omnes istiusmodi numeri impares ad N primi idoneos pro & valores exhibebunt, sed eorum semissis ab hoc officio excluditur, quoniam, si x fuerit valor ipsius α , tum $-x$ seu $4N-x$ eius valor esse nequit; vicissimque si x non fuerit valor ipsius α , tum $4N-x$ certo eius valor sit futurus.

Annotatio 6.

Numerus igitur valorum ipsius α , ita ut $4Nm + \alpha$ contineat omnes diuisores primos formulae $aa + Nbb$, sequenti modo definitur. Sunt p_1, q_1, r_1, s_1 , cet. numeri primi

*Intelligit
xx (qui
no pote*

primi inter se diuersi, excepto binario, qui seorsim est considerandus; atque

si fuerit	erit valorum ipsius α numerus
$N = 1$	1
$N = 2$	2
$N = p$	$p - 1$
$N = 2p$	$2(p - 1)$
$N = pq$	$(p - 1)(q - 1)$
$N = 2pq$	$2(p - 1)(q - 1)$
$N = pqr$	$(p - 1)(q - 1)(r - 1)$
$N = 2pqr$	$2(p - 1)(q - 1)(r - 1)$
	etc.

Annotatio 7.

Quemadmodum autem unitas semper repetitur inter valores ipsius α , ita etiam cuius numerus quadratus impar et primus ad N locum habere debet in valoribus ipsius α . Posito enim b numero pari $2c$, formula fiet $\alpha\alpha + 4Ncc$, quae, si sit numerus primus, contineri debet in expressione $4Nm + a$. Ergo a erit $\alpha\alpha$ vel residuum, quod ex divisione ipsius $\alpha\alpha$ per $4N$ remanet. Similiter inter valores ipsius α reperiri debent omnes numeri $\alpha\alpha + N$, vel quae ex eorum per $4N$ divisione supererunt residua; posito enim $b = 2c + 1$ fiet $\alpha\alpha + Nb^2 = \alpha\alpha + N + 4N(cc + c)$, qui, si fuerit numerus primus, debet $\alpha\alpha + N$ esse valor ipsius α .

Annotatio 8.

Intelligitur etiam, si x fuerit valor ipsius α , tum quoque xx (quod quidem ex praecedente patet) et omnes omnia potestates ipsius x , puta x^n inter valores ipsius α locum

166 THEOR. CIRCA DIVISORES NVMER. cet.

cum habere debere. Deinde, si praeter x quoque y fuerit valor ipsius α , tum quoque xy et generaliter $x^m y^n$ dabit quoque valorem ipsius α . Scilicet si $x^m y^n$ maius fuerit quam $4N$, per hoc diuidatur et residuum erit valor ipsius α . Simili modo, si insuper z fuerit valor ipsius α , tum etiam $x^m y^n z^s$ erit valor ipsius α . Hincque ex cognito uno vel aliquot valoribus ipsius α facili negotio omnes omnino eius valores inueniuntur.

Annotatio 9.

Sit x quicunque numerus primus ad $4N$, eoque minor, atque vel $+x$ vel $-x$ valor erit ipsius α . Si igitur fuerit x numerus primus, ex sequenti tabula intelligetur, quibus casibus $+x$, quibusque $-x$ valorem ipsius α praebeat

Si	erit
$N = \frac{3n+1}{n+}$	$\alpha = +3$
$N = \frac{3n+4}{n+}$	$\alpha = -5$
$N = \frac{3n+2}{n+}$	$\alpha = -5$
$N = \frac{3n+1}{n+}$	$\alpha = +5$
$N = \frac{3n+5}{n+}$	$\alpha = +7$
$N = \frac{3n+1}{n+}$	$\alpha = -7$
$N = \left\{ \begin{array}{l} 3n+2 \\ 3n+6 \\ 3n+8 \end{array} \right.$	$\alpha = +11$
$N = \left\{ \begin{array}{l} 3n+10 \\ 3n+12 \\ 3n+14 \\ 3n+16 \end{array} \right.$	$\alpha = -11$

Si propositus sit numerus quicunque primus, qui utrum signo $+$ an $-$ affectus valorem ipsius α praebeat, ita investigabitur. Bini casus debent evoluiri, alter, quo propositus numerus primus est formae $4u+1$, alter, quo est formae $4u-1$. Priori casu erit $\alpha = + (4u+1)$ si fuerit $N = (4u+1)n+tt$, at $\alpha = - (4u+1)$, si fuerit $N = (4u+1)n+tt$. Posteriori casu autem erit $\alpha = + (4u-1)$ si sit $N = (4u-1)n+tt$ at $\alpha = - (4u-1)$ si $N = (4u-1)n+tt$.

Vbi

Vbi notandum est, quemadmodum signum = aequalitatem denotat; ita signum = aequalitatis impossibilitatem designate. Quod si autem fuerit pro utroque calu $N = (4u \pm 1)n + s$, erit quoque $N = (4u \pm 1)n + s'$, denotante s' numerum quemcunque integrum, unde ista tabella pro quibusvis numeris primis signe negotio construitur.

Annotatio IO.

Quoniam inter formas divisorum primorum ipsius $aa + Nbb$ habetur $4Nm + 1$, eadem expressio $aa + Nbb$ per nullum numerum diuidi poterit, qui contineatur in hac forma $4Nm - 1$. Simili modo cum $4Nm + tt$ exhibeat formam divisorum expressionis $aa + Nbb$, sequitur nullum numerum huiusmodi $4Nm - tt$ posse esse divisorum ullius numeri in hac forma $aa + Nbb$ contenti, si quidem quod semper pono a et b sint numeri inter se primi. Hanc ob rem impossibilis erit ista aequatio $(4Nm - tt)u = aa + Nbb$, ideoque erit $4Nm u - ttu - Nbb = aa$, si quidem fuerint $4Nm u - ttu$ et Nbb numeri inter se primi, quod cum certo eueniat, si $b = 1$ et $t = 1$, nanciscimur istud.

Consecutarium.

Nullus numerus hac formula $4abc - b - c$ contentus unquam esse potest quadratus.

Annotatio II.

Si fuerit N numerus huius formae $4n - 1$, tum formae divisorum ad numerum duplo minorem rediguntur, ita ut, in formulis huiusmodi $2Nm + \alpha$ comprehendantur. Scilicet si fuerit $4Nm + \alpha$ divisorum forma, tum quoque

 $4N$

$4N + 2Nm + 2$ erit forma divisorum. Quare cum $2N$
 $m + tt$ sit forma divisorum, sequitur nullum numerum
 $2Nm + tt$ divisorum esse posse formae $aa + Nb b$. Hinc
erit $(2Nm + tt)u = aa + Nb b$, existente $N = 4n - 1$,
ynde oritur hoc.

Conjectarium.

Nullus numerus huius formae $2abb - b - c$, si vel b vel c
fuerit numerus impar $4n - 1$, unquam potest esse quadratus.

Annotatio 12.

Si fuerit N numerus impar huiusmodi $4n + 1$, vel etiam
numeris impariter par, tum divisorum formae ad nume-
rum duplo minorem redigi non possunt. Scilicet si $4N$
 $m + \alpha$ fuerit divisor formae $aa + Nb b$ tum $4Nm + 2N$
 $+ \alpha$ eiusdem formae divisor esse non poterit. Hinc $2(2$
 $m + 1)N + tt$ non erit divisor formae $aa + Nb b$, ideo-
que haec aequatio $(2(2m + 1)N + tt)u = aa + Nb b$
erit aequatio impossibilis, si quidem sint a et b numeri
primi inter se: et N sit vel numerus impar formae $4n$
 $+ 1$ vel numerus impariter par. Ex quo, sequitur istud.

Conjectarium.

Nullus numerus huius formae $2abb - b - c$, existente a
numero impari, et b vel impariter pari vel impari for-
miae $4n + 1$, unquam esse potest quadratus.

Scholion 1.

Quae hic sunt allata sufficienter declarant indolem divisorum huiusmodi formularum $aa + Nb b$, simulque inserunt

THE

viunt:
quibus
quae r
bb.
sue sir
etiam
vos tai
formula
sit diui
huiusme

Numeri
primi e
numeru
torum.
pares,

Numeri
divisores
Omnesc
nitis me

Numeri
divisores
+ 1.
mul in
modis c
Tom.

viunt ad omnes diuisorum formas expedite inueniendas, quibus cognitis quoque eae numerorum formae innotescant, quae nunquam prebere queant diuisores formulae $aa+Nbb$. Cum igitu haec pateant ad omnes valores ipsius N, siue sint numeri primi, siue compositi; reliquum est, ut etiam casus euoluamus, quibus N denotet numeros negati-
vos tam primos quam compositos; perspicuum autem est formulam $paa-qbb$ nullum diuisorem habere posse, quin sit diuisor huius $aa-pqbb$ seu $pqa-a-bb$, unde sufficiet huiusmodi tantum formas $aa-Nbb$ euoluisse.

Theorema 41.

Numerorum in hac forma $aa - bb$ contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2 vel $4m+1$, nullus scilicet datur numerus, qui non sit diuisor differentiae duorum quadratorum. Vicissim autem omnes numeri, praeter impariter pares, ipsi sunt differentiae duorum quadratorum.

Theorema 42.

Numerorum in hac forma $aa - 2bb$ contentorum omnes diuisores primi sunt vel 2 vel huius formae $8m+1$. Omnesque numeri primi huius formae $8m+1$ ipsi infinitis modis in formula $aa - 2bb$ continentur.

Theorema 43.

Numerorum in hac forma contentorum $aa - 3bb$ omnes diuisores primi sunt vel 2 vel 3 vel huius formae $12m+1$. Atque vicissim omnes huiusmodi numeri primi simul in hac $aa - 3bb$ vel hac $3aa - bb$ forma infinitis modis continentur.

Tom. XIV.

Y

Theore-

Theorema 44.

Omnis divisores primi huius formae $aa - 5bb$ sunt vel 2
vel 5 vel continentur.

in altera harum formularum | vel in hac vna
 $20m \pm 1$, $20m \pm 9$ $10m \pm 1$.

Omnisque numeri primi in his formis contenti simul sunt
divisores formae $aa - 5bb$.

Theorema 45.

Omnis divisores primi huius formae $aa - 7bb$ sunt vel 2
vel 7 vel in vna sequentium formularum continentur

$28m \pm 1$; $28m \pm 3$; $28m \pm 9$

atque vicissim omnes numeri primi in his formis contenti
similiter sunt divisores formae $aa - 7bb$.

Theorema 46.

Omnis divisores primi huius formae $aa - 11bb$ sunt vel 2
vel 11 vel in vna sequentium formularum continentur

$44m \pm 1$; $44m \pm 5$; $44m \pm 7$; $44m \pm 9$; $44m \pm 19$

atque vicissim omnes numeri primi in his formulis conten-
ti simul sunt divisores formae $aa - 11bb$, quae recipro-
catio in omnibus sequentibus theorematibus locum habet.

Theorema 47.

Omnis divisores primi formae $aa - 13bb$ sunt vel 2 vel
13 vel in sequentibus formulis continentur:

		quae revocantur ad has
$52m \pm 1$	$52m \pm 3$	$26m \pm 1$
$52m \pm 9$	$52m \pm 25$	$26m \pm 3$
$52m \pm 23$	$52m \pm 17$	$26m \pm 9$

Theorema 48.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 17$
 bb sunt vel 2 vel 17, vel in sequentibus formulis continentur:

$68m \pm 1$	$68m \pm 9$	$34m \pm 1$
$68m \pm 13$	$68m \pm 19$	$34m \pm 9$
$68m \pm 33$	$68m \pm 25$	$34m \pm 13$
$68m \pm 21$	$68m \pm 15$	$34m \pm 15$

Theorema 49.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 19$
 bb sunt vel 2 vel 19 vel in sequentibus formulis continentur

$76m \pm 1$	$76m \pm 3$	$76m \pm 9$
$76m \pm 27$	$76m \pm 5$	$76m \pm 15$
$76m \pm 31$	$76m \pm 17$	$76m \pm 25$

Theorema 50.

Omnis diuisores primi numerorum formae $aa - 6$
 bb sunt vel 2 vel 3 vel in his formulis continentur:

$$24m \pm 1; \quad 24m \pm 5;$$

Theorema 51.

Omnis diuisores primi numerorum formae $aa - 10bb$
 sunt vel 2 vel 5 vel in his formulis continentur:

172 THEOR. CIRCA DIVISORES NUMER. cest.

$$40m \pm 1; \quad 40m \pm 3 \\ 40m \pm 9; \quad 40m \pm 13$$

Theorema 52.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 14$
 bb sunt vel 2 vel 7 vel in his formulis continentur:

$$56m \pm 1; \quad 56m \pm 5; \quad 56m \pm 25 \\ 56m \pm 13; \quad 56m \pm 9; \quad 56m \pm 11$$

Theorema 53.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 22$
 bb sunt vel 2 vel 11 vel in his formulis continentur:

$$88m \pm 1; \quad 88m \pm 3; \quad 88m \pm 9; \\ 88m \pm 27; \quad 88m \pm 7; \quad 88m \pm 21; \\ 88m \pm 25; \quad 88m \pm 13; \quad 88m \pm 39; \\ 88m \pm 29.$$

Theorema 54.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 15$
 bb sunt vel 2 vel 3 vel 5 vel in his formulis continentur:
 $60m \pm 1; \quad 60m \pm 7; \quad 60m \pm 11; \quad 60m \pm 17.$

Theorema 55.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 21$
 bb sunt vel 2 vel 3 vel 7 vel in his formis continentur:
 quae renocantur ad has

$84m \pm 1;$	$84m \pm 5$	$42m \pm 1$
$84m \pm 25;$	$84m \pm 41$	$42m \pm 5$
$84m \pm 37;$	$34m \pm 17$	$42m \pm 17$

Theo-

TH

On
 bb
 nen

Om
 bb

Om
 bb

Om
 bb
 form

Theorema 56.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 33$
 bb sunt vel 2 vel 3, vel 11 vel in his formulis continentur:

$132m + 1$	$132m + 17$	$66m + 1$
$132m + 25$	$132m + 29$	$66m + 17$
$132m + 35$	$132m + 65$	$66m + 25$
$132m + 49$	$132m + 41$	$66m + 29$
$132m + 37$	$132m + 31$	$66m + 31$

quae reuocantur ad has

Theorema 57.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 35$
 bb sunt vel 2 vel 5 vel 7 vel in his formulis continentur:

$140m + 1$	$140m + 9$	$140m + 59$
$140m + 29$	$140m + 19$	$140m + 31$
$140m + 13$	$140m + 23$	$140m + 67$
$140m + 43$	$140m + 33$	$140m + 17$

Theorema 58.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 30$
 bb sunt vel 2 vel 3 vel 5 vel in his formulis continentur:

$120m + 1$	$120m + 13$	$120m + 49$
$120m + 37$	$120m + 7$	$120m + 29$
$120m + 17$	$120m + 19$	

Theorema 59.

Omnis diuisores primi numerorum huius formae $aa - 105$
 bb sunt vel 2 vel 3 vel 5 vel 7 vel continentur in his
formulis

TH

 mei
 nife
 fint
 diai
 (21
 mi
 omi
 2 N
 reic
 neti
 mul
 quo

 Qu
 rur
 qua
 gula
 rem
 lori
 forr
 etia

 Sici
 tur
 ad
 $b =$
 cc
 qui
 sun

174 THEOR. CIRCA DIVISORES NUMER. cet.

		quae reuocantur ad has	
$420m +$	1.	$420m +$	13
$420m +$	169	$420m +$	97
$420m +$	23	$420m +$	121
$420m +$	107	$420m +$	131
$420m +$	109	$420m +$	157
$420m +$	59	$420m +$	73
$420m +$	101	$420m +$	53
$420m +$	151	$420m +$	137
$420m +$	89	$420m +$	103
$420m +$	79	$420m +$	187
$420m +$	41	$420m +$	113
$420m +$	209.	$420m +$	197
		$210m +$	1
		$210m +$	13
		$210m +$	23
		$210m +$	41
		$210m +$	53
		$210m +$	73
		$210m +$	79
		$210m +$	89
		$210m +$	97
		$210m +$	101
		$201m +$	103

Annotatio 13.

Numerorum ergo in formula $aa - Nbb$ contentorum divisores primi omnes sunt vel 2., vel divisores numeri N vel in eiusmodi formulis $4Nm + \alpha$ comprehenduntur. Quodsi enim $4Nm + \alpha$ fuerit forma divisorum, tum quoque $4Nm - \alpha$ erit divisorum forma: secus atque in formulis $aa + Nbb$, quarum si $4Nm + \alpha$ fuerit divisor tam $4Nm - \alpha$ nullum unquam praebere potest divisorum eiusdem formulae.

Annotatio 14.

Posita ergo $4Nm + \alpha$ pro forma divisorum generali numerorum in hac expressione $aa - Nbb$ contentorum, littera α plerumque plures significabit numeros; inter quos unitas semper continetur, tum vero quia hic de divisoribus primis sermo est inter valores ipsius α nullus erit numerus

merus par nec ullus divisor numeri N . Deinde etiam manifestum est, omnes valores ipsius α ita ordinari posse, ut sint minores quam $2N$. Si enim sit $4Nm + 2N + b$ divisor, tum posito $m = 1$ loco m , divisor erit $4N - (2N - b)$. Erunt ergo valores ipsius α numeri impares primi ad N , minores quam $2N$, horumque numerorum omnium imparium et primorum ad N et minorum, quam $2N$, semissis tantum praebet idoneos valores ipsius α , reliqui exhibebunt formulas, in quibus plane nullus contingetur divisor. Perpetuo scilicet totidem habebuntur formulae divisorum, quot sunt contrariae, solo excepto casu, quo $N = 1$.

Annotatio 15.

Quod ad numerum valorum ipsius α pro formula divisorum $4Nm + \alpha$ attinet, quoniam ob signum ambiguum quaevis formula est duplex, hic quoque eadem valebit regula, quam supra annot. 6. dedi. Sic in ultimo theoremate, quo erat $N = 105 = 3, 5, 7$, numerus valorum ipsius α erit $= 2, 4, 6 = 48$, seu cum quaevis formula sit gemina, numerus formularum fit 24, quot etiam exhibimus.

Annotatio 16.

Sicut autem unitis perpetuo inter valores ipsius α reperiatur, ita etiam quinque numerus quadratus, qui sit primus ad $4N$, valorem idoneum pro α suppedabit. Posito enim $b = 2c$, formula $\alpha\alpha - Nbb$ abit in $\alpha\alpha - 4Ncc$ seu $4Ncc - \alpha\alpha$, ex quo patet quinemuis numerum quadratum $\alpha\alpha$, qui sit primus ad $4N$, exhibere valorem idoneum pro α , sumendo scilicet residuo, quod in divisione ipsius $\alpha\alpha$ per

$4N$

$\frac{1}{4}N$ remanet. Simili modo ponendo $b = 2c + 1$, formula $Nbb - aa$ abit in $\frac{1}{4}N(cc + c) + N - aa$, vnde etiam omnes numeri $N - aa$ seu $aa - N$, qui quidem sint primi ad $\frac{1}{4}N$, idoneos valores pro a praebent. Deinde quoque notandum est, si sint x, y, z , valores ipsius a , tum quoque x^4, y^4, z^4 itemque omnia producta, quae ex numeris x, y, z eorumque potestatis quibuscumque resultant, valores ipsius a esse exhibitura; vnde cogito yno vel aliquot valoribus ipsius a facilis negotio omnes reperiuntur.

Annotatio 17.

Quo autem clarius appareat, cuiusmodi valores littera a perpetuo sit habitura, tabulam sequentem adiicere visum est, similem eius, quae annot. 9. habetur.

Erit scilicet	si fuerit
$a \equiv 3$	$N \equiv 3n + 1$
$a \equiv 5$	$N \equiv 3n - 1$
$a \equiv 7$	$N \equiv 5n + 1$
$a \equiv 7$	$N \equiv 5n - 1$
$a \equiv 11$	$N \equiv 7n + 1$
$a \equiv 11$	$N \equiv 7n - 1$

$$a = 13$$

Ex 1
pro
possi
meri
hend
quad
per
 $p n - 1$
lae
tem
nulli
terit

Si fu
nis a
ciore
 $\frac{1}{2}N$
diuiso
rum
lae. a
 $\frac{+ 2}{T_0}$

$\alpha = 13$	$N = 13n$	$\left\{ \begin{array}{l} +1 \\ -1 \\ +2 \\ -2 \\ +4 \\ -4 \end{array} \right.$
$\alpha = 13$	$N = 13n$	$\left\{ \begin{array}{l} +5 \\ -5 \\ +6 \\ -6 \end{array} \right.$

Annotatio 18.

Ex hac igitur tabula numeri primi, qui idoneos valores pro α praebant, facile dignosci simulque inepti reiici possunt. Proposito scilicet numero primo p , omnes numeri quadrati in huiusmodi formulis $pn + \theta$: comprehendi possunt, quae prodeunt ponendo pro θ numeros quadratos, seu residua, quae ex divisione quadratorum per p remanent. Quare si N fuerit huiusmodi numerus $pn + tt$, tum inter formas diuisorum $4Nm + \alpha$ formulae $aa - Nbb$ seu $Nbb - aa$, habebitur $\alpha = p$, sin autem numerus N non contineatur in forma $pn + tt$, tum nullus numerus in formula hac $4Nm + p$ contentus poterit esse divisor ullius numeri hujus formae $aa - Nbb$.

Annotatio 19.

Si fuerit N numerus impar formae $4n + 1$ tum expressio-
nis $aa - Nbb$ diuisorum formulae $4Nm + \alpha$ ad duplo pau-
ciores reduci possunt, ita ut exhiberi possint hoc modo:
 $2Nm + \alpha$. Hoc scilicet casu, si $4Nm + \alpha$ fuerit forma
diuisorum, tum quoque $4Nm + (2N - \alpha)$ erit diuiso-
rum forma, sic cum casu $N = 13$, una diuisorum formu-
lae $aa - 13bb$ forma esset $52m + 3$, erit quoque $52m$
 $+ 23$ forma diuisorum.

Annotatio. 20.

Sin autem fuerit N vel numerus impariter par, vel numeru impar formae $4n-1$ tum ista formarum diuidentium reductio ad duplo pauciores non succedit. Scilicet si hoc casu formulae $aa-Nbb$ fuerit $4Nm + \alpha$ diuisorum forma, tum $4Nm + (2N-\alpha)$ talis non erit, hoc est: nullus numerus in forma $2(2m+1)N + \alpha$ contentus erit diuisor vllius numeri huiusmodi $aa-Nbb$. Posto ergo $\alpha=tt$, erit:

$$(2(2m+1)N + tt) u = aa - Nbb.$$

Vnde consequimur sequens.

Consectarium.

Nullus numerus in hac forma $2abc + c + b$ contentus vñquam potest esse quadratus, si quidem fuerit a numerus impar, et b numerus seu impariter par, seu impar huius formae $4n-1$.

Scholion 2.

Huiusmodi formulae magis speciales, quae nunquam quadrata fieri queant, innumerabiles superioribus deduci possunt. Consideremus enim priorum formam $aa + Nbb$, sitque $4Nm + A$ eiusmodi formula, vt nullus numerus in ea contentus possit esse diuisor formae $aa + Nbb$. Erit ergo $aa + Nbb = (4Nm + A)u$, denotante hoc signo $=$ aequationem impossibilem, ex quo oritur $aa = 4Nm u + Au - Nbb$. Sit $b = Ac$ fiet $aa = 4Nm u + Au - NAAcc$. Ponatur perro $u = NAcc + d$, eritque $aa = 4NNAcc + 4Nm d + Ad$. Sit $d = 4NNn$ erit $aa = 16Nm + 4NNAcc + 4NNAn$. Diuidatur haec

Notam
et n re
Hanc

haec formula per quadratum $4NN$ ac ponatur $c=1$ eritque $4Nm + Am + An$ formula, quae nunquam poterit esse quadratum, si quidem forma $aa + Nb^2$ non possit diuidi per ullum numerum in hac formula $4Nm + A$ contentum. Ex superioribus ergo theorematibus colligimus nullum numerum, qui in vna sequentium expressionum contineatur, fieri posse quadratum.

$4mn - (m+n)$	$4mn + 3(m+n)$
$8mn - (m+n)$	$8mn + 7(m+n)$
$8mn - 3(m+n)$	$8mn + 5(m+n)$
$12mn - (m+n)$	$12mn + 11(m+n)$
$12mn - 7(m+n)$	$12mn + 5(m+n)$
$20mn - (m+n)$	$20mn + 19(m+n)$
$20mn - 3(m+n)$	$20mn + 17(m+n)$
$20mn - 7(m+n)$	$20mn + 13(m+n)$
$20mn - 9(m+n)$	$20mn + 11(m+n)$
$24mn - (m+n);$	$24mn + 23(m+n)$
$24mn - 5(m+n);$	$24mn + 19(m+n)$
$24mn - 7(m+n);$	$24mn + 17(m+n)$
$24mn - 11(m+n);$	$24mn + 13(m+n)$
$28mn - (m+n);$	$28mn + 27(m+n)$
$28mn - 9(m+n);$	$28mn + 19(m+n)$
$28mn - 11(m+n);$	$28mn + 17(m+n)$
$28mn - 15(m+n);$	$28mn + 13(m+n)$
$28mn - 23(m+n);$	$28mn + 5(m+n)$
$28mn - 25(m+n);$	$28mn + 3(m+n)$

cet.

Notandum autem est in formulis alterius columnae numeros m et n respectu coefficientis ipsius $m+n$ primos esse oportere. Hanc restrictionem requirit ea conditio, quam initio sta-

biliuimus, vt in forma $aa + Nbb$ numeri a et b sint inter se numeri primi: nisi enim haec conditio obseruetur, quilibet numerus possit esse divisor istius formae. Ceterum hac conditione obseruata ex praecedentibus perspicuum est, si $4Nm n - A(m+n)$ quadratum esse nequeat, tum quoque hanc latius patentem $4Nm n - A(m+n) \pm 4Np(m+n)$ quadratum esse non posse.

Scholion 3.

Contemplemur iam expressionem $aa - Nbb$ cuius nullus divisor contineatur in formula hac $4Nm \pm A$. Erit ergo $aa - Nbb = 4Nm u \pm Au$ seu $aa = 4Nm u + NAA \pm Au$. Ponatur $NA \pm u = d$, seu $u = \pm d \pm NA$, eritque $aa = \pm 4Nm d \mp 4NNAm \pm Ad$, sit $d = \pm 4NNn$ fietque $16N^3mn \mp 4NNAm \pm 4NNAn = aa$, vnde patet nullum numerum contentum in hac formula $4Nm n - A(m-n) \pm 4Np(m-n)$ quadratum esse posse. Neque ergo etiam ullus numerus in hac expressione $4Nm n - A(m-n) \pm 4Np(m-n)$ contentus quadratum esse poterit, si modo conditio ante memorata obseruetur, vt a et b sint numeri inter se primi. Hinc itaque ex theorematis posterioribus deducuntur sequentes formulae, quae nunquam numeros quadratos praebere possunt.

$$\begin{array}{ll}
 8mn \pm 3(m-n), & 8mn \pm 5(m-n) \\
 12mn \pm 5(m-n); & 12mn \pm 7(m-n) \\
 20mn \pm 3(m-n); & 20mn \pm 17(m-n) \\
 20mn \pm 7(m-n); & 20mn \pm 13(m-n) \\
 24mn \pm 7(m-n); & 24mn \pm 17(m-n) \\
 24mn \pm 11(m-n); & 24mn \pm 13(m-n)
 \end{array}$$

cet. THEOR. CIRCA DIVISORES NVMER. cet. 181

$$\begin{aligned}28mn &\pm 5(m-n); \quad 28mn &\pm 23(m-n) \\28mn &\pm 11(m-n); \quad 28mn &\pm 17(m-n) \\28mn &\pm 13(m-n); \quad 28mn &\pm 15(m-n)\end{aligned}$$

cet.

attendent autem facile patebit ambos numeros m et n respectu coefficientis ipsius $(m-n)$ primos esse debere: alioquin enim, si verbi gratia in formula $12mn \pm 5(m-n)$ poneretur $m=5p$ et $n=5q$, prodiret $12.25pq \pm 25(p-q)$, neque adeo haec formula $12pq \pm (p-q)$ quadratum esse posset, quod tamen est falsum.