

OBSERVATIONES
CIRCA NOVVM ET SINGVLARE
PROGRESSIONVM
GENVS.
Auctore
L. E V L E R O.

Inter res saepenumero, quae attentione nostra haud dignae videantur, obseruantur quaedam, quae fatis profundam investigationem requirunt, ac non parum sublimibus speculationibus occasionem praebent. Quod cum plurimis exemplis confirmari possit, tum nuper etiam ipse sum expertus, dum quaestionem illam tyronibus notissimam, attentius contemplarem, qua quindecim Christiani totidemque Iudei ita ordine sunt collocandi, vt si, numerandi initio in dato loco sumto, nonus quisque vel decimus in mare sit eliciendus, haec poena in solos Iudeos sit casura. Quae quaestio etiam si in se nihil habeat difficultatis, tamen mox vidi, si in genere de hominum numero quoconque, ex quibus non nonus sed secundum alium quemuis numerum quotusquisque sit eliciendus, proponatur, difficultimum fore, ordinem eorum, qui continuo euidentur, assignare. Neque adeo methodus constat hoc in genere

N O V M

nere praestandi, tametsi quoris casu oblati, dum numeratio actu instituitur, solutio facilime obtinetur. Ex hoc genere haud parum curiosa mihi videtur quiescere, si v. gr. ex plurimum pontuum numero is solus sit supplicio afficiendus, qui, postquam nonus quisque vel secundum alium numerum ex ordine fuerit exemptus, tandem ultimo solus sit remansurus; hic scilicet maxime intererit, ante nos illum fatalem locum, in quo numeratio illa ultimo terminabitur.

2. Quo omnia quae hic inuestiganda occurserunt, clarius perspiciantur, casum illum perpendamus, quo ex serie 30 notarum nota quaeque expungitur, quod negotium numeratione actu instituta ita commodissime repraesentatur:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
23	20	28	24	14	4	7	12	11	19	16	10	26	27	23	5	18	22	8	15	19	30	11	13	11	21	6	3	21	17	29

Hic superiores numeri indicant, quoro loco a primo computando quaeque nota sit posita, inferiores vero numeri ostendunt, quando quaeque eliciatur, dum scilicet continuo nonas quaeque expungitur. Ita patet, primo novam, secundo decimam octauam, tertio vicesimam septimam, quartos sextam, quinto decimam sextam et ita porto expungi, donec ultimo delenda super sit sola vicesima prima, qui adeo foret locus ille fatalis ante memoratus. Si indices electorum ordine disponantur, indicesque notarum subscrivantur, haec series prodibit.

Indices

Indices electionis.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 9, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 18, 27, 28, 29, 7, 12, 13, 14, 24, 8, 22, 5, 23, 11, 29, 17, 10, 2, 28, 25, 1, 4, 15, 13, 14, 3, 20, 21.

Indices naturales.

Hanc postremam seriem vocabo *Seriem electionis*, quia ea indicat, quanta nota elicatur primo, secundo, tertio etc. Haec illicet primo elicetur nota 9^{ta}, secundo 18^{ta}, tertio 27^{ta}, quarto 6^{ta}, quinto 16^{ta} et ita porro, donec ultime trigesimo nempe loco elicatur nota vicesima prima. Vbi quidem meminisse oportet postquam numerando in serie notarum ad finem fuerit peruentum numerationem iterum ab initio continuari; ex quo intelligitur, notam trigesimam primam conuenire cum prima, et si cuiusque notae index fuerit n , eidem quoque indices $n + 30$, $n + 60$, $n + 90$ etc. conuenire sunt censendi.

Q. 3. Si hanc seriem electionis consideremus, vix illum ordinem in ea deprehendere dicet; utresquae quidem primi termini 9, 18, 27 secundum differentiationem ascendunt; et quartus quoque 6, quia cum 36 conuenit, eandem legem sequitur. Quintus autem, qui est et 6 vel 46, adnotatio praecedentem superat, quia in numerando iam unus scilicet 9 seu 39 est delatus, videoque non numeratur. Ob eandem rationem a termino quinto 16 ad sextum 26 enim 10, at a sexto 26 ad septimum 7 seu 37 iam non numerantur; siveque taliter continuo fiunt maiores, quia plures notae iam deletae transiluntur; quod operationem actu instituendo sponte clucet, etiam si

Q. 3.

ordinem harum differentiarum auctarum vix assignare liceat; generatim certe hic nihil omnino definiri posse videtur. Circa finem autem imprimis haec series electionis ita sit irregularis, ut nulli prorsus legi adstricta videatur. Eum in finem autem hanc seriem hic exposui, quo clarius omnes difficultates, quibus perscrutatio eius impeditur, perspiciantur, haecque ipsa series ex ludicro principio enata attentione nostra non indigna videatur.

4. Haec autem series electionis specialis duabus rebus determinatur, quarum altera in numero notarum, qui est 30, altera vero numeratore, qui est 9 continetur. Quocirca in genere quaestio huc credit: ut dato notarum numero una cum numeratore ipsa series electionis exhibeat, cuius solutionem cum in genere sperare nequeamus, in casibus particularibus attentionem nostram exerceri conueniet, num forte legem quamquam detegere videamus. Ac primo quidem patet, si numerator fuerit unitas, seriem electionis ipsam fore seriem numerorum naturalium 1, 2, 3, 4 etc. quoniam enim primus quisque elicitur, primo loco primus terminus, secundo secundus, tertio tertius et ita porro elicitur, ita ut ultima nota simul sit terminorum electorum ultimus.

5. Sit igitur numerator = 2, ita ut secundus quisque eliciatur, seu electio secundum alternos instituantur, ac pro notarum numero series electionis ita se habere deprehenduntur:

numerus

numerus	series electionis
notarum	pro numeratore 2 ampliorum.
2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
3	2, 1, 3
4	2, 4, 3, 1
5	2, 4, 1, 5, 3
6	2, 4, 6, 3, 1, 5
7	2, 4, 6, 1, 5, 3, 7
8	2, 4, 6, 8, 3, 7, 5, 1
9	2, 4, 6, 8, 1, 5, 9, 7, 3
10	2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9, 5
11	2, 4, 6, 8, 10, 1, 5, 9, 3, 11, 7
12	2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 7, 11, 5, 1, 9
13	2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 5, 9, 13, 7, 3, 11
14	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 7, 11, 1, 9, 5, 13
15	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 5, 9, 13, 3, 11, 7, 15
16	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 7, 11, 15, 5, 13, 9, 1

Hoc schema insipienti facile erit pluribus modis ordinem quendam obseruare. Ultimi scilicet termini manifesto tenent progressionem arithmeticam binario crescentem, dummodo termini qui numerum notarum effent superaturi, infra eum deprimantur, numero scilicet notarum inde detracto. Ita cum primo habeatur 1, pro secunda serie ultimus, qui foret 3, binario subtracto ad unitatem reducitur; hunc sequitur 3, et sequens 5 numerum notarum unitate superans ad unitatem reducitur, et ita porro. Simili lege progrediuntur termini penultimi, tum vero etiam antepenultimi, atque adeo omnes

ab

ab ultimis aequidistantes. Quoniam igitur omnes rectae oblique ei, quae per terminos ultimos transfit parallelae, per huiusmodi progressiones arithmeticas pro numero notarum mutilatas transiunt, hinc istae series quoque lubuerit facile continuantur.

6. Exponamus simili modo series electionis pro numeratore = 3, ac lex progressionis multo magis abscondita prodibit.

numerus notarum	series electionis pro numeratore 3
1	1
2	1, 2
3	3, 1, 2
4	3, 2, 4; 1
5	3, 1, 5, 2, 4
6	3, 6, 4; 2, 5, 1
7	3, 6, 2, 7, 5, 1, 4
8	3, 6, 1, 5, 2, 8, 4, 7
9	3, 6, 9, 4, 8, 5, 2, 7, 1
10	3, 6, 9, 2, 7, 1, 8, 5, 10, 4
11	3, 6, 9, 1, 5, 10, 4, 1, 1, 8, 2, 7
12	3, 6, 9, 12, 4, 8, 1, 7, 2, 1, 1, 5, 10
13	3, 6, 9, 12, 2, 7, 11, 4, 10, 5, 1, 8, 13
14	3, 6, 9, 12, 1, 5, 10, 14, 7, 13, 8, 4, 11, 2
15	3, 6, 9, 12, 15, 4, 8, 13, 2, 10, 1, 11, 7, 14, 5
16	3, 6, 9, 12, 15, 2, 7, 11, 16, 5, 13, 4, 14, 10, 1, 8, etc.

Interim tamen eti secundum lineas horizontales et verticales ordo magis est abstrusus, tamen in ultimis

mis iterum progressionis arithmeticæ se prodit secundum ternarium crescens; haecque eadem lex quoque in penultimis et ante penultimis ut ante deprehenditur, ex quo et has series facilime continuare licet.

7. Circa hanc legem in terminis ultimis locum habentem dubitare amplius non poterimus, dum ea adhuc pro numeratore 4 obseruetur. Par ergo modo series electionis inde erectas represe-

numerus
motarum

series electionis
pro numeratore 4

1	1
2	2, 1
3	1, 3, 2
4	4, 1, 3, 2
5	4, 3, 5, 2, 1
6	4, 2, 1, 3, 6, 5
7	4, 1, 6, 5, 7, 3, 2
8	4, 8, 5, 2, 1, 3, 7, 6
9	4, 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1
10	4, 8, 2, 7, 3, 10, 9, 1, 6, 5
11	4, 8, 1, 6, 11, 7, 3, 2, 5, 10, 9
12	4, 8, 12, 5, 10, 3, 11, 7, 6, 9, 2, 1
13	4, 8, 12, 3, 9, 1, 7, 2, 11, 10, 13, 6, 5
14	4, 8, 12, 2, 7, 13, 5, 11, 6, 1, 14, 3, 10, 9
15	4, 8, 12, 1, 6, 11, 2, 9, 15, 10, 5, 3, 7, 14, 13
16	4, 8, 12, 16, 5, 10, 15, 6, 13, 3, 14, 9, 7, 11, 2, 1
	etc.

Hinc ergo lex illa in seriebus oblique descendentibus

Tom. XX. Nou. Comm.

R

pror-

prorsus confirmatur, quae scilicet hic sunt arithmeticae quaternario crescentes, dum termini numerum nostrum superantes infra eum deprimuntur. In series i bus autem horizontalibus et verticalibus ordo sit continuo intricatior. Quin etiam ipsa rei natura in seriebus horizontalibus nullam progressionis legem patitur, propterea quod eae, cum omnes numeros notarum numero non maiores fuerint complexae, vi teriori continuationi aduersantur, ita ut continuatio tanquam imaginaria sit spectanda.

8. En ergo insignem legem, cuius ope pro quo quis numeratore et notarum numero, nota vltimo eiendi assignari potest. Existente scilicet numeratore $= n$, si pro notarum numero ν vltima eiendi sit z , seu indici z respondeat, tum pro numero notarum $\nu + 1$, vltima eiendi erit $z + n$, siquidem non sit $z + n > \nu + 1$; at si $z + n > \nu + 1$, vltima erit $z + n - \nu - 1$ vel $z + n - z (\nu + 1)$ vel $z + n - 3 (\nu + 1)$, vel generatim diuidendo $z + n$ per $\nu + 1$, residuum ex divisione reliquit dabit indicem vltimae notae eiendi. Vbi notetur, si diuisio nihil reliquat, tum pro residuo o scribi notarum numerum $\nu + 1$. Cum ergo pro numero notarum n cognita fuerit vltimo electa, pro omnibus notarum numeris maioribus vltimo electa facile per hanc regulam assignabitur. Perpetuo autem si unica fuerit nota, eadem quoque erit vltimo electa, seu si fuerit $\nu = 1$, erit $z = 1$, unde sequentes omnes sine ullo negotio reperiuntur. Quae regula eo magis est notatu digna, quod sine electionis ordine

dine cognito statim ultimo ejiciendam exhibeat, etiam si ea manifesto ab ordine ante electarum pendeat. Quachobrem haec regula merito tanquam insigne Theorema spectari debet, in cuius demonstrationem inquirere omnino operae erit pretium.

9. Sequenti modo autem eius demonstratio commodissime adstrui videtur. Consideretur notarum numerus $\nu + 1$, unde secundum numeratorem n prima fiat electio, quae cadet, in notam n , siquidem fuerit $n < \nu + 1$, vel in notam $n - \alpha(\nu + 1)$, qui indices autem omnes indici n aequivalent. Expongatur ergo haec nota, ut haec punctorum series A indicat

A; $\overset{1}{\cdot} \overset{2}{\cdot} \overset{3}{\cdot} \dots \overset{n}{\cdot} \overset{n+1}{\cdot} \overset{n+2}{\cdot} \dots \overset{\nu+1}{\cdot}$

ac notae praecedentes 1, 2, 3 ($n - 1$) ad finem adiungantur indicibus numero $\nu + 1$ auctis, ut prodeat ista punctorum series

B; $\overset{n+1}{\cdot} \overset{n+2}{\cdot} \overset{n+3}{\cdot} \dots \overset{\nu+1}{\cdot} \overset{\nu+2}{\cdot} \overset{\nu+3}{\cdot} \dots$

in qua notarum numerus est ν , quaeque series ab ea, ubi numerus notarum est ν , quam ita represefento,

C; $\overset{1}{\cdot} \overset{2}{\cdot} \overset{3}{\cdot} \dots \overset{\nu-1}{\cdot} \overset{\nu}{\cdot}$

aliter non differt, nisi quod ibi indices numeratore n sunt aucti. Vtrinque ergo electiones secundum numeratorem n factae in easdem ordine notas cadent, ac si electio ultima in serie C incidat in notam cuius index est z , ea in serie B incidet in notam cuius

R₂ ius

iūs index est $n+z$; id quod etiam in serie notarum A, quarum numerus est $y+1$ euēnet. Quo ipso veritas nostri Theorematis euincitur. Simil autem inde patet, quod hic de notis vltimo electionis est demonstratum, idem de penultimis, antepenultimis, omnibusque ordinibus ab vltimis aequidistantibus valere.

10. Hujus igitur regulae ope statim pro quovis numeratore series electionis formare poterimus, cuius specimen pro numeratore 5 hic appono.

numerus notarum	series electionis pro numeratore 5
--------------------	---------------------------------------

1	5
2	1, 2
3	2, 3, 1
4	1, 3, 4, 2
5	5, 1, 3, 4, 2
6	5, 4, 6, 2, 3, 1
7	5, 3, 2, 4, 7, 1, 6
8	5, 2, 8, 7, 1, 4, 6, 3
9	5, 1, 7, 4, 3, 6, 9, 2, 8
10	5, 10, 6, 2, 9, 8, 1, 4, 7, 3
11	5, 10, 4, 11, 7, 3, 2, 6, 9, 1, 8
12	5, 10, 3, 9, 4, 12, 8, 7, 11, 2, 6, 1

12. Etsi autem series notarum vltimo loco electionum tam simplicem ac facilem legem sequitur: tamen hoc maxime mirabile usu venit, quod in genere hanc seriem nullo modo exhibere liceat. Voluti.

Iuti si pro numeratore series ultimo electorum ita
repraesentetur

num. notarum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... v

series A B C D E F G H I ... N

nouimus quidem fore A vel 1 vel 2, seu $A = n - 2i$
vero

$B = A + n - 3i$, $C = B + n - 4i$, $D = C + n - 5i$ etc.

verum tamen hinc generaliter terminum N assignare
non valemus, propterea quod in singulis litteris i
determinatum numerum denotat, tantum scilicet,
ut terminus indice supra scriptum non superet.

Hinc etsi determinatio $D = C + n - 5i$ nihil habet
difficultatis, tamen si velimus pro C suum valorem
 $B + n - 4i$ ponere, ut prodeat $D = B + 2n - 4i - 5i$
hinc nihil concludere possumus, quandoquidem ge-
minae litterae i valores non innotescunt. Causa igi-
tur, cur in genere circa hanc seriem nihil definire
liceat, in hoc consistit, quod continuo terminorum
reductio ad alios numeros sit instituenda. Facilius
hoc intelligetur, si perpendamus, nullum terminum
ex praecedente absolute determinari, sed ad plures
interdum conditiones esse respiciendum: Scilicet si
quartus detur C, quintus erit vel $C + n$ nisi $C + n > 5$;

vel erit $C + n - 5$ nisi $C + n > 10$

vel erit $C + n - 10$ nisi $C + n > 15$

etc.

quemlibet autem terminum ad suam debitam formam deprimi oportet, antequam ex eo sequentem ope regulae demonstratae eliciamus.

13. Pro casibus autem particularibus ad terminos valde remotos per saltus progredi licet, vt non sit opus omnes intermedios euoluisse. Scilicet si pro numeratore n , indici y , qui hic notarum numerum significat, respondeat terminus a , tum indici $y+x$ respondebit terminus $a+nx$, dum fit $a+nx < y+x$ seu $x < \frac{y-a}{n-1}$: quin adhuc hic terminus recte se habet, si x vnitate augeatur, hoc est si $x > \frac{y-a}{n-1}$, vt excessus vnitate sit minor, tumque indici $y+x$ respondet terminis $(n-1)x-y+a$. Simili modo ab hoc per saltum ad remotiorem terminum peruinire licet, saltus autem continuo fiunt maiores: per singulos autem saltus termini in progressione arithmeticâ secundum numeratorem n crescente procedunt. Ab initio quidem siuguli termini teofsim sunt definiendi, statim autem atque ad indices numeratore maiores peruenitur, calculus per saltus commodius insituitur, cuius specimen pro numeratore 9 opponam, vbi perpetuo numerum $y-a$ per 8 ita diuidi oportet, vt quotus nimis magnus accipiat: tum enim ipse quotus dabit valorem ipsius x , et residuum erit terminus per hunc saltum sequens:

Series pro numeratore 9

Indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 terminis 1, 2, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 8, 7, 5, 2, 11, 6, 15, 8, 17, 8

Saltus $\frac{2}{10}, \frac{3}{12}, \frac{5}{13}, \frac{4}{14}, \frac{4}{16}, \frac{5}{19}, \frac{6}{20}, \frac{6}{22}, \frac{7}{24}, \frac{8}{26}, \frac{9}{28}, \frac{9}{30}$
 indices 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 51, 57, 64, 72, 81
 termini. 6, 2, 4, 3, 7, 7, 8, 3, 6, 3, 2, 2, 2

Saltus $\frac{10}{10}, \frac{12}{12}, \frac{13}{13}, \frac{14}{14}, \frac{16}{16}, \frac{19}{19}, \frac{20}{20}, \frac{22}{22}, \frac{24}{24}, \frac{26}{26}, \frac{28}{28}, \frac{30}{30}, \frac{32}{32}, \frac{34}{34}$
 indices 91, 103, 116, 130, 146, 165, 185, 208, 234, 264, 297, 334
 termini. 1, 6, 7, 3, 1, 7, 2, 3, 1, 7, 7, 6

Saltus $\frac{42}{42}, \frac{47}{47}, \frac{52}{52}, \frac{60}{60}, \frac{67}{67}, \frac{75}{75}, \frac{85}{85}, \frac{95}{95}, \frac{107}{107}, \frac{120}{120}$
 indices 376, 423, 475, 535, 602, 677, 762, 857, 964, 1084
 termini. 8, 8, 1, 6, 7, 5, 8, 6, 5, 1

Saltus $\frac{136}{136}, \frac{152}{152}, \frac{172}{172}, \frac{193}{193}, \frac{217}{217}, \frac{244}{244}, \frac{275}{275}, \frac{309}{309}, \frac{348}{348}$
 indices 1220, 1372, 1544, 1787, 1954, 2198, 2473, 2782, 3130
 termini. 5, 1, 5, 5, 4, 2, 4, 3, 5
 etc.

14. Hanc ergo seriem facili labore vltra terminos continuauimus, ac si vterius progredi velimus, ex numeris postremis 3130 et 5 calculum ita instituimus:

ab 3130 Hinc saltus per 391 terminos porrificatur, indeque terminus cuius index est 3521 erit vt residuum indicat
 subtr. 5

$$\underline{\underline{8)3125}} \quad \underline{\underline{(8)}}$$

$$\underline{\underline{391}}$$

ab 3521 Hic saltus fit per 440 terminos, vnde
 subtr. 3 oritur index $3521 + 440 = 3961$,

$$\underline{\underline{8)3518}} \quad \underline{\underline{(2)}}$$

$$\underline{\underline{440}}$$
 cui respondet terminus 2 residuo indicatus.

ab

$$\begin{array}{rcccl}
 \text{ab} & 3961 & & & \\
 \text{subtr.} & 2 & \text{Hinc colligitur pro indice} & 4456 & \\
 \hline
 & 3959 & & & \\
 & (1) & & & \\
 & 495 & & &
 \end{array}$$

Ab hoc autem saltus sequens ultra 5000 extenditur; neque tamen video, quomodo huius seriei terminus verbi gratia decies millesimus vel adeo centes millesimus nisi saltibus hoc modo continuendis, assignari possit: indices quidem per hos saltus crescentes secundum progressionem geometricam in ratione 8 : 9 proxime crescunt, sed quia hoc tantum proxime fit, hinc nullum subsidium pro continuatione obtinetur.

15. Hinc ergo pro quovis notarum numero, dummodo 5000 non longe superet, inquam electionis fors postremo cadet: ex serie scilicet hic per saltus exhibita is terminus quaeri debet, qui indici notarum numero aequali respondet. Perpetuo scilicet index proxime minor sumatur indeque progressis arithmeticis usque ad indicem propositum per differentiam 9 continuetur, quod in nonnullis exemplis declarati expediet.

I. Quaeratur seriei illius terminus centesimus: Proxime inferior index per saltus inuentus est 91, cui conuenit terminus 1. Iam inde ad centesimum sunt loca 9, et nouies nouem seu 81 ad illum terminum 1 adjiciendo prodit terminus centesimus 82. Quare si ex centum lontibus is sit suppicio affidus,

dus, qui postquam reliqui per numerationem ad 9 fuerint liberae, tandem solus relinquatur, haec ponit in 82^{ndm} ordine incidente.

II. Ut terminus 200^{mus} ceperiat, calculus ita instituatur: Index proximus 200 terminus 2
Index proximus 185 terminus 2
Index proximus 175 terminus 2
Index proximus 155 per 9 dat 135

terminus quaeſitus 137

III. Quaeratur terminus 500^{mus}:

Index proximus 475 terminus 5
Index proximus 455 per 9 dat 225
terminus quaeſitus 226

IV. Quaeratur terminus milleſimus:

Index proximus 964 terminus 5
Index proximus 36 per 9 dat 324
terminus quaeſitus 329

V. Quaeratur terminus 5000^{mus}:

Index proximus 4456 terminus 5
Index proximus 544 per 9 dat 4896
terminus quaeſitus 4897

17. Consideratio huiusmodi serierum tam facili negotio formandarum non solum est iucunda,

Tom. XX. Nou. Comm. S fed

sed etiam non parum ad numerorum naturam tantopere nobis adhuc absconditam felicius perscrutandam conferre quicquam posse videtur. Eximum certe hoc est exemplum, et omni attentione dignum, quod series tam leui opera non solum formari sed etiam quoisque libuerit, continuari possit, cum tamen eius natura et vera indoles nobis maneat profus incognita, neque ut aliae ad terminum generalem reuocari possit.

II. Simili modo etiam pro numeratore 6 ordines electionis subiungimus.

Numerus notarum	Series electionis pro numeratore 6
1.	1.
2.	2. 1.
3.	3. 2. 1.
4.	2. 1. 4. 3.
5.	1. 3. 2. 5. 4.
6.	6. 1. 3. 2. 5. 4.
7.	6. 5. 7. 2. 1. 4. 3.
8.	6. 4. 3. 5. 8. 7. 2. 1.
9.	6. 3. 1. 9. 2. 5. 4. 8. 7.
10.	6. 2. 9. 7. 5. 8. 1. 10. 4. 3.
11.	6. 1. 8. 4. 2. 11. 3. 7. 5. 10. 9.

16. Vicissim autem si detur ordo electorum, qui ab ultimo regrediendo fit:

$x, y, z, u, v, w, r, s, t$ etc.

ex eo pro quoquis numeratore et quolibet notarum numero, initialis ordo notarum inuestigari poterit. Quod

Quod quo clarius appareat, sit numerator = 4 et pro quolibet notarum numero ordo notarum sequenti modo se habebit:

m<u>ltitudo notarum	ordo notarum initialis
1	z z
2	z y z y
3	x z y
4	x z y v
5	z y v u x
6	v u x t z y
7	t z y s v u x
8	v u x r t z y s
9	z y s q v u x r t
10	x r t p z y s q v u
11	q v u o x r t p z y s
12	z y s n q v u o x r t p
13	r t p m z y s n q v u o x
14	u o x l r t p m z y s n q v
15	n q v k u o x l r t p m z y s
16	z y s i n q v k u o x l r t p m
17	t p m k z y s i n q v k u o x l r
18	x l r g t p m k z y s i n q v k u o.

Consideratio horum ordinum non solum eorum naturam satis luculenter declarat, sed etiam plures insignes speculationes suppeditare poterit.