

DE FORMVLIS EXPONENTIALIBVS REPLICATIS.

Auctore
L. EULERO.

§. I.

Communicauit nuper cum Academia Illustr. *Marchio de Condorcet* profundissimas speculationes circa formulas Analyticas fere penitus insolitas, inter quas primum locum tenent formulae, quas hic appellare liceat exponentiales replicatas; quandoquidem quaelibet potestas abit in exponentem sequentis potestatis: cuiusmodi expressio hoc modo vulgo re-

praesentari solet r^a . Quoniam autem indoles talium expressionum etiam nunc parum est perspecta, etiam vis illarum investigationum incredibili sagacitate erutarum neitiquam clare percipi et cognosci potest; hanc ob rem haud inutile erit, hoc loco praecipuas proprietates talium expressionum explicare.

§. 2. Hunc in finem, cum supremus exponens positus sit a , ipsa autem quantitas continuo eleuanda denotetur littera r , statuamus primam potestatem $r^a = \beta$, atque iam β erit expo-

nens secundae potestatis $r = r^\beta$, quam porro designemus littera γ , quae cum sit exponens tertiae potestatis, statuamus simili modo $r^\gamma = \delta$; tum vero porro $r^\delta = \epsilon$; $r^\epsilon = \zeta$ etc. ita ut hoc modo totum negotium reducatur ad considerationem progressionis

tionis litterarum $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta$ etc. quarum quaelibet reperitur, si quantitas fixa r ad praecedentem eleuetur, quae ergo lex progressionis hoc modo clarissime ob oculos ponetur $\beta = r^\alpha$; $\gamma = r^\beta$; $\delta = r^\gamma$; $\epsilon = r^\delta$; $\zeta = r^\epsilon$; vnde statim patet, si incipiamus ab $\alpha = 0$ fore $\beta = 1$ et $\gamma = r$; sequentes vero $\delta = r^r$;

$\epsilon = r$ etc.

§. 3. Hic primo evidens est, si pro r capiatur numerus modice magnus, terminos nostrae seriei mox in immensum excrecere; si enim tantum sumamus $r = 2$, posito $\alpha = 0$, ut sit $\beta = 1$ et $\gamma = 2$, sequentes termini erunt $\delta = 4$; $\epsilon = 16$; $\zeta = 65536$; ubi tantum sequentem terminum η nemo facile euoluet, siquidem constaret ex 19729 figuris. Hinc iam manifestum est, si pro r numerum adhuc maiorem sumeremus, tum nostram seriem α, β, γ etc. multo rapidius in immensum esse excreturam. Contra autem sponte intelligitur, si loco r numeri binario minores accipiantur, tum huiusmodi augmentationem multo lentius esse processuram, quandoquidem pro casu $r = 1$ omnes nostrae seriei termini in infinitum perpetuo manebunt unitati aequales.

§. 4. Hic igitur statim quaestio maximi momenti se offert: ubi ista enormis augmentatio incipiat? neque enim, statim ac numerus r unitatem superet, ista augmentatio contingit, id quod unico casu ostendisse sufficiet, quo sumatur $r = \sqrt{2}$, ubi adeo primo exponenti α iam maiorem valorem tribuamus quam $\sqrt{2}$. Sit scilicet $\alpha = 2$ ac prodibit $\beta = 2$, hincque porro $\gamma = 2$, sicque deinceps omnes termini nostrae progressionis nullam augmentationem accipiunt, dum omnes binario aequales manent. Quin etiam idem phoenomenon locum habebit, si primo exponenti α adhuc maiorem valorem tribuamus, scilicet $\alpha = 4$; tum enim prodibit $\beta = 4$ et $\gamma = 4$, neque vlla ulterior augmentatio occurret; statim autem ac α ultra 4 augebitur,

bitur, veluti si sumatur $\alpha = 6$, tum reperietur $\beta = 8$; hincque porro $\gamma = 16$; $\delta = 256$, sequentes vero ob summam magnitudinem vix et ne vix quidem exprimere licebit.

§. 5. Cum igitur casu $r = \sqrt{2}$, incipiendo ab $\alpha = 0$, augmentatio terminorum non ultra modicam quantitatem excre-
scat, cum sumpto $r = 2$ ea quasi subito in infinitum dilatetur, maxime sine dubio operae erit pretium limitem assignare, ubi ista augmentatio incipiat; quem ante quam ex principiis Analyticis definiamus, haud abs re erit, casus quosdam intra limites $\sqrt{2}$ et 2 examini subicere, id quod facili negotio per logarithmos expedire licebit. Cum enim sit $\beta = r^\alpha$, erit $I\beta = \alpha I r$ et $II\beta = I\alpha + IIr$; similique modo erit $II\gamma = I\beta + IIr$; tum vero $II\delta = I\gamma + IIr$ et ita porro. Hoc igitur modo examine-
mus casum, quo $r = \frac{3}{2}$ vnde fit

$$I r = 0,1760913 \text{ et } II r = 9,2457379$$

et quia, nostram seriem a cyphra incipiendo, statim peruenimus ad terminum $\frac{3}{2}$, incipiamus a positione $\alpha = \frac{3}{2}$ et calculus sequenti modo concinne absoluetur.

$$I \alpha = 0,1760913 \text{ hincque } \alpha = 1,5000$$

$$II r = 9,2457379$$

$$II \beta = 9,4218292$$

$$I \beta = 0,2641370 \text{ hincque } \beta = 1,8371$$

$$II r = 9,2457379$$

$$II \gamma = 9,5098749$$

$$I \gamma = 0,3235004 \text{ hincque } \gamma = 2,1062$$

$$II r = 9,2457379$$

$$II \delta = 9,5692383$$

$$I \delta = 0,3708841 \text{ hincque } \delta = 2,3490$$

$$II r = 9,2457379$$

$$II e =$$

$$ll\varepsilon = 9,6166220$$

$$l\varepsilon = 0,4136396 \text{ hincque } \varepsilon = 2,5920$$

$$llr = 9,2457379$$

$$ll\xi = 9,6593775$$

$$l\xi = 0,4564335 \text{ hincque } \xi = 2,8604$$

$$llr = 9,2457379$$

$$ll\eta = 9,7021714$$

$$l\eta = 0,5036993 \text{ hincque } \eta = 3,1893$$

$$llr = 9,2457379$$

$$ll\theta = 9,7494372$$

$$l\theta = 0,5616140 \text{ hincque } \theta = 3,6443$$

§. 6. Hic ergo termini nostrae progressionis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. tam lente crescunt, vt dubitare queamus, an non ad certum quendam limitem conuergant; verum quia postremae differentiae manifesto crescunt, necesse est, vt ipsi termini tandem continuo ultra crescant, vnde concludere licet, limitem, quem quaerimus, infra $\frac{3}{2}$ subsistere. Examinemus ergo simili modo casum $r = \frac{4}{3}$, atque incipiendo ab $\alpha = \frac{4}{3}$ calculus sequenti modo procedet.

$$l\alpha = 0,1249387 \text{ hincque } \alpha = 1,3333$$

$$llr = 9,0966972$$

$$ll\beta = 9,2216359$$

$$l\beta = 0,1665850 \text{ hincque } \beta = 1,4675$$

$$llr = 9,0966972$$

$$ll\gamma = 9,2632822$$

$$l\gamma = 0,1833505 \text{ hincque } \gamma = 1,5252$$

$$llr = 9,0966972$$

$$11\delta = 9,2800477$$

$$1\delta = 0,1905670 \text{ hincque } \delta = 1,5508$$

$$11r = 9,0966972$$

$$11\varepsilon = 9,2872642$$

$$1\varepsilon = 0,1937600 \text{ hincque } \varepsilon = 1,5622$$

$$11r = 9,0966972$$

$$11\zeta = 9,2904572$$

$$1\zeta = 0,1951898 \text{ hincque } \zeta = 1,5674.$$

Hic iam differentiae manifesto continuo decrescunt; vnde satis tuto concludere licet, terminos nostrae progressionis non ultra certam quantitatem auctum iri. Quoniam autem suspicari possemus etiam hoc casu differentias iterum augeri, solutio sequentis problematis omnem tollet dubitationem.

Problema.

Inuestigare limitem, quem simulac radix r superare inceperit, termini nostrae progressionis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. in infinitum excrescant.

Solutio.

§. 7. Quaeri ergo oportet maximum valorem radice r , pro quo termini nostrae seriei non in infinitum augeantur, sed versus certum quendam limitem finitum conuergant. Denotet igitur α terminum infinitesimum nostrae progressionis, qui cum iam limitem quaesitum attigerit, necesse est, ut terminus ipsum sequens, qui est r^α , illi sit aequalis, ita ut habeamus hanc aequationem: $r^\alpha = \alpha$; vnde maximum valorem, quem littera r attingere potest, definiri oportet.

§. 8. Cum igitur sumptis logarithmis fiat $\omega \log r = \log \alpha$, hinc erit $\log r = \frac{\log \alpha}{\omega}$, siue etiam $r = \alpha^{\frac{1}{\omega}}$. Maximus igitur valor inuestiga-

fi debet, quem isto fractio $\frac{1}{\omega}$ acquirere potest: Quod autem hic maximum detur, inde intelligitur, quod sumpto tam $\omega=1$ quam $\omega=\infty$, haec fractio utroque casu euanescat. Hinc ergo ad casum maximi inueniendum, differentiale huius fractionis nihilo aequetur; quem in finem denotet $l\omega$ logarithmum hyperbolicum ipsius ω , ut eius differentiale statui possit $\frac{d\omega}{\omega}$, sicque peruenietur ad hanc aequationem $l\omega=1$; unde si e designet numerum, cuius logarithmus hyperbolicus $=1$, quem nouimus esse 2,718281828, erit $lr=\frac{1}{e}$, ideoque $r=e^{\frac{1}{e}}$.

§. 9. Hoc modo iam didicimus, quoties radix r maior accipiat hoc valore inuento e^e , toties progressionem nostram $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ etc. in infinitum augeri debere; contra autem si radix r intra istum valorem subsistat, tum nostram seriem perpetuo ad certum quendam litem conuergere, qui adeo limes pro ipso casu inuento $r=e^{\frac{1}{e}}$ erit $\omega=e$; cuius veritas vicissim hinc patet, quod hoc modo fiat terminus sequens $e^{\frac{1}{e}}=e$. Hic haud inutile erit obseruare, denotante x numerum quemcunque diuersum ab e siue maiorem siue minorem, semper fore $x^{\frac{1}{x}} < e^{\frac{1}{e}}$. Quod quo clarius perspiciatur, calculum pro casibus simplicioribus instituiamus; quem in finem ponamus $x^{\frac{1}{x}}=z$, eritque logarithmis communibus sumendis $lz=\frac{1}{x}$ hincque porro $llz=llx-lx$, unde valor ipsius z quouis casu facillime colligitur. Primo quidem perspicuum est sumto $x=1$ fore $z=1$, pro sequentibus autem valoribus calculus ita instituetur secundum formulam $\frac{1}{x}$:

	$x=2$	$x=3$	$x=4$	$x=5$	$x=6$
$1/x$	0,5010300	0,3333333	0,2500000	0,2000000	0,1666667
llx	0,6931471	1,0986123	1,3862944	1,6094379	1,7917595
z	1,41421	1,44225	1,41421	1,37972	1,34800

F 2

Pa-

Patet hic valores ipsius z , dum x ultra limitem $=e$ augetur, continuo decrescere et tandem ad unitatem conuergere; tum vero hinc etiam liquet, maximum valorem ipsius z inter positiones $x=2$ et $x=3$ incidere, ita vt is certe maior sit quam 1,44225.

§. 10. Quaeramus igitur hunc ipsum maximum valorem ipsius z ex casu $x=e=2$, 718281828 et quoniam est $llz=lle=le$, calculus ita se habebit

$$\text{ob } le=0,4342944$$

$$\text{erit } lle=9,6377842$$

$$\text{hinc subtr. } le=0,4342944$$

$$\text{fit } llz=9,2034898$$

$$\text{et } lz=0,1597679 \text{ tandem } z=1,44467$$

qui ergo valor proxime est $z=1\frac{4}{9}$.

§. 11. Si quis istum valorem maximum ipsius r accuratius desiderauerit, quam vt tabulae logarithmicae vulgares ei sufficiant, is eundem ope seriei maxime conuergentis commodissime obtinere poterit; cum enim sit

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \text{etc.}$$

erit valor quaesitus

$$e^e = 1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{2ee} + \frac{1}{6e^3} + \frac{1}{24e^4} + \text{etc.}$$

pro qua serie singulae potestates reciprocae ipsius e passim ad plures figuras decimales euoluti reperiuntur.

§. 12. Quodsi ergo pro r accipiatur numerus quicunque minor quam valor modo inuentus 1,4447, tum series inde resultans $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ etc. certe ad quendam limitem finitum conuerget, qui, si dicatur $=\Phi$, ita definietur vt sit $e^\Phi = \Phi$, ideo-

que $r=\Phi^\Phi$. Ex praecedentibus autem patet, semper binos dari valores ipsius Φ ; vnde eadem radix r oriri queat, quemadmodum in casibus supra euolutis valores $x=2$ et $x=4$ eundem

dem valorem pro x produxerunt; atque hi duo valores ipsius Φ eo magis a se inuicem discrepabunt, quo magis radix assumpta r a limite inuenito 1,4447 differat, siquidem in ipso limite ambo valores in vnum coalescunt. His igitur valoribus inueniendis sequens problema destinamus.

Problema.

Si pro radice x accipiatur numerus quicumque minor quam times inuentus $e^{\frac{1}{2}} = 1,4445$, inuestigare binos illos valores, ad quos progressio nostra $\epsilon, \beta, \gamma, \delta$ etc. conuergere potest, siue quærere duplicem valorem ipsius Φ , ut euadat $r^{\Phi} = \Phi$; ubi tamen obseruari necesse est, valorem radice x unitate maiorem accipi debere, quandoquidem valores unitate minores peculiarem explanationem postulant.

Solutio.

§. 13. Hic primo haud parum alienum videbitur, quod talis aequatio $r^{\Phi} = \Phi$ duas inuoluat radices reales, quotiescunque r intra limites 1 et $e^{\frac{1}{2}}$ continetur, neque Analysis vllam methodum certam praescribit hos duos valores inueniendi; quoniam autem iam certo nouimus duos dari huiusmodi valores, designemus alterum littera ψ , ita vt etiam sit $r^{\psi} = \psi$; hinc igitur, eliminando litteram r , impetrabimus hanc aequationem inter Φ et ψ : $\frac{1}{\Phi} = \frac{1}{\psi}$.

§. 14. Iam ad hanc aequationem resoluendam ponamus $\psi = p\Phi$, vt sit $1\psi = 1p + 1\Phi$, vnde facta substitutione reperitur $1\Phi = \frac{1p}{p-1}$; tum vero $\Phi = p^{\frac{1}{p-1}}$; at alter valor iam erit $\psi = \frac{p}{p-1}$, qui ergo in genere exprimunt binos valores quæsitos.

§. 15. Sumpto ergo pro lubitu numero p , inde colliguntur bini exponentes quæsitæ Φ et ψ ; ipsa vero radix proposita r ita

per p exprimetur, vt fit $lr = \frac{p^{\frac{1}{p-1}}}{p-1} lp$. Hinc autem vicissim ex data radice r numerus p aliter colligi nequit, nisi approxi-
mando; quem in finem notasse iuuabit, si fuerit $p = 1$, hoc casu bini exponentes Φ et ψ euadere aequales inter se atque adeo ipsi numero e , cuius logarithmus hyperbolicus $= 1$; quod quo clarius appareat, ponamus $p = 1 + \omega$, existente ω infi-
nite paruo, eritque $\Phi = (1 + \omega)^{\frac{1}{\omega}}$ ideoque $l\Phi = \frac{1}{\omega} l(1 + \omega)$. Quia igitur est $l(1 + \omega) = \omega$, erit $l\Phi = 1$ ideoque $\Phi = e$; tum vero erit $lr = \frac{1}{e}$ ideoque $r = e^{\frac{1}{e}}$, qui est ipse limes pro radice r supra inuentus; hoc ergo casu bini valores Φ et ψ inter se conueniunt.

§. 16. Pro reliquis autem casibus, quibus r minorem sortitur valorem, bini isti valores continuo magis a se inuicem discrepabunt. Ita si capiamus $p = 2$, vt fiat $\psi = 2\Phi$, prodibit $\Phi = 2$ et $\psi = 4$, tum vero porro $r = \sqrt{2}$, qui est ipse casus, quem supra fufius euoluimus, quandoquidem hinc manifesto fit $(\sqrt{2})^2 = 2$ et $(\sqrt{2})^4 = 4$. Sin autem sumamus $p = 3$, fiet $\Phi = \sqrt{3}$ et $\psi = 3\sqrt{3}$, qui ergo bini valores locum habent pro $lr = \frac{l3}{2\sqrt{3}}$; ipsa ergo radix erit $r = 3^{\frac{1}{2\sqrt{3}}}$. Tales autem expressio-
nes, vbi exponentes sunt irrationales, inter quantitates inter-
scendentes referri solent.

§. 17. Vt igitur hoc incommodum euitemus, ponamus $p = 1 + \frac{1}{n}$, denotante n numerum quantumuis magnum, eritque $\Phi = \frac{(n+1)^n}{n^n}$ et $\psi = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+1}}$; tum vero erit $lr = \frac{n^{n+1}}{(n+1)^n} l \frac{n+1}{n}$, vnde ipse valor ipsius r haud commo-
de referri potest. Pro casibus autem specialibus hi valores ita se habebunt

I. Si

I. Si $n=1$, erit $\Phi=2$ et $\Psi=4$; tum vero $r=\sqrt{2}$, vt supra notauimus.

II. Si $n=2$, erit $\Phi=\frac{9}{4}$ et $\Psi=\frac{27}{8}$; tum vero $lr=\frac{8}{9}l\frac{3}{2}$, ideoque $r=(\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}}$; hinc enim manifesto fit $r^{\Phi}=\frac{9}{4}=\Phi$, at $r^{\Psi}=\frac{27}{8}=\Psi$.

III. Si $n=3$, erit $\Phi=\frac{64}{27}$ et $\Psi=\frac{256}{81}$; tum vero erit $lr=\frac{81}{64}l\frac{4}{3}$ ideoque $r=(\frac{3}{4})^{\frac{4}{3}}$; hinc enim fit $r^{\Phi}=\frac{64}{27}=\Phi$ et $r^{\Psi}=\frac{256}{81}=\Psi$.

IV. Si $n=4$, erit $\Phi=\frac{625}{256}$ et $\Psi=\frac{3125}{1024}$; hinc vero erit $lr=\frac{1024}{625}l\frac{5}{4}$ ideoque $r=(\frac{5}{4})^{\frac{4}{5}}$; hinc autem fiet $r^{\Phi}=\frac{625}{256}=\Phi$ et $r^{\Psi}=\frac{3125}{1024}=\Psi$.

Solutio geometrica eiusdem problematis.

§. 18. Super axe A O eiusmodi curua describatur, pro qua, si ponatur abscissa A X = x et applicata X Y = y , fit $y=r^x$, quae ergo curua erit logarithmica, et pro initio $x=0$ fiet prima applicata A B = 1; tum vero, sumpta abscissa A C = 1, erit applicata C D = r quae ergo exhibeat nostram radicem r ; sicque abscissae x nobis dabunt exponentes potestatum r^x , applicatae vero y exhibebunt ipsas potestates. Iam ex initio A producatur recta A Q U, cum axe faciens angulum femirectum, quam curua in duobus punctis Q et U secabit, siquidem fuerit $e < e^e$. Hoc modo pro puncto Q erit abscissa A P = Φ simulque P Q = $r^{\Phi} = \Phi$. Simili modo pro altera intersectione U abscissa erit A T = Ψ simulque T U = $r^{\Psi} = \Psi$.

§. 19. Ab initio igitur ista curua supra rectam A Q versabitur a puncto B vsque ad Q; at vero a puncto Q vsque ad U curua infra istam rectam cadit, a termino autem U ulterius continuata in regionem superiorem in infinitum vsque ascendet. Hinc intelligitur, quamdiu abscissa x minor fuerit quam Φ , tum applicatam $y=r^x$ fore maiorem quam x ideoque ad limitem P Q propius accedere, donec sumpto $x=A P = \Phi$ etiam fiet $y=r^{\Phi}=\Phi$. Quando autem x superat Φ , ita

Tab. I.
Fig. 1.

tamen ut minor sit quam ψ , tum applicata y erit minor quam x ideoque propius ad terminum ϕ accedet; hocque eueniet, quamdiu abscissa x minor fuerit quam ψ : sumpto autem $x = \psi$ etiam fiet $y = \psi$. Denique vero si capiatur $x > \psi$, tum manifesto applicata y maior erit quam x , ideoque magis a termino ψ recedet atque adeo tandem in infinitum elongabitur.

§. 20. Hic igitur singulare Phœnomenon se offert, in hoc consistens, quod, quam diu abscissa x minor accipitur termino maiore ψ , tum applicata y semper propius ad terminum minorem ϕ accedat quam x , hocque eueniet quamdiu fuerit $x < \psi$, et non nisi in ipso hoc altero termino $x = \psi$, applicata quoque fiet $y = \psi$. Statim enim atque abscissa x vel minimum discrepat a ψ , applicata y adhuc magis a ψ discrepabit.

§. 21. Bini igitur valores supra assignati ϕ et ψ in hoc essentialiter a se inuicem differunt, quod si x siue maior siue minor capiatur quam ϕ , tum y propius ad ϕ accedat; contrarium autem euenit in altero termino ψ , quippe a quo, statim atque x discesserit, etiam y adhuc magis discedit.

§. 22. Quo hoc summum discrimen clarius appareat, consideremus casum, quo $r = \sqrt{2}$; $\phi = 2$ et $\psi = 4$; atque iam satis liquet, si progressionis nostrae numerorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. primus terminus α accipiat minor quam 2, tum sequentes β, γ, δ etc. continuo propius ad 2 esse accessuros; quandoquidem sumpto $\alpha = 2$ omnes sequentes eundem valorem recipient. Sumamus igitur $\alpha > 2$, attamen minus quam 4 et quaeramus sequentes terminos β, γ, δ , etc. ex formula $ll\beta = l\alpha + llr$ pro qua

$$llr = 0,1505150 \text{ et } llr = 9,1775798.$$

quem in finem tribuamus primo termino α valorem 3, utpote medium inter binos limites 2 et 4 et calculus sequenti modo se habebit

ad

ad. $1a = 0,4771213$ hincque $a = 3,0000$

add. $11r = 9,1775798$

$11\beta = 9,6547011$

$1\beta = 0,4515451$ hincque $\beta = 2,8284$

$11r = 9,1775798$

$11\gamma = 9,6291249$

$1\gamma = 0,4257209$ hincque $\gamma = 2,6651$

$11r = 9,1775798$

$11\delta = 9,6033007$

$1\delta = 0,4011442$ hincque $\delta = 2,5185$

$11r = 9,1775798$

$11\epsilon = 9,5787240$

$1\epsilon = 0,3790740$ hincque $\epsilon = 2,3937$

Hinc iam patet istos terminos continuo magis ad limitem 2 convergere.

§. 23. Ne quis autem putet, hoc aliter esse eventurum, si ipsi a valor parum tantum a 4 discrepans tribuatur, evolua-
mus casum $a = 3,99$ et calculus sequenti modo se habebit.

$1a = 0,6009729$ hincque $a = 3,9900$

$11r = 9,1775798$

$11\beta = 9,7785527$

$1\beta = 0,6005548$ hincque $\beta = 3,9861$

$11r = 9,1775798$

$11\gamma = 9,7781346$

$1\gamma = 0,5999770$ hincque $\gamma = 3,9808$

$11r = 9,1775798$

$$II\delta = 9,7775568$$

$$I\delta = 0,5991792 \text{ hincque } \delta = 3,9735$$

$$IIr = 9,1775798$$

$$II\epsilon = 9,7767590$$

$$I\epsilon = 0,5980795 \text{ hincque } \epsilon = 3,9635$$

Hic ergo quoque evidens est, terminos $\beta, \gamma, \delta, \epsilon$ etc. continuo magis a limite $\psi = 4$ recedere et continuo magis ad alterum limitem $\phi = 2$ appropinquare.

§. 24. Interim tamen manifestum est, si statuatur exacte $\alpha = 4$, tum omnes sequentes terminos prorsus eundem valorem esse retenturos; statim vero ac littera α vel tantillum superaverit limitem 4, sequentes terminos continuo magis eum esse superaturos, quemadmodum sequens calculus, sumendo $\alpha = 4,01$ ostendet.

$$I\alpha = 0,6031444 \text{ ideoque } \alpha = 4,0100$$

$$IIr = 9,1775798$$

$$II\beta = 9,7807242$$

$$I\beta = 0,6035652 \text{ hincque } \beta = 4,0138$$

$$IIr = 9,1775798$$

$$II\gamma = 9,7811450$$

$$I\gamma = 0,6041502 \text{ hincque } \gamma = 4,0293$$

$$IIr = 9,1775798$$

$$II\delta = 9,7817300$$

$$I\delta = 0,6049645 \text{ hincque } \delta = 4,0268$$

$$IIr = 9,1775798$$

$$II\epsilon = 9,7825443$$

$$I\epsilon = 0,6061000 \text{ hincque } \epsilon = 4,0373$$

hinc

Hinc patet indolem limitis $\psi = 4$ similem esse limiti aequilibrilabilis, quo acus cuspidi quidem insistere potest, simulac vero quam minime deturbetur, penitus procumbit.

§. 25. Hic autem probe meminisse necesse est, huiusmodi binos limites Φ et ψ locum habere non posse, nisi radix r infra valorem e substituerit; statim vero ac r hunc valorem superauerit, hi limites fiunt imaginarii; atque adeo haec ipsa imaginaria assignare licebit, cuiusmodi inuestigationes cum adhuc parum sint tritae, haud inutile erit sequens problema adiicere.

Problema.

Si radix r maior fuerit, quam limes supra assignatus e , exponentem imaginarium ω inuestigare, ut fiat $r^\omega = \omega$.

Solutio.

§. 26. Cum quicquid in Analyfi imaginarii occurrere potest semper in hac forma contineatur $x + y\sqrt{-1}$, ita ut tam x quam y sint quantitates reales, statuamus $\omega = x + y\sqrt{-1}$, ita ut esse debeat

$r^{x+y\sqrt{-1}} = x + y\sqrt{-1}$ siue $r^x r^{y\sqrt{-1}} = x + y\sqrt{-1}$
ex qua aequatione binas litteras x et y erui oportet.

§. 27. Quoniam constat esse

$$e^{z\sqrt{-1}} = \cos. z + \sqrt{-1} \sin. z$$

statuatur $r^{y\sqrt{-1}} = e^{z\sqrt{-1}}$, ut fiat $y\sqrt{-1} \cdot lr = z\sqrt{-1}$, ob $le = 1$, eritque ergo $z = ylr$, sicque habebimus

$$r^{x+y\sqrt{-1}} = \cos. ylr + \sqrt{-1} \sin. ylr$$

quo valore substituto aequatio nostra erit

$$r^{x+y\sqrt{-1}} (\cos. ylr + \sqrt{-1} \sin. ylr) = x + y\sqrt{-1}$$

vnde cum partes reales et imaginariae inter se seorsum aequari debeant, oriuntur hac duae aequationes:

I. $r^x \cos ylr = x$

II. $r^x \sin ylr = y$

quarum posterior per priorem, diuifa praebeet $\tan ylr = \frac{y}{x}$, ex qua colligimus $x = \frac{y}{\tan ylr}$, ita vt ex valore ipsius y cognito valor ipsius x assignari queat.

§. 28. Pro y autem inueniendo, posterioris aequationis capiantur logarithmi, qui dabunt

$xlr + l \sin ylr = ly$, ideoque $\frac{y}{\tan ylr} + l \sin ylr = ly$

siue $\frac{y}{\tan ylr} = l \frac{y}{\sin ylr}$; ficque totum negotium huc est perductum, vt quantitas y ex data radice r eliciatur. Quo autem ista relatio commodius exprimi possit, statuamus $ylr = \theta$, vt obtineamus hanc aequationem $\frac{\theta}{\tan \theta} = l \frac{\theta}{\sin \theta}$, vnde colligimus

$ly = l \sin \theta + \frac{\theta}{\tan \theta}$ ideoque $y = e^{\theta \cot \theta} \sin \theta$

hincque porro $lr = \frac{\theta e^{-\theta \cot \theta}}{\sin \theta}$; atque hinc tandem erit

$x = e^{\theta \cot \theta} \cos \theta$

§. 29. Optandum quidem foret, vt ex data radice r angulus θ definiri posset; verum contenti esse debemus, quod hinc ex quolibet valore ipsius θ haud difficulter radix erui queat,

vbi quidem facile intelligitur, pro extremo valore $r = e^{\frac{1}{e}}$, vbi imaginaria incipiunt, esse debere $y = 0$, id quod euenit ponendo $\theta = 0$, quo casu ob $\theta \cot \theta = \frac{\theta \cos \theta}{\sin \theta} = 1$, erit $x = e$, quemadmodum natura rei postulat, dum vtique fiet $e^e = e$; reuera

autem hinc prodibit $lr = \frac{1}{e}$, consequenter $r = e^{\frac{1}{e}}$. Quia autem hic assumimus, valorem ipsius r maiorem esse quam $e^{\frac{1}{e}}$, hi casus prodibunt, si angulo θ maiores valores tribuantur. Quod quo clarius appareat, fingamus angulum θ minimum, vt fit

$\sin \theta = \theta - \frac{1}{6} \theta^3$ et $\cos \theta = 1 - \frac{1}{2} \theta^2$ vnde fit

$\theta \cot \theta$

$$\theta \cot. \theta = \frac{\theta \cos. \theta}{\sin. \theta} = \frac{1 - \frac{1}{2} \theta \theta}{1 - \frac{1}{6} \theta \theta} = 1 - \frac{1}{3} \theta \theta$$

hincque erit

$$e^{\theta \cot. \theta} = e \cdot e^{-\frac{1}{3} \theta \theta} = e (1 - \frac{1}{3} \theta \theta)$$

ex quo valore colligimus

$$x = e (1 - \frac{1}{3} \theta \theta) \text{ et } y = e \theta (1 - \frac{1}{3} \theta \theta)$$

hincque quoniam

$$lr = \frac{\theta}{y} \text{ erit } lr = \frac{1}{e (1 - \frac{1}{3} \theta \theta)} = \frac{1 + \frac{1}{3} \theta \theta}{e}$$

unde patet, fore $lr > \frac{1}{e}$, ideoque $r > e^{\frac{1}{e}}$, simulque intelligitur quantumvis magnum valorem ipsi r tribuere velimus, semper pro θ angulum convenientem assignari posse, quandoquidem eius valor iam in infinitum augebitur, si capiatur $\theta = 180^\circ = \pi$. Casus hic prae caeteris memoratu dignus occurrit, quando capitur $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$; tum enim ob $\cot. \theta = 0$ fiet $x = 0$ at $y = 1$

hincque porro $lr = \frac{\pi}{2}$ ideoque $r = e^{\frac{\pi}{2}}$; tum igitur erit

$$r^x + y^y - 1 = e^{\frac{1}{2} \pi \sqrt{-1}} = \sqrt{-1}$$

id quod egregie conuenit cum formulis iam pridem cognitis, quibus, sumendis logarithmis, erat $\frac{1}{2} \pi \sqrt{-1} = l \sqrt{-1}$ siue $\frac{1}{2} \pi = \frac{l \sqrt{-1}}{\sqrt{-1}}$ vel etiam $\pi = \frac{l - 1}{\sqrt{-1}}$.

Consideratio casuum,
quibus radix r vnitatē minor accipitur.

§. 30. Hic ante omnia obseruandum est omnes terminos nostrae seriei $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ etc. tanquam vnitatē minores spectari posse; quantumvis enim magnus primus α accipiatur veluti $\alpha = 10$, secundus $\beta = r^{10}$ eo minor erit fractio, quo maior fuerit α . Quam ob rem, ne calculus logarithmicus instituendus turbetur, tam loco radice r , quam singulorum terminorum

nostrae progressionis fractiones in calculum introducamus, fitque $r = \frac{1}{2}$; $a = \frac{1}{2}$; $\beta = \frac{1}{2}$; $\gamma = \frac{1}{2}$; $\delta = \frac{1}{2}$ etc. et cum fit

$$\beta = r^a \text{ erit } \frac{1}{b} = \frac{1}{s^a} \text{ ideoque } s^a = b$$

Per logarithmos ergo erit $\frac{1}{a} l s = l b$ siue $l s = a l b$; porro $l l s = l a + l l b$ ideoque $l l b = l l s - l a$, cuius formulae ope ex datis s et a reperitur b ; similique modo erit $l l c = l l s - l b$ et $l l d = l l s - l c$ et ita porro.

§. 31. Illustremus nunc casum exemplo, fitque $r = \frac{1}{2}$ fumaturque $a = \frac{1}{2}$; erit $s = 2$ et $a = 2$; vnde calculus ita se habebit

$$a l l s = 9,4786098$$

$$\text{subtr. } l a = 0,3010300 \text{ propterea quod } a = 0,5000$$

$$l l b = 9,1775798$$

$$l b = 0,1505150 \text{ hinc } l \beta = 9,8494850 \text{ hinc}$$

$$\beta = 0,70710$$

$$l l s = 9,4786098$$

$$l b = 0,1505150$$

$$l l c = 9,3280948$$

$$l c = 0,2128604 \text{ hinc } l \gamma = 9,7871396 \text{ vnde}$$

$$\gamma = 0,61254$$

$$l l s = 9,4786098$$

$$l l d = 9,2657494$$

$$l d = 0,1843951 \text{ hinc } l \delta = 9,8156049 \text{ ergo}$$

$$\delta = 0,65404$$

$$l l s = 9,4786098$$

$$l l e = 9,2942147$$

$$l e =$$

$$le = 0,1968859 \text{ hinc } la = 9,8031141 \text{ ergo}$$

$$lls = 9,4786098$$

$$llf = 9,2817239$$

$$lf = 0,1913039 \text{ hinc } lz = 9,8086961 \text{ ergo}$$

$$\zeta = 0,64371$$

$$lls = 9,4786098$$

$$llg = 9,2873059$$

$$lg = 0,1937789 \text{ hinc } ld = 9,8062211 \text{ ergo}$$

$$\theta = 0,64006$$

§. 32. Hinc igitur elucet terminos nostrae progressionis continuo magis ad certum quendam valorem fixum conuergere, quem alternatim superant ab eoque deficiunt, qui valor circiter erit 0,64, ad quem simul ac fuerit peruentum, sequentes omnes ipsi manebunt aequales. Ad hunc valorem fixum inueniendum obseruemus logarithmos numerorum a, b, c, d etc. conuergere ad valorem propemodum 0,192; unde si verum medium sit lm necesse est vt fiat $lm + llm = lls$; hanc autem inuestigationem aliter nisi tentando elicere non licet, quod per aliquot hypothesen exequemur:

$lm =$	0,192	0,1925	0,1928	0,1929
add. $llm =$	9,2833012	9,2844307	9,2851070	9,2853322
debe. esse	9,4753012	9,4769307	9,4779070	9,4782322
est ver. $lls =$	9,4786098	9,4786098	9,4786098	9,4786098
error (-)	0,0033086	0,0016791	0,0007028	0,0003776

$$lm =$$

$lm =$	0,1930	0,1931
add. $llm =$	9,2855573	9,2857823
debebat esse	9,4785573	9,4788823
est vero $lls =$	9,4786098	9,4786098
error	-0,0000525	+0,0002725

Patet igitur verum valorem subsistere inter binas postre-
mas hypotheses 0,1930 et 0,1931, quarum differentia est
0,0001, ex qua oritur differentia errorum 0,0003250; debe-
bat autem esse 0,0002200; quare ut summa errorum ad diffe-
rentiam hypothesisum, ita error penultimus ad excessum
veritatis super penultimam; quocirca verus valor erit
 $lm = 0,1930161$, cuius complementum est, 9,8069839, cui
respondet terminus progressionis quaesitus 0,64118, ad quem
termini alternatim continuo propius accedunt.

§. 33. Ex his intelligitur, semper eiusmodi exponen-
tem w definiri posse, ut fit $r^w = w$; siue posito $w = \frac{1}{z}$, ut fit $s^{\frac{1}{z}} = z$
siue $s = z^z$. Quoniam enim s est numerus unitate maior, sem-
per assignari poterit eiusmodi numerus z ut fiat $z^z = s$.

§. 34. In exemplo quidem ante euoluto, quo erat $r = \frac{1}{25}$,
termini nostrae progressionis continuo propius consergebant
ad valorem quendam fixum; verum hic ingens discrimen oc-
currit, quando pro r sumitur fractio valde exigua, veluti si
sumamus $r = \frac{1}{25}$ siue $s = 25$ et calculum ut supra instituiamus,
incipiendo ab $a = 2$ ob $ls = 1,3010300$ calculus ita se habebit

$$\begin{aligned}
 a \quad ll s &= 1,1142873 \\
 \text{subtr. } la &= 0,3010300 \text{ hinc } a = 0,50000 \\
 ll b &= 9,8132573 \\
 ll b &= 0,6505149 \text{ hinc } l\beta = 9,3494841 \text{ ergo } \beta = 0,22360 \\
 ll s &= 0,1142873
 \end{aligned}$$

$ll c =$

$$llc=9,4637724$$

$$lc=0,2609192 \text{ hinc } l\gamma=9,7090808 \text{ ergo } \gamma=0,51177$$

$$lls=0,1142873$$

$$lld=9,8233681$$

$$ld=0,6658373 \text{ hinc } l\delta=9,3341627 \text{ ergo } \delta=0,21585$$

$$lls=0,1142873$$

$$lle=9,4484500$$

$$le=0,2808342 \text{ hinc } e=9,7191658 \text{ ergo } e=0,52380$$

$$lls=0,1142873$$

$$llf=9,8334531$$

$$lf=0,6814800 \text{ hinc } f=9,3185200 \text{ ergo } f=0,20821$$

$$lls=0,1142873$$

$$llg=9,4328043$$

$$lg=0,2708988 \text{ hinc } g=9,7291012 \text{ ergo } g=0,53592$$

etc.

etc.

§. 35. Hinc ergo clare perspicitur, terminos huius progressionis continuo longius a se invicem recedere atque alternatim ad duos valores fixos appropinquare, quorum maior erit $\frac{1}{2}$, minor vero erit $\frac{1}{3}$. Hoc ergo singulare phenomenon sine ullo calculo in hoc simplici exemplo, quo $r = \frac{1}{x}$ et $a = \frac{1}{y}$, consideremus; tum enim erit $\beta = \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2}$, $\gamma = \frac{1}{x^3}$, $\delta = \frac{1}{x^4}$ etc. omnes igitur termini alternatim erunt $\frac{1}{x^2}$ et $\frac{1}{x^3}$. Ut igitur hos duos limites fixos inuestigemus, quoties quidem tales occurrunt, designemus eos litteris Φ et Ψ , ita ut sit $r^\Phi = \Psi$ et $r^\Psi = \Phi$, siue si ponamus $r = \frac{1}{x}$, $\Phi = \frac{1}{x^2}$ et $\Psi = \frac{1}{x^3}$, pro dato valore s requiruntur bini numeri x et y , ut fiat $s = x^2$ et $s = y^3$.

§. 36. Sumptis ergo logarithmis erit primo $ls = ylx$ et $ls = xly$, ita ut esse debeat $ylx = xly$. Ponatur hic $y = px$ fietque $plx = lp + lx$, unde colligitur $lx = \frac{lp}{p-1}$ ideoque

$$x = p^{\frac{1}{p-1}} \text{ atque } y = p^{\frac{p}{p-1}}; \text{ porro vero habebitur } ls = \frac{p^{\frac{p}{p-1}} lp}{p-1}.$$

§. 37. Hinc iam primo discimus casum duorum limitum fixorum locum habere non posse, nisi valor ipsius s in hac aequatione

$$ls = \frac{p^{\frac{p}{p-1}} lp}{p-1}$$

contineatur; tum vero ambo illi limites erunt $x = p^{\frac{1}{p-1}}$ et $y = p^{\frac{p}{p-1}}$, quae ergo eo magis a se inuicem discrepabunt, quo maior numerus pro p accipiat; aliquos igitur casus iuuabit attulisse. Sit. primo $p = 2$ eritque $x = 2$ et $y = 4$ ideoque $s = 16$, ita ut sit $r = \frac{1}{16}$; $\Phi = \frac{1}{2}$ et $\Psi = \frac{1}{4}$, quem casum iam supra sumus contem-

plati; sit nunc $p = 3$ eritque $x = 3$ et $y = 27$, tum vero $s = (\frac{27}{3})^2$;

consequenter erit $r = (\frac{3}{27})^2$, $\Phi = \frac{2}{3}$ et $\Psi = \frac{1}{27}$.

§. 38. Hinc autem quoque ipsum limitem assignare poterimus, quem simul ac numerus s superauerit, bini valores fixi x et y se exerant. Evidens autem est hunc limitem constitui debere in eo loco, ubi bini numeri x et y fiunt aequales, siue ubi $p = 1$; supra autem vidimus hoc casu fieri $x = e$ simulque $y = e$, denotante e numerum, cuius logarithmus hyperbolicus $= 1$, tum vero erit $s = e^e$; quam ob rem habebimus

$$r = \frac{1}{e^e} \text{ et } \Phi = \Psi = \frac{1}{e}, \text{ unde patet huiusmodi binos valores semper locum habere, quando radix } r \text{ minor fuerit quam } \frac{1}{e^e}.$$

§. 39. Operae igitur pretium erit hunc ipsum limitem accuratius definire; cum igitur sit $e = 2,7182818$,

$$le =$$

$le = 0,4342944$ et $ls = ele$, erit $lls = le + lle = 0,0721786$ ideoque $ls = 1,1808000$, hinc $lr = 8,8192000$, consequenter $r = 0,065948$, siue etiam $r = \frac{1}{15,164}$; unde intelligitur quamdiu radix r maior fuerit hac fractione $\frac{1}{15,164}$, tum omnes terminos nostrae progressionis semper ad certum limitem fixum conuergere; contra autem quando fuerit $r < \frac{1}{15,164}$ tum accessionem ad duos limites diuersos alternatim conuergere.

De theoremate, quod Illustr. *Marchio de Condorçet* nobiscum communicauit.

§. 40. His mirabilibus phoenomenis perpenfis multo facilius erit vim memorati theorematis circa hoc ipsum argumentum intelligere; descripsit autem vir illustris seriem quandam infinitam, cuius termini lege tantopere perplexa formari debent, ut eius indolem non nisi summa patientia adhibita perspicere licet, istius autem seriei summam affirmat esse talem formulam exponentialem replicatam, quam hactenus fufius sumus perscrutati; demonstrationem quidem non addidit: manifestum autem est, eam per inuersionem ex solutione sequentis problematis erui debere.

Problema.

Sumpta pro libitu radice r , si formata fuerit ista progressio $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ etc. ita ut sit $\beta = r^\alpha$, $\gamma = r^\beta$, $\delta = r^\gamma$ etc. tum eam inuestigare progressionem, quae resultabit, si primus exponentis in quapiam quantitate siue augeatur siue minatur.

Solutio.

§. 41. Ponamus igitur primum exponentem esse $\alpha(1+z)$ similique modo pro sequentibus terminis statuamus

$$r^{\alpha(1+z)} = \beta(1+z'); \quad r^{\beta(1+z')} = \gamma(1+z''); \\ r^{\gamma(1+z'')} = \delta(1+z''') \text{ etc.}$$

H 2

quo

quo pacto progredi licebit, quovisque lubuerit; horum vero terminum ultimum illustris auctor indefinitum assumpsit.

§. 42. Cum igitur sit $r^{\alpha}(1+z') = \beta(1+z')$ ideoque ob $r^{\alpha} = \beta$ habebitur $r^{\alpha z} = (1+z')$, unde quantitatem z' erui oportet; cum igitur $r^{\alpha z}$ per seriem infinitam sit

$$1 + \alpha z' r + \frac{1}{2} \alpha^2 z'^2 (r)^2 + \frac{1}{6} \alpha^3 z'^3 (r)^3 + \frac{1}{24} \alpha^4 z'^4 (r)^4 + \frac{1}{120} \alpha^5 z'^5 (r)^5 + \text{etc.}$$

assequimur hanc determinationem aequalem isti z' seriei, primo termino sublato. Ponamus autem brevitatis gratia $\alpha z' r = v$ ut fiat

$$z' = v + \frac{1}{2} v^2 + \frac{1}{6} v^3 + \frac{1}{24} v^4 + \frac{1}{120} v^5 + \text{etc.}$$

Cum autem sit $\alpha r = 1/\beta$ erit $v = z'/\beta$ sicque facili negotio valor z' definietur.

§. 43. Simili modo cum sit $r^{\beta}(1+z'') = \gamma(1+z'')$ unde ob $r^{\beta} = \gamma$, si brevitatis gratia ponamus $\beta z'' r = v'$, ita ut sit $v' = z''/\gamma$, colligitur fore

$$z'' = v' + \frac{1}{2} v'^2 + \frac{1}{6} v'^3 + \frac{1}{24} v'^4 + \frac{1}{120} v'^5 + \text{etc.}$$

simili modo si porro ponamus $\gamma z'' r = z'''/\delta = v''$ erit

$$z''' = v'' + \frac{1}{2} v''^2 + \frac{1}{6} v''^3 + \frac{1}{24} v''^4 + \frac{1}{120} v''^5 + \text{etc.}$$

Porro vero si fiat $v''' = z'''/\epsilon$ erit

$$z''' = v''' + \frac{1}{2} v'''^2 + \frac{1}{6} v'''^3 + \frac{1}{24} v'''^4 + \frac{1}{120} v'''^5 + \text{etc.}$$

quae progressio iam facillime percipitur, ac si continuo ipsam quantitatem z substituere velimus, nullum est dubium, quin ipsa series ab illustri Condorcet proposita oriatur.