

14. Atque ita primo casui problematis kepleriani de stationibus abunde satisfactum est. Quod alterum casum attinet, (in quo dantur apsidum ad inuicem positio, vniusque planetae anomalia, quaeritur autem altera stationaria;) attendenti facile patebit, posse, ope antecedentium, solutionem eius exhiberi quoque aequatione algebraica. Verum quia illa ad sextam dimensionem ascendit, nec vlla eam deprimendi spes est, inutilem prorsus ad praxin astronomicam censeo. Quamobrem eius loco commendare malo indirectam solutionem, sumendo anomalias quaesitam ex coniectura prope veram, atque ita inquirendo commutationem stationariam per problema antecedens, qua inuenta positio prima corrigatur, et calculus repetatur donec sibi consentiat et veritatem exacte prodat.

PROBLEMATIS

Traiectoriarum Reciprocarum

Solutio.

Auctore

Leonhardo Eulero, Basil.

I.

M. Jul.
1727.

Problema, de quo in hoc schediafmate agere constitui, est celebre illud et in Actis Lips. multum agitatum, de inueniendis curuis, quae intra datas parallelas eadem recto et inuerso situ positae et secundum parallelarum directionem hinc inde
mo.

motae, mutua interfectione vbiq; angulum eundem constituunt, Problema in Act. Lipf. Suppl. T. VII. a beate hic defuncto Nicolao Bernoulli propositum Ita autem cum hoc problemate res se habet, vt infinitae, tam algebraicae, quam transcendentis curuae satisfaciant. Quapropter ad plenam eius et perfectam solutionem requiritur, vt exhibeatur methodus, qua curuae satisfacientes omnes inueniri queant, simplicissima autem tam algebraicae quam transcendentis re ipsa eruantur.

II. Dedi nuper, occasione quaestionis, quae Cel. Bernoullio cum Anglo quodam est nomen celante, de inueniendis traiectoriis reciprocis algebraicis simplicissimis, in Act. Lipf. A. 1727 methodum, qua ex quolibet curuarum ordine, excepto secundo et tertio, (ex quorum posteriore quidem alia via curua satisfaciens inueniri potest), vna ad minimum traiectoria reciproca exhiberi potest, vna cum generali modo, omnes traiectorias reciprocas algebraicas ex curuis cuspide et circa cuspidem ramis similibus et aequalibus praeditis et algebraicis, deriuandi. Animus hic est generalem huius problematis solutionem largiri, ex eaque infinitas formulas generales algebraicas easque maxime foecundas deducere. Quibus adiungam problematis cuiusdam agnati, de inueniendis traiectoriis reciprocis vno plures axes habentibus, solutionem.

III. Problema ad analyfin magis accommodatum sic sonat: *Inuenire curuam CBD circa axem AB, talem, vt ductis duabus rectis MP, NQ, ab axe vtrunque aequidistantibus eique parallelis, summa angulorum PMB +*

M 2

QND

Fig. I.

QND , sit ubique constans, aequalis nimirum duplo anguli DBA , quem axis cum curua constituit. Inuersa enim CBD circa axem AB , cadet applicata QN super PM , tum moueatur, donec applicatae QN punctum N incidat in punctum M , et curua sic situ inuersa sit cbd oportet angulum intersectionis BMd esse constantem: Sunt autem anguli Pm , et QND aequales, consequenter summa angulorum, $PMB + QND$, debet esse constans. Crescentibus ergo ex vna parte axis AB , angulis applicatarum cum curua, ex altera parte tantundem decrescere debent.

IV. Ducta ad axem AB , normali PQ , erit $AP = AQ$, ducantur duae proximae respondentes applicatae, pm , qn . Erit $Pp = Qq$. Ducantur ex M et N , tangentes MR , NS , vt habeantur anguli RMm , SNn , quorum ille est decrementum anguli PMB , hic incrementum anguli QND . Quocirca erit ex conditione problematis $RMm = SNn$. Vnde natura curuae inuestigari debet.

V. Sumatur vbique in applicata MP producta, PF , proportionalis angulo RMm , assumpto elemento Pp , abscissae AP pro constante, erit punctum F in curua quadam, cuius diameter erit axis traiectionis BA , erit enim vbique $PF = QG$. Quare tota difficultas eo est reducta, vt ex curua FEG data altera CBD , in qua elementa angulorum BMP sint respondentibus applicatis PF proportionales construatur; Et vt curua CBD euadat traiectionis reciproca, curua FEG debet habere diametrum, et circa eam ramos similes et aequales, cuiusmodi est FEG .

Cur-

Curua MBN ex ea constructa erit traiectoria reciproca, cuius axis est EB, diameter prioris curuae.

VI. Sit $AP=x$. $PM=y$ $PF=u$. Erit angulus RMm , vt $ddy:(dx^2+dy^2)$. Ergo $u=ddy:(dx^2+dy^2)$ posito dx constante, ex qua aequatione datis u et x inueniri debet, y . Ponatur $dy=pdx$. erit $ddy=dpdx$. ergo $u=\frac{dp}{dx+ppdx}$ et $udx=\frac{dp}{1+pp}$. Ex qua aequatione, ob u et x datas, p inuenitur, indeque y ; est autem $\frac{dp}{1+pp}$ duplum elementum sectoris circularis, cuius radius est, 1. et tangens p ; erit ergo $\frac{1}{2}fudx$ sectori isti circulari. Est vero $fudx$ areae APEF, demta vel addita constante inuenitur ergo per quadraturas, p , indeque rursus per quadraturas y sequenti modo.

VII. Sit data quaecunque curua IEK diametro EA praedita; super recta AO diametrum EA normaliter secante, accipiatur punctum quoduis O, quo centro et radio arbitrario OD describatur circulus DGH, et ex D ducatur tangens DQ. Ducta quacunque applicata PF, spatio PFID aequalis sumatur sector DOG, et producat DG in Q. ex Q ducatur ipsi DA parallela QN, occurrens applicatae FP productae in N; Erit punctum N in curua DN tali, vt sit $PN=p$, si sit $AP=x$. Hic dimidium, quod superiore §. inuentum est, negligitur, cum enim $ddy:(dx^2+dy^2)$ saltem proportionetur ipsi u , etiam $fudx$, tantum proportionalis assumi potest, sectori DOG. vnde nihil interest siue dimidius sector siue totus sumatur, et dein siue $fudx$ ab applicata DI, siue ab AF computeur.

Fig. II.

VIII. Inuenta curua DN facili negotio habetur curua DM traiectoria reciproca, cum enim fit $dy = p dx$ accipiatur vbique PM proportionalis areae DPN, erit punctum M, in traiectoria reciproca, cuius axis est AB, diameter curuae IEK assumtae. Apparet hic simul, infinitas, ex vnica assumta IEK, traiectorias reciprocas inueniri posse, prout enim transversalis DA aliter ducitur, punctaque O et D aliter assumuntur, ita aliae resultant traiectoriae reciprocae. Dein etiam pro varia ratione, quae ponitur inter PM spatium DPN, traiectoriae variae formantur. Vnde patet data vna traiectoria reciproca, applicatas in eadem ratione augendo vel diminuendo, infinitas inueniri alias traiectorias reciprocas.

IX. Si spatium DPFI aequale accipiatur quadranti ODH, tangens DQ ipsique aequalis applicata PN euadit infinita, eritque tum PN asymptotos curuae DN; Sin spatium illud maius fuerit quadrante, applicata PN erit negatiua. Traiectoriae autem DM applicata PM euadet, vbi PN est infinita, tangens curuae. Et deinde abeunte PN in negatiuam applicata PM decrescet, quare curua DM habebit in M punctum reuersionis. Si spatium DPN, existente PN asymptoto, est infinitum, applicata PM quoque erit infinita, adeoque asymptotos etiam curuae DM.

X. Sit exempli gr. $u = \frac{aab}{xx+aa}$ et hinc eruatur aequatio inter x et y cum sit u , vt $ddy : (dx^2 + dy^2)$ erit $b dx^2 + b dy^2 = a a ddy + x x ddy$ ponatur $dy = p dx$ erit $ddy =$
 $dp dx$

$dpdx$, quibus valoribus substitutis habetur $b dx + b p p dx = a a d p + x x d p$. Ergo $\frac{b dx}{a a + x x} = \frac{d p}{1 + p p}$ cuius aequationis utriusque membri integratio a circuli quadratura dependet. Huc autem aequatio ea reducetur

$\frac{b}{a} \left(\frac{dx}{a + x \sqrt{-1}} + \frac{dx}{a - x \sqrt{-1}} \right) = \frac{d p}{1 + p \sqrt{-1}} + \frac{d p}{1 - p \sqrt{-1}}$. Quae integrata abit in hanc $b l(a + x \sqrt{-1}) - b l(a - x \sqrt{-1}) = a l(1 + p \sqrt{-1}) - a l(1 - p \sqrt{-1}) + a l b$ erit ergo $\left(\frac{a + x \sqrt{-1}}{a - x \sqrt{-1}} \right)^{\frac{b}{a}} = \frac{b + b p \sqrt{-1}}{1 - p \sqrt{-1}} = \frac{b dx + b dy \sqrt{-1}}{dx - dy \sqrt{-1}}$. Sit $b = a$, et $b = \sqrt{-1}$ erit $\frac{a + x \sqrt{-1}}{a - x \sqrt{-1}} = \frac{dx + dy \sqrt{-1}}{dx - dy \sqrt{-1}}$ quae reducta dat $dy = \frac{x - a}{x + a} dx$. Si fit $b = 2a$ manente $b = \sqrt{-1}$ erit $dy = \frac{2ax + xx - aa}{2ax - xx + aa} dx$. Et ita porro; sed huiusmodi exemplis non immoror, fusius de iis infra agetur.

XI. Quum curvae genitricis IEK diameter EA sit axis traiectoriae inde genitae, manifestum est, si illa curva plures vna diametros habuerit, traiectoriam inde ortam plures axes etiam habituram, si ergo loco curvae IEK curva infinitarum diametrorum adhibetur, traiectoria infinitos etiam axes habebit. Quando autem traiectoria desideratur, quae axium datum habeat numerum, id aliter interpretandum est. Vt enim omnis curva vna plures diametros habens necessario infinitas habet, ita etiam traiectoria reciproca, quae vno plures, infinitos necessario axes habebit. Sed quia traiectoria infinitorum axium infinita habere debet puncta reversionis, datus axium numerus ad vnam tantum curvae portionem intra duo puncta flexus proxima comprehensam referendus

dus est. Desideratur enim curua omni irregularitate, cuiusmodi est flexura et reflexio, destituta.

Fig. III. XII. Sit curua $IEKek$ infinitis praedita diametris, $EA, KL, ea, kl.$ et abscindatur area $DBTI =$ quadranti ODH , linea TB producta asymptotos erit curuae DNV , et tanget traiectoriam in C , ubi est punctum reflexionis. Portio ergo traiectoriae DMC , talis erit, de qua est quaestio numeri axium dati. Haec vero portio tot habebit axes, quot diametri fuerint in spatio $DBTI$. Quo circa in arbitrio nostro positum erit numerum axium definire hoc modo: Proposito numero axium abscindatur spatium $DBTI$ eundem diametrorum numerum comprehendens, tum describatur circulus ODG tantus ut eius quadrans ODH adaequet abscissum spatium $DBTI$ manifestum est, hoc modo generari curuam desideratam.

XIII. Si loco curuae $IEKek$ adhibeatur linea recta ipsi DB parallela, quaelibet applicata FP erit diameter, ergo et traiectoriae DMC quaeuis applicata erit axis. Atque haec est illa curua de qua Cel. Bernoullius sub pantogoniae nomine, fusius in *Actis Erud.* 1726 egit. Aequatio eius naturam exprimens, erit $1 = addy(dx^2 + dy^2)$ seu $dx^2 + dy^2 = addy$ cuius haec est proprietas, vt, radii secundum axium directionem incidentibus, radii reflexi omnes sint inter se aequales. Facilius autem curua haec sic construatur, vt accipiatur $x = \int \frac{aady}{aa+pp}$ et $y = \int \frac{apdp}{aa+pp}$.

XIV. Methodum hanc inueniendi traiectorias reciprocas per duplicem quadraturam, non eo fine attuli

vt

vt inde traectoriae reciprocae eruantur ; id quod vix praestari posset, si simplices vel algebraicae desiderentur, sed vt inde adipiscar solutionem problematis de inueniendis traectoriis reciprocis pluribus vno axibus gaudentibus, quod Anonymus Anglus Cel. Ioh. Bernoullio proposuit. At nunc ad alium pergo modum perquam foecundum in exhibendis traectoriis simplicioribus, et praecipue algebraicis. Persequar autem hic illum tantum problematis casum, quo angulus intersectionis ponitur rectus ; cum facillime reliqui casus omnes ad hunc reducantur.

XV. Sit CBD traectoria orthogonalis, cuius axis sit AB quem ad angulos rectos fecerit recta PQ; Ducantur duae applicatae PM, QN, axi AB parallelae, vtrinque aequae distantes ab eodem, illisque proximae, pm qn , nec non basi PQ parallelae MR, NS. Erunt triangu- Fig. IV. gula MRm , nSN , similia, ob $SnN + RmM = \text{recto}$. Sint $AP = x$ $PM = y$, erunt $Pp = MR = dx$, $Rm = dy$ nec non $AQ = -x$, $Qq = NS = -dx$; sit $QN = z$, seu $Sn = dz$. Ex similitudine triangulorum MRm, nSN deducetur $MR(dx) : Rm(dy) = Sn(dz) : SN(-dx)$ vnde erit $dydz = -dx^2$. Ex qua aequatione inueniri debet y . Etenim z ab y dependet, quia in expressione ipsius y , posito loco $x, -x$, habetur z .

XVI. Ponatur $dy = p dx$, est autem p functio ipsius x . Abeat ea, posito $-x$, loco x in q , erit $dz = -q dx$ et consequenter erit $p q = 1$. Vnde patet, loco p talem sumi debere ipsius x functionem, ex qua factum in eadem, sed loco x posito $-x$ adaequet unitatem. Totum

Tom. II. N ergo

ergo huius solutionis artificium huc redit, vt idoneae eligantur functiones ipsius, x loco p substituendae. Ad hoc autem, nisi fortunae earum inuentionem committere velimus, accuratior functionum requiritur cognitio. Cuius, vt quasi prima elementa iaciam, sequenti modo eas discernere commodum visum est.

XVII. Primo loco notandae sunt functiones, quas pares appello, quarum haec est proprietas, vt immutatae maneant, etsi loco x , ponatur $-x$. Huiusmodi sunt omnes potentiae ipsius x , quarum exponentes sunt numeri pares, aut fractiones, quarum numeratores sunt numeri pares, denominatores vero impares: Dein quaecunque functiones ex huiusmodi potentiis vel additione vel subtractione, vel multiplicatione vel diuisione, vel denique ad potentiam quamcunque elevatione componuntur, sunt itidem pares ut $x^{\frac{4}{5}}, (ax^2 + bx^{\frac{2}{3}})^n$

XVIII. Secundo functiones impares obseruo, quae prorsus sui negatiuas producant, si x , abit in $-x$. Cuiusmodi sunt x ipsum, x^3 , x^5 etc. omnes potentiae, quarum exponentes sunt numeri impares, vel fractiones, quarum numeratores et denominatores sunt numeri impares, nec non functiones, quae harum potentiarum additione vel subtractione, etiam elevatione ad exponentis imparis dignitatem componuntur, vt, $x^{\frac{3}{5}}, (ax^3 + bx^{\frac{5}{7}})^3$

XIX. Si functio impar per imparem multiplicatur, factum semper erit functio par, ut x^3 in $x^{\frac{1}{3}}$, data $x^{\frac{10}{3}}$.
At functio par in imparem ducta semper quidem impar
rem

rem producit, interdum tamen ea simul pro pari haberi potest, vt $x\sqrt{(aa+xx)}$ est functio simul par et impar, quippe eadem cum $\sqrt{(aaxx+x^4)}$, quae est par. Quod autem de elevatione functionis paris ad dignitatem quamuis supra dictum est, quod potentia sit quoque par, si exponens sit fractio, cuius denominator numerus par, v. g. $\frac{1}{2}$, restrictio adhibenda est, nisi radix re ipsa extrahi queat, vt $(\frac{aa}{xx}+2a+xx)^{\frac{1}{2}}$ non est functio par, conuenit enim cum $\frac{a}{x}+x$. De huiusmodi autem functionibus iudicium facile patet.

XX. Praeterea obseruatu dignae sunt functiones reciprocae, quae mihi sunt functiones posito in iis $-x$, loco x , abeuntes in tales, quae in illas ductae producunt unitatem, vt $(\frac{a+x}{a-x})^n$, quae, posito x negatiuo, abit in hanc $(\frac{a-x}{a+x})^n$, cuius in illam factum est $=1$. Huc referendae quoque sunt exponentiales a^x , $(aa+xx)^x$ etc. omnes nempe functiones pares eleuatae ad functiones impares.

XXI. Hisce de functionibus praemissis manifestum est, p esse functionem ipsius x reciprocam, cum sit $pq=1$. Quemadmodum autem huiusmodi functiones reciprocae inueniendae sint, breui ostendere conabor; Sed primo de functionibus exponentialibus nihil intermiscere constitui, cum ante omnia traiectiones reciprocas algebraicas eruere animus sit. Postmodum autem de exponentialibus quaedam subiungam.

XXII. Vt autem rem generalius absoluam, assu-

mo tertiam variabilem t , et inuestigabo, quomodo x et y in t , determinari debeant, vt traiectoria reciproca resultet, pono itaque $dx=r dt$, et $dy=p dt$. Efficiendum ergo est, vt posito t negatiuo, et dx in negatiuum abeat. Quare loco r ponatur oportet functio ipsius t par, quae sit N ; erit $dx=N dt$, et abeunte t in negatiuum, erit $dx=-N dt$. Consequenter ob $d \cdot dx=-dx^2$, posito in casu $-t$, loco p, q , vt ante, habebitur $p q=NN$.

XXIII. Ponatur $p=(P+Q)^n$ denotante P functione pare et Q impare ipsius t , erit $q=(P-Q)^n$ adeoque $(PP-QQ)^n=N^2$; ergo $PP=N^{\frac{2}{n}}+QQ$, et $P=V(N^{\frac{2}{n}}+QQ)$ erit ergo $p=(Q+V(N^{\frac{2}{n}}+QQ))^n$. Nihil contradictorii hic latet in aequatione $P=V(N^{\frac{2}{n}}+QQ)$ etenim P , quae functio par esse debet, talis etiam in aequatione exhibetur. At si Q erueretur, inueniretur $Q=V(N^{\frac{2}{n}}-PP)$ id quod contradictionem inuoluit; nam Q , quae functionem imparem denotat, aequatur hic functioni pari. Vt fractiones in exponentibus eitem, scribo loco N, N^n et erit $dx=N^n dt$, et $dy=dt(Q+V(N^2+Q^2))^n$ potest hic loco Q , scribi NQ , (§. 19) et dein loco N^n , vt ante, N ; habebitur $dx=N dt$, et $dy=N dt(Q+V(1+QQ))^n$.

XXIV. Vt nouae formulae resultent, tollo irrationalitatem, ponendo $V(N^2+Q^2)=N+RQ$, erit $Q=\frac{2NR}{1-R^2}$ vnde R functio impar sit ipsius t necesse est, ob Q imparem, erit ergo $Q+V(N^2+Q^2)=\frac{N(1+R)}{1-R}$ (scripto loco R ,

eorum, $\frac{Q}{P} \frac{N(P+Q)}{P-Q}$. Denotabunt semper P pares et Q impares functiones ipsius t . Erit ergo $dx = N^n dt$, et $dy = dt \left(\frac{NP+NQ}{P-Q} \right)^n$; altera formula eodem modo tractata dat, $dx = N dt$, et $dy = N dt \left(\frac{P+Q}{P-Q} \right)^n$. Huiusmodi formulae generales infinitae possunt inueniri, alias aequationes loco $p = (P+Q)^n$ assumendo: cuiusmodi est haec formula $dx = N dt$, et $dy = N dt (P+Q)^{mn}$.

$(S + \sqrt{SS + (PP - QQ)^k})^{-\frac{m}{k}}$ denotante S functione impari, sed duabus formulis inuentis tanquam simplicissimis et foecundissimis in productione traectoriarum algebraicarum contentus ero, quarum altera irrationalitate est affecta, altera vero rationalis.

XXV. Accipio formulam priorem, casus quibus dy integrabile redditur, euoluturus. Sit primo $N = 1$ erit $dx = dt$ unde $dy = dx (Q + \sqrt{1+QQ})^n$. Pono porro $Q = x$ erit $dy = dx (x + \sqrt{1+xx})^n$ cuius integrale obseruo generaliter haberi posse; ponatur $x + \sqrt{1+xx} = u$, erit $x = \frac{uu-1}{2u}$, consequenter $dy = \frac{u}{2} du + \frac{u^{n-2}}{2} du$ et hinc $2y = \frac{u^{n+1}}{n+1} + \frac{u^{n-1}}{n-1} = \frac{(x + \sqrt{1+xx})^{n+1}}{n+1} + \frac{(x + \sqrt{1+xx})^{n-1}}{n-1}$ habetur er-

go hic aequatio algebraica generalis infinitas curuas supeditans, numeros rationales loco n substituendo.

XXVI. Antequam autem ad derivationem aequationum determinatarum ex generali pergam; quaedam ex aequatione differentiali deducenda sunt, quae ex inte-

grata difficilius eruerentur. Primo palam est, si fit $n=0$ trajectoriam tum esse lineam rectam, cum axe angulum semirectum constituentem, propter $dy=dx$. Dein, si fuerit $n=1$ erit $dy=x dx + dx\sqrt{1+xx}$; unde patet, hanc aequationem esse ad trajectoriam reciprocā, quae methodo Bernoulliana ope rectificationis parabolae constructur, quo vnico casu non absolute est integrabilis.

XXVII. Tertio, etsi loco n ponatur $-n$, aequationem nihilominus ad eandem fore curuam, abscissis saltem ex axis altera parte sumtis, seu existentibus negatiuis. Conueniunt enim duae hae expressiones $(-x + \sqrt{1+xx})^{-n}$ et $(x + \sqrt{1+xx})^{-n}$, vt cuius examinanti facile patebit. Nihil ergo in posterum lucraturus essem, loco n valores negatiuos substituendo. Quare substitutione numerorum affirmatiuorum tantum utar, cum ii soli sufficiant ad vniuersalem aequationem exhauriendam.

XXVIII. Excussi iam sunt casus, vbi $n=0$, et $n=1$ progredior vltius, sed integram aequationem in vsum vocando, et pono $n=2$. Erit $3y = 2x^3 + 3x + 2 + 2xx\sqrt{1+xx}$, quae ad rationalitatem reducta huc redit $12yx^3 + 18xy - 9yy + 3xx + 4 = 0$. Et haec aequatio quatuor dimensionum, sine dubio simplicissima est, post illam paraboloidem tertii ordinis: satisfacit adeo quaestioni, quam Cel. Bernoullius Anonymo Anglo proposuit, et ego repetii in Act. Erud: 1726. de inuenienda trajectoria algebraica, eam tertii ordinis, in simplicitatis ordine proxime excipiente.

XXIX. Si ponatur $n=3$ prodibit aequatio pro
linea

linea 5 ordinis haec $128yx^4 + 192yx^2 + 48y - 64xy - 8xx - 9 = 0$. Sit $n=4$ resultabit aequatio 6 ordinis, et hinc legitima inductione inferri potest, aequationem generalem ad rationalitatem reductam esse semper ordinis $n+2$. Id quod etiam in valoribus fractis loco n subrogatis obtinet. Si fit $n=\frac{1}{2}$ aequatio erit ordinis $\frac{5}{2}$. Quae autem, cum adhuc sit irrationalis, reducta erit ordinis quinti, et generaliter si fuerit $n=\frac{p}{q}$ aequatio reducta ascendet ad $p+2q$ ordinem.

XXX. Patet ergo aequationem generalem loco n alios atque alios valores substituendo, ex quolibet curvarum ordine, si excipias secundum et tertium, vnam ad minimum trajectoriam reciprocam exhibere. Et dato ordine curvarum, quot ex eo ope huius aequationis inueniri possint trajectoriae, facile determinare erit, nempe dispiciendum est, quoties $p+2q$ numerum dati ordinis producere queat, sed loco p et q numeri saltem affirmatiui et integri substitui possunt, et eiusmodi insuper vt $p:q$ ad minores terminos reduci nequeat. Sed de hac formula generali fusius in Act. Lips. 1727. actum est a me, ideoque hic ad aliam me conuerto.

XXXI. Adhaereo adhuc aequationi §. XXV. ad hanc reductae $dy=dx(Q+\sqrt{QQ+1})^n$. Circa quam obseruavi, nullis eam substitutionibus potentiarum rationalium, quales sunt x^3, x^5 etc. nec non x^{-1}, x^{-3} etc. loco Q factis, generaliter integrabilem reddi, quanquam utique passim reperiantur casus particulares integrabiles, quos autem persequi institutum minime permittit. At substituendo loco Q potentias ipsius x irrationales, sed legiti.

gitimas nempe functiones impares, quales sunt $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{2}{3}}, x^{\frac{4}{3}}$ et vbi numerator exponentis est vnitas, semper formulam integrabilem reddi obseruauit.

XXXII. Sit itaque $Q = x^{\frac{1}{3}}$, erit $dy = dx$
 $(x^{\frac{1}{3}} + \sqrt{x^{\frac{2}{3}} + 1})^n$. Quae vt integretur, pono
 $x^{\frac{1}{3}} + \sqrt{x^{\frac{2}{3}} + 1} = t$, erit $x^{\frac{1}{3}} = \frac{t^3 - 1}{3}$ unde $x = \frac{t^3 - 1}{3}$
 $\frac{1}{3t^2}$ adeoque $dx = \frac{3t^2 dt}{3} = t^2 dt$: ergo $dy =$
 $\frac{3t^{n+2}}{8} dt - \frac{3t^{n-2}}{8} dt + \frac{3t^{n-4}}{8} dt$. Consequenter $\frac{8y}{3} = \frac{3t^{n+3}}{n+3} - \frac{3t^{n-1}}{n-1} + \frac{3t^{n-3}}{n-3}$
 $-\frac{3t^{n-5}}{n-5} + \dots$

XXXIII. Sunt autem quidam casus, quibus integratio a logarithmis dependet, nempe si fuerit $n = 1$ vel 3 . Ceterae substitutiones omnes loco n factae suppeditant curuas algebraicas, idque vt superior secundum certam legem. Quod de superiori formula enunciatur est, valores ipsius n , negativos superfluos esse; idem etiam de hac, nec non de generalissima tenendum est. Quemadmodum et semper obtinet, si fiat, $n = 0$, tum trajectoriam degenerare in lineam rectam.

XXXIV. Casus huius aequationis simplicissimus sine dubio erit, quo $n = 2$. In eoque posito breuitatis ergo

ergo loco $x^{\frac{1}{3}}t$, reperietur $5y = 6t^5 + 5t^3 + (6t^4 + 2tt - 4) \sqrt{(1+tt)}$. Consequenter ad rationalitatem reducendo peruenietur ad hanc aequationem, $60t^5y + 50t^3y - 25y^2 - 60t^4 - 45t^6 + 16 = 0$.

Atque haec tandem, substituto $x^{\frac{1}{3}}$ loco t , abit in aequationem 8. ordinis. Si ponatur $n=4$ aequationem ad 10 dimensiones assurrecturam, facile praeuidere potui. Et aequationem generalem ad ordinem linearum $n+6$ esse referendam. Vt adeo et haec formula, ex quolibet curuarum ordine ad minimum vnam, si excipiantur 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9, trajectoriam exhibeat.

XXXV. Haec eadem formula, vt et reliquae, quae ex substitutionibus §. XXXI determinatis deducuntur, alia via ex altera aequationis generalis forma deriuantur. Et quam ideo paucis hic complectar, quod insuper ex ea plures formulae algebraicae generales, aliunde altioris indagationis, fluant. Aequatio generalis haec est, $dx = Ndt$, $dy = Ndt (Q + \sqrt{QQ+1})^n$. In qua si fiat $Q = x$, et successiue $N =$ vel 1 vel xx , vel x^4 etc. nec non vel $a + bxx$, $axx + bx^4$ et eiusmodi compositae functiones pares ipsius x subrogentur, aequatio generalis semper erit integrabilis et algebraicarum aequationum summopere foecunda.

XXXVI. Exposito modo, quo ad aequationes algebraicas generales peruenitur, examinandi sunt alii casus, quibus quidem aequatio generalis non integrabilis

redditur, nihilo tamen minus infinitis modis facilibus determinatu, algebraicas exhibere potest aequationes. Assumo hanc formulam $dx = N^n dt$ et $dy = dt(Q + \sqrt{(QQ + NN)})^n$, fiat $N = tt$ et $Q = t$ erit $dx = t^{2n} dt$ et $x = \frac{t^{2n+1}}{2n+1}$ et $dy = dt(t + t\sqrt{(1+tt)})^n$. Vnde patet hanc aequationem semper esse integrabilem si fuerit n numerus integer impar; id quod facile videre est, si reipsa ad dignitatem eleuetur.

XXXVII. Sunt autem insuper alii casus, quibus formula nostra integrabilis redditur, quos sic inuenio ponatur $t + t\sqrt{(tt+1)} = utt$, erit $t = \frac{2u}{uu-1}$, ideoque, $dt = -\frac{2uudu-2du}{(uu-1)^2}$; consequenter $dy = -\frac{2^{n+1} u^{3n} du(uu+1)}{(uu-1)^{2n+2}}$

vnde patet si fuerit n numerus negativus par, fore aequationem integrabilem, id quod patebit, si $(uu-1)^{-2n-2}$ ipso facto eleuetur. Plures casus elicientur, si fiat $t + \sqrt{(tt+1)} = ut$; et obtinebitur $dy = du(u^{\frac{3n+1}{2}} - u^{\frac{3n-1}{2}})$ $(u-2)^{\frac{n-1}{2}}$; quae erit integrabilis, primo si sit n quilibet numerus impar: dein si $\frac{3m+1}{2}$ fuerit numerus integer. Fiat ergo $\frac{3n+1}{2} = m$; erit $n = \frac{2m-1}{3}$ adeoque loco n poni potest fractio cuius denominator = 3 et numerator numerus impar.

XXXVIII. Vnicum exemplum attulisse sufficiat, sit $n = 1$. erit $dx = tdt$, et $t = \sqrt[3]{3x}$; deinde $dy = tdt + tdt\sqrt{(1+tt)}$: ergo $y = \frac{tt}{2} + \frac{(1+tt)^{3/2}}{3}$ vnde elicitur haec

haec aequatio ordinis sexti $(12yy - 12xx)^3 = 3456y^6 + 12528x^2y^3 - 432yx^4 - 2304y^4 - 288x^2y^2 + 81x^4 + 512y^3$. Possunt itaque infinitae aequationes algebraicae etiam ex hac aequatione $dy = dt(t + t\sqrt{1+tt})^n$ erui, et simili modo ex aliis formis, loco N vel Q; alios valores substituendo, casus, quibus hoc contingit, non superiori absimili modo detegentur.

XXXIX. Quae de priori duarum generalium formularum, irrationali hucusque tradita sunt, usum eius et foecunditatem satis superque commonstrant. Progredior nunc ad alteram formulam rationalem quae est, $dx = N^n dt$ et $dy = dt \left(\frac{N \cdot (P+Q)}{P-Q} \right)^n$ seu quod eodem redit, $dy = dt \left(\frac{N \cdot (1+Q)}{1-Q} \right)^n$. Non immoror hic deriuandis hinc curuis transcendentalibus nempe logarithmicae semirectangulae, si $Q=t, N=1$. et $n=1$. aut cycloidi, si $n=\frac{1}{2}$. quippe quae ab aliis iam fusius pertractatae sunt, propositum mihi est, vt in priori, quas ea sub se comprehendit curuas algebraicas, persequi, et regulas, quibus algebraicae inueniri queant, eruere.

XL. Ne autem fractio in causa sit, cur difficilius casus algebraici dignoscantur, eam tollo loco N. ponendo $N(1-QQ)$. Debet enim N esse functio par, ipsius $\frac{1}{2}$ Habebitur $dx = dt(N \cdot NQQ)^n$ et $dy = dt(N(1+Q)^2)^n$ seu $dx = N^n dt(1-QQ)^n$ et $dy = N^n dt(1+Q)^{2n}$. Vt hinc aequatio algebraica deriuari queat, oportet vt et dx et dy integrabile fiat. Ponatur $N=1$; erit $dx = dt(1-QQ)^n$ et $dy = dt(1+Q)^{2n}$; fit $Q=t$ erit $dx = dt(1-tt)^n$ et $dy = dt(1+t)^{2n}$ vnde $y = \frac{(1+t)^{2n+1}}{2n+1}$; ergo $\sqrt{(2n+1)y}$

$-1=t$. Vt igitur dx integrari queat, patet loco n substitui debere numerum integrum affirmatiuum.

XLI. Cum n sit numerus integer affirmatiuus, constituet $(1-tt)^n$, si in seriem conuertatur, progressionem numeri terminorum finiti, hanc $1 - \frac{n}{1} tt + \frac{n, n-1}{1, 2} t^4 - \frac{n, n-1, n-2}{1, 2, 3} t^6$

etc. Vnde obtinebitur $x = t - \frac{n, t^3}{1, 3} + \frac{n, n-1, t^5}{1, 2, 5} - \frac{n, n-1, n-2, t^7}{1, 2, 3, 7}$

etc. in qua si loco t substituatur valor inuentus $\sqrt[2n+1]{(2n+1)y-1}$ habebitur aequatio inter y et x adeoque pro curua quaesita.

XLII. Sit $n=1$ erit $x = t - \frac{1}{3}t^3 = \sqrt[3]{3y-1} - \frac{1}{3}$

$(\sqrt[3]{y-1})^3 = \sqrt[3]{9yy-y-\frac{2}{3}}$; ergo $(x+y+\frac{2}{3})^3 = 9yy$. Quae aequatio euadit tertii ordinis, et exprimit parabolam cubicalem semirectangulam, quae pro simplicissima omnium traiectoriarum reciprocarum algebraicarum habetur. De qua Cel. Ioh Bernoullius in Act. Erud. 1725. peculiari schediasmate egit. Sunt autem reliquae substitutiones loco n factae minus felices in exhibendis curuis simplicibus, posito enim $n=2$, aequatio iam ultra trigefimum gradum affurgit.

XLIII. Possunt loco Q aliae functiones ipsius t substitui, vt t^3 , t^5 aut t^7 etc. quae omnes formulam infinitis modis integrabilem reddent, semper nimirum quando n fuerit numerus affirmatiuus integer. Simili modo res se habet si alii loco N valores subrogentur. Sit nimirum $N=tt$ erit $dx = t^{2n} dt (1-QQ)^n$ et $dy = t^{2n} dt (1+Q)^{2n}$. Ponatur $Q=t$. erit $t^{2n} dt (1-tt)^n$ et $dy = t^{2n} dt$
(1+

$(1+t)^{2n}$. Vnde patet et x et y haberi posse modo sit $2n$ numerus integer. Si enim fuerit numerus par, facile patet omnia esse in simplices terminos resolubilia, si $2n$ fuerit numerus impar erit $(1-tt)^n$ irrationale, sed licet $2n$ sit numerus impar, nihilominus $t^{2n}dt (1-tt)^n$ erit integrabile.

XLIV. Sit $2n=1$ erit $dx = tdt\sqrt{1-tt}$ et $dy = tdt + ttdt$. Quare $x = -\frac{1}{3}(1-tt)^{\frac{3}{2}}$ et $y = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3$. Erit igitur $t = \sqrt{1 - \sqrt[3]{9xx}}$ ponatur $y + \frac{1}{8} = x$ habebitur reductione per acta, haec aequatio sexti gradus $(12uu + 24xx)^3 = 6912u^5 - 7344u^3xx - 11232ux^4 - 9216u^4 + 7488uuxx + 10125x^4 + 4096u^3$. Alii loco n , numeri substituti alias exhibebunt curvas algebraicas, deinde innumerabiles aliae loco Q et loco N substitutiones fieri possunt, quae semper, si n est numerus affirmatiuus integer, algebraicas efficient aequationes. Et haec praecipua sunt, quae de Algebraicis curuis afferri possunt.

XLV. Hisce coronidis loco subiungo alias formulas generales, quae resultant, si loco (vid. §. XXII.) p et q functiones exponentiales subrogantur. Habentur autem in exponentialibus et functiones pares et reciprocae, ut P^R est functio par, si sint et P et R functiones pares, at si fuerit R functio impar, erit ea functio reciproca, priori in casu abeunte x in $-x$ manet P^R , in posteriori mutatur in P^{-R} .

XLVI. Quibus ergo in locis, antea functiones pares substituere opus fuerat, poterunt huiusmodi ex-

ponentiales adhiberi, et loco functionum imparium similes exponentiales ductae in functionem impariendam vt $P^R Q$, existentibus P et R paribus functionibus et Q impari.

XLVII. Cum functiones reciprocae ita sint comparatae, vt factum earum in se ipsas, sed loco x posito $-x$, aequetur unitati, patet, quicquid sit p , semper ei insuper eiusmodi functionem reciprocam multiplicatione adiungi posse, nempe vbi fuerat $dy = p dt$ potest etiam sumi $dy = T^V p dt$. denotante T functione pari et V impari. Nihilominus enim factum ex dy in se, sed abeunte t in $-t$, idem erit ac ante.

XLVIII. Formulis ergo generalibus §§. XXIII. XXIV. inuentis adiungi poterit functio reciproca, immutato earum vsu. Et habebitur $dx = N dt$ et $dy = T^V N dt (Q + V(1 + QQ))^n$ deinde loco formulae rationalis habebitur $dx = N dt$ et $dy = T^V N dt (\frac{P+Q}{P-Q})^n$. Atque his formulis in amplissimos curuarum exponentialium, quae problemati trajectoriarum reciprocarum satisfaciunt, campos deducimur.

XLIX. Exemplum nobis fit, hypothesis, qua, $n=0, N=1, T=a$, et $V=t=x$; erit $dy = a^t dt = a^x dx$ quae est aequatio ad logarithmicam ordinariam, quae satisfaciet applicatam subtangenti aequalem pro axe conuersionis assumendo. Pluribus exemplis, quippe curuas ignotas exhibentibus, haec persequi minime consultum duco.

L. Hisce tandem, quae hactenus attuli, quaestioni exasse me satisfecisse non dubito, quaecunque enim
ad

ad enodationem huiusmodi quaestionum iure requiri possunt, abunde hic exhibuisse mihi videor. Dedi enim primo generalissimas aequationes applicatu faciles: secundo methodum dedi infinitas aequationes vniuersales algebraicas inueniendi, ex quibus simplicissimas reipsa deduxi.

Tandem, quae ex transcendentalibus curuis cognitae sunt, etiam ex aequationibus generalibus facile deriuantur. Hisce omnibus praemissi solutionem duorum problematum agnatorum, de Pantogonia infinitorum axium traectoria et de trajectoriis datum axium numerum habentibus, quippe quae ex consideratione naturae trajectoriarum reciprocarum sponte fluunt.

Theoria Nova
DE MOTV AQVARVM
PER CANALES QVOSCVNQVE
FLVENTIVM

Auctore

Daniele Bernoulli, Ioh. Fil.

Motum aquarum per tubos determinare aggressi sunt multi Geometrae iique celeberrimi; sed pauci aliquid dederunt, quod experientiae esset conforme, nemo autem integram theoriam stabilivit. Aquam in tubo stagnantem

M. Iam.
1727.

per

