

DE

VARIIS MODIS CIRCULI QVADRATVRAM NVMERIS PROXIME EXPRIMENDI.

AVCTORE

Leonb. Eulero.

§. 1.

Archimedes et qui ipsum sunt secuti rationem diametri ad peripheriam in numeris proximam inuestigauerunt ex polygonis regularibus circulo tam inscriptis quam circumscriptis. Cum enim perimeter polygoni inscripti minor, circumscripti vero maior sit ipsa circuli peripheria, satis commodum hinc deduxerunt modum limites intra quos peripheria contineatur, definiendi; praesertim cum hi limites eo propius ad se inuicem accedant, quo plurium laterum polygona accipiantur. Ita cum posito radio circuli = 1, latus polygoni 96, lateram inscripti sit

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}},$$

latus vero circumscripti totidem laterum

$$= \frac{2\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}}}.$$

sequentes prodibunt limites intra quos tota peripheria circuli continetur, minor scilicet

$$96\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}}$$

et

CIRCULI QUADRATURAM PROXIME EXPR. 223

et maior

$$\frac{292\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}}}{\sqrt{(2+\sqrt{2})^2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}}$$

§. 2. Perspicitur autem ex hoc solo exemplo quam difficile et operosum sit limites hos in numeris rationalibus saltem exhibere propter tot totiesque repetitas radicis quadratae extractiones: qui labor etiam eo maior euadit, si polygona adhuc plurium laterum considerentur: adeo ut per hunc modum ne quidem speranda fuisset exactissima diametri ad peripheriam ratio, quae nunc quidem constat, et in fractionibus decimalibus ad 127 figuras est producta: Posita nimirum diametro = 1, exprimetur periphēria sequenti fractione decimali.

3, 14159265358979323846264338327950288419
71693993751058209749445923078164062862
08998628034825342117067982148086513272
3066470938446 +

cuius fractionis centum cyphrae priores *Cl. Machino* debentur, omnes vero *Cl. Lagny* peculiari modo etiam nunc relato elicit.

§. 3. Methodo ergo Archimedeae per polygona inscripta et circumscripta procedenti merito praeferenda est altera methodus hoc potissimum tempore exculpta, qua circuli periphēria per series infinitas conuergentes exprimi solet. Si enim huiusmodi series vehementer conuergat, atque insuper ipsi seriei termini facile in fractiones decimales conuerti queant, multo minori opera ratio diametri ad periphēriam proxima numeris rationalibus exprimi poterit, quam per illam alteram methodum, quae

et

tot

tot radicum extractiones requirit. Quo autem hac ratione calculus commode ad finem perducatur, series ad hoc institutum idoneae sunt seligendae, quas duo sequentia requisita, ut iam innui, habere oportet. Primo scilicet, series debet esse vehementer convergens, seu eiusmodi, ut quivis terminus multo sit minor praecedente, quo non admodum multis terminis accipiendis ratio verae factis propinqua obtineatur. Quo pauciores enim termini a vero valore minime differunt, eo aptior erit censenda series ad veram diametri ad peripheriam rationem dignoscendam.

§. 4. Alterum requisitum postulat ut singuli seriei termini non sint admodum compositi, seu simplicibus consentent numeris. Quo magis enim singuli termini fuerint complicati, eo maiore labore quivis in fractionem decimalem convertetur, et fortasse plus operae requiretur ad decem terminos colligendos, quam mille terminos alius seriei simplicioris, tanto minus autem convergentis. Deinde vero ad calculum faciliorem reddendum quisque terminus ita debet esse comparatus, ut praecedente iam in fractionem decimalem euoluto, sequens ex eo facile inveniri queat; quae proprietas potissimum in series geometricas iisque affines cadit, in quibus quilibet terminus ex praecedente per solam divisionem obtinetur. Hancobrem ex seriebus, quibus arcus circulares exprimi solent, eae praecipue ad hunc usum erunt accommodatae, quae ex tangente data arcum respondentem definiunt; hae enim a seriebus geometricis hoc tantum differunt, quod singuli termini per numeros impares insuper sint divisi, unde in calculo parum nascitur molestiae.

§. 5.

§. 5. Reiectis igitur aliis seriebus, quibus arcus vel ex sinu vel chorda definitur, tanquam ad nostrum institutum minus idoneis, praecipue eam seriem contemplabimur, qua ex data tangente arcus circuli respondens determinatur. Est autem posito radio circuli $= 1$, arcus tangenti x respondens $= \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \text{etc.}$ in infinitum; ex qua intelligitur, quo minor accipiatur tangens x eo facilius arcum respondentem assignari posse. Posito scilicet $x = \frac{1}{10}$, facili negotio arcus tangenti $\frac{1}{10}$ respondens in fractione decimali etiam ad mille figuras definiri posset; minori vero etiam opera arcus determinaretur, qui tangenti $\frac{1}{100}$ vel $\frac{1}{1000}$ etc. responderet. Sed hinc ne minimum quidem subsidium consequitur ad rationem, quam diameter ad totam peripheriam tenet, cognoscendam; cum omnes istiusmodi arcus, quarum tangentes sunt $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$ seu tales, quae seriem vehementer conuergentem et simul leui labore summabilem reddant, cum integra peripheria sint incommensurabiles, atque ratio inter eos et peripheriam, assignari penitus nequeat.

§. 6. Quo igitur huius seriei ope ratio, quam diameter ad peripheriam tenet, inuestigari possit, talis tangens pro x substitui debet, cuius arcus respondens ad totam peripheriam rationem habeat cognitam. Arcuum autem cum tota peripheria commensurabilium vnicus datur, qui tangentem habeat rationalem, isque est arcus 45° , eius scilicet tangens radio circuli 1 aequatur. Posito ergo $x = 1$, prodibit octaua totius peripheriae pars

$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ etc.}$$

quae est ipsa series Leibnitiana, ita vt hinc prodeat ratio
Tom. IX. F f *diameter-*

ri ad peripheriam vt 1 ad

$$4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \text{etc.}\right).$$

Haec autem series tam parum conuergit, vt plures quam 10⁵⁰ termini colligi deberent, quo fractio decimalis ad centum tantum figuras extendatur; qui labor fere in aeternum superari non posset. plura quidem habentur compendia, quibus ista summatio facilior reddi posset, sed cum iis haec series in alias transformetur, in series alias magis conuergentes potius inquiram, quibus immediate scopus intentus obtineri queat.

§. 7. Aliud igitur subsidium superesse non videtur, nisi vt arcus talis quaeratur, cuius tangens quidem sit irrationalis, sed tamen vnico constet termino; si enim pro x quantitas irrationalis magis composita substitueretur, tum labor ad terminos colligendos insuperabilis euaderet, etiam si series maxime conuerneret. Duo autem tantum extant huiusmodi arcus, alter 60° alter 30°, quorum illius tangens est $=\sqrt{3}$ huius vero $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Ponamus ergo $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$, nam pro x non substitui conuenit $\sqrt{3}$, quia series diuergens oriretur; eritque duodecima totius peripheriae pars

$$\frac{1}{1 \cdot \sqrt{3}} - \frac{1}{3 \cdot 3 \sqrt{3}} + \frac{1}{5 \cdot 3^2 \sqrt{3}} - \frac{1}{7 \cdot 3^3 \sqrt{3}} + \frac{1}{9 \cdot 3^4 \sqrt{3}} - \text{etc.}$$

vnde ratio diametri ad peripheriam prodit vt

$$1 \text{ ad } \frac{2\sqrt{3}}{1} - \frac{2\sqrt{3}}{3 \cdot 3} + \frac{2\sqrt{3}}{5 \cdot 3^2} - \frac{2\sqrt{3}}{7 \cdot 3^3} + \text{etc.}$$

quae series iam satis conuergit, cum quisque terminus plus quam ter minor sit praecedente. Colligendis autem circiter 210 terminis, ratio in fractionibus decimalibus ad centum figuras exacta obtinebitur, qui labor iam superabilis foret.

§. 8.

§. 8. Ope huius seriei etiam reuera a Geometris Anglis ratio diametri ad peripheriam in fractionibus decimalibus vsque ad 74. figuras exacta est determinata; atque integer calculus extat in tabulis mathematicis a *Scharpio* aliisque editis. Maxima autem huius calculi difficultas in hoc consistit, quod ante omnia radicem quadratam ex 3 in fractionibus decimalibus ad tot figuras extrahi oportet, ad quot ratio quaesita exacta esse debet. Inuenta autem fractione decimali ad 100 v. gr. figuras iusta, quae ipsi $2\sqrt{3}$ seu $\sqrt{12}$ fit aequalis, tum haec fractio continuo per 3 est diuidenda, quo obtineantur termini

$$\frac{2\sqrt{3}}{1}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3^2}, \frac{2\sqrt{3}}{3^3} \text{ etc.}$$

Quo facto isti termini successiue per numeros impares 1. 3, 5, 7, etc. sunt diuidendi, vt prodeant ipsi seriei termini

$$\frac{2\sqrt{3}}{1}, \frac{2\sqrt{3}}{3 \cdot 3}, \frac{2\sqrt{3}}{5 \cdot 3^2}, \frac{2\sqrt{3}}{7 \cdot 3^3} \text{ etc.}$$

Denique summa terminorum ordine parium a summa ordine imparium subtrahatur, et residuum dabit valorem peripheriam circuli exprimentem, cuius diameter est = 1.

§. 9. Antequam autem exponam; quomodo ope eiusdem seriei, qua arcus ex data tangente exprimitur, proxima ratio diametri ad peripheriam multo facilius et exactius definiri queat, conueniet compendium aliquod monstrasse, cuius beneficio huiusmodi serierum summa multo leuiori opera inueniri poterit. Scilicet cum arcus tangenti $\frac{1}{p}$ respondens fit

$$= \frac{1}{p} - \frac{1}{3p^3} + \frac{1}{5p^5} - \frac{1}{7p^7} + \text{ etc.}$$

F f 2

Hu-

Huius seriei ponamus iam n terminos in vnam summam esse collectos, existente n numero pari, summamque inuentam esse $=S$, dico fore summam totius seriei in infinitum continuatae

$$=S + \frac{1}{p^{2n-1}} \left(\frac{1}{(1+p^2)(2n-1)} - \frac{2p^2}{(1+p^2)^2(2n-1)^2} + \frac{2^2(p^4-p^2)}{(1+p^2)^3(2n-1)^3} - \frac{2^3(p^6-4p^4+p^2)}{(1+pp^2)^4(2n-1)^4} + \text{etc.} \right)$$

Reliquorum ergo terminorum summatio reducitur ad summationem alius seriei, in qua quisque terminus circiter $2n-1$ vicibus minor est praecedente; ita vt quo plures termini actu fuerint collecti, ista noua series eo magis fiat conuergens.

§. 10. Quamuis haec noua series, quae summam omnium reliquorum terminorum prioris seriei complectitur, vehementer conuergat, tamen, ad eius summam inueniendam noua quoque compendia adhiberi possunt. Posita enim summa

$$p - \frac{1}{3p^3} + \frac{1}{5p^5} - \frac{1}{7p^7} + \dots - \frac{1}{(2n-1)p^{2n-1}} = S,$$

erit arcus, cuius tangens est $\frac{1}{p}$

$$=S + \frac{1}{p^{2n-1}(2n(1+pp) + p^2 - 1)} \text{ proxime;}$$

qui valor eo erit exactior, quo plures termini actu fuerint collecti, seu quo maior fuerit numerus n , modo sit par vti monui. Atque si fuerit $n = p^h$ tum haec forma fractionem decimalem iustam reddet ad tot figuras, quot

CIRCULI QUADRATURAM PROXIME EXPR. 229

quot exprimit $(2n + 3 + 3\mu)lp$. Facto autem bre-
uitatis gratia

$$\frac{1}{(1+pp)(2n-1)} = q$$

erit vera summa seriei

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{3p^3} + \frac{1}{5p^5} - \text{etc. in infinitum continuatae}$$

$$= S + \frac{1}{2p^{2n-1}} \left(\frac{q}{(1+qp^2+q^2p^2-q^2(2p^4-p^2)+q^4(4p^6-8p^4+p^2)\text{etc.})} \right)$$

feu

$$\frac{1}{2p^{2n-1}} \text{ denuo diuidi debet per}$$

$$\frac{1}{p} + p^2 + qp^2 - q^2(2p^4 - p^2) + q^4(4p^6 - 8p^4 + p^2) - \text{etc.}$$

et quotus resultans ad S adiectus dabit arcum, cuius tan-
gens $= \frac{1}{p}$.

§. 11. His expositis subsidiis, quae consequentur ex
methodo mea series summandi alibi tradita, progredior
ad aliam viam multo faciliorem aperiendam, qua eius-
dem seriei arcum ex data tangente exprimentis ope ratio
diametri ad peripheriam quantumuis exacte leui opera defi-
niri poterit, sine vlla taediosa radicum extractione. Resoluo
scilicet arcum cuius tangens est $= 1$ in duos pluresue arcus,
quorum tangentes sint rationales. Cum enim horum ar-
cum tangentes sint vnitatis minores, ex iis per seriem ge-
neralem arcus ipsi facile determinari poterunt. Qui arcus in
se spectati etiam si cum tota peripheria sint incommensura-
biles, tamen quia coniunctim sumti arcui 45 graduum
cuius tangens $= 1$, aequantur; eorum summa dabit octa-
uam totius peripheriae partem, ex qua ratio diametri
ad peripheriam quaesita sponte fluit. Posito enim $\alpha =$
arcui

arcui cuius tangens = 1, erit diameter ad peripheriam
vt 1 ad 4a.

§. 12. Ponamus ergo $At_1 = At_a^{\frac{1}{a}} + At_b^{\frac{1}{b}}$ debet
esse $1 = \frac{a+b}{ab-1}$; vnde fiet $ab-1 = a+b$ atque $b = \frac{a+1}{a-1}$.
Quo autem a et b fiant numeri integri, quod ad calculum
facilem reddendum requiritur, pono $a=2$, eritque $b=3$.
Arcus ergo cuius tangens = 1, quem posui = α
aequalis est summae arcuum quorum tangentes sunt $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$.
Quocirca arcus α aequabitur aggregato duarum sequen-
tium serierum

$$\begin{aligned} & + \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \text{etc.} \\ & + \frac{1}{1 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} - \frac{1}{7 \cdot 3^7} + \text{etc.} \end{aligned}$$

quarum utraque magis conuergit, quam illa superior ex
tangente $\frac{1}{3}$ deducta, nec vlla radicum extractione impedi-
tur. Quare ope harum duarum serierum ratio diametri
ad peripheriam leuiori negotio ad multo plures figuras
exacta definiti poterit, quam per vnicam illam seriem
fieri licuit, praesertim si subsidia indicata adhibeantur.

§. 13. Si nunc seriei

$$\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \text{etc.}$$

summa in fractionibus decimalibus desideretur iusta ad
centum figuras, tum colligi debent 154 termini, atque
ad eorum summam addi oportet $\frac{1}{2 \cdot 307 \cdot 1548}$, quo summa
quaesita obtineatur; vnico scilicet subsidio §. 10. indicato
vior, quo tota seriei summa erat

$$= S + \frac{1}{p^{2n-1} (2n(1+pp) + pp - 1)}$$

Sin

CIRCULI QUADRATURAM PROXIME EXPR. 231

Sin autem summa ad 200 figuras desideretur tum 318 termini actu colligi debent. Altera vero series

$$\frac{1}{1.3} - \frac{1}{3.3^3} + \frac{1}{5.3^5} \text{ etc.}$$

ad fractionem decimalem, quae ne in centesima quidem figura fallat, reducetur colligendis actu 96 terminis; quo autem ad ducentas figuras exacta obtineatur, 200 termini actu sunt colligendi. Ad rationem ergo diametri ad peripheriam in fractione decimali ad 100 figuras iusta inveniendam simul 250 termini addi debent, dum ad idem obtinendum ex serie

$$\frac{1}{1\sqrt{3}} - \frac{1}{3.3\sqrt{3}} + \frac{1}{5.3^2\sqrt{3}} - \text{etc.}$$

sola plures quam 200 termini addi debent.

§. 14. His autem vestigiis insistendis in promptu erit arcum α cuius tangens $= 1$ infinitis aliis modis in duos pluresue arcus resolvere, quae series multo magis convergentes producant. Cum enim sit

$$At \frac{1}{p} = At \frac{1}{p+q} + At \frac{q}{p^2 + pq + q^2}$$

erit

$$At \frac{1}{2} = At \frac{1}{3} + At \frac{2}{5}$$

Quare cum sit

$$\alpha = At \frac{1}{2} + At \frac{2}{5}$$

erit nunc

$$\alpha = 2 At \frac{1}{3} + At \frac{1}{7}$$

atque α iterum his duabus seriebus coniunctis aequabitur

$$+ \frac{2}{1.3} - \frac{2}{3.3^3} + \frac{2}{5.3^5} - \frac{2}{7.3^7} + \text{etc.}$$

$$+ \frac{1}{1.7} - \frac{1}{3.7^3} + \frac{1}{5.7^5} - \frac{1}{7.7^7} + \text{etc.}$$

quae

quae multo magis conuergunt, quam priores. Commodissima autem forte resolutio erit

$$\alpha = 4At\frac{1}{5} - At\frac{1}{259}$$

vel

$$\alpha = 4At\frac{1}{5} - At\frac{1}{70} + At\frac{1}{59},$$

quippe qui arcus ope serierum maxime conuergentium definiiri possunt. Sed quisque, cui lubuerit huiusmodi calculum suscipere, facile sibi commodissimam resolutionem eliget.

§. 15. Possunt quoque aliae series, quibus etiam arcus ex data tangente definitur, non minori successu usurpari, si ita visum fuerit; series autem hae, quae commode in usum vocari poterunt, sunt sequentes praecipue.

$$At. \frac{p}{p^2-1} = \frac{1}{p} + \frac{2}{3p^3} + \frac{4}{5p^5} - \frac{8}{7p^7} - \frac{16}{9p^9} + \frac{32}{11p^{11}} + \text{etc.}$$

$$At. \frac{2p}{2p^2-1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{3 \cdot 2p^3} - \frac{1}{5 \cdot 2^2 \cdot p^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^3 \cdot p^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^4 \cdot p^9} + \text{etc.}$$

$$At. \frac{3p}{3p^2-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{5 \cdot 3^2 \cdot p^5} + \frac{1}{7 \cdot 3^3 \cdot p^7} - \frac{1}{11 \cdot 3^5 \cdot p^{11}} + \frac{1}{13 \cdot 3^6 \cdot p^{13}} - \text{etc.}$$

$$At. \frac{3p(p^2-1)}{p^4-4p^2+1} = \frac{3}{1 \cdot p} + \frac{3}{5 \cdot p^5} - \frac{3}{7 \cdot p^7} - \frac{3}{11 \cdot p^{11}} + \frac{3}{13 \cdot p^{13}} + \text{etc.}$$

Ex hac vltima serie est ponendo $p=2$

$$At\ 18 = 3 \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} - \frac{1}{11 \cdot 2^{11}} + \frac{1}{13 \cdot 2^{13}} + \frac{1}{17 \cdot 2^{17}} - \text{etc.} \right)$$

ad quem arcum si addatur $At\frac{1}{18}$, qui per vulgarem seriem facile exhibetur, prodit quarta peripheriae pars seu 2α . Simili modo ex serie secunda prodit $2\alpha =$

$$1 + \frac{1}{3 \cdot 2} - \frac{1}{5 \cdot 2^2} - \frac{1}{7 \cdot 2^3} + \frac{1}{9 \cdot 2^4} + \frac{1}{11 \cdot 2^5} - \text{etc.}$$

$$+ \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^9} - \frac{1}{11 \cdot 2^{11}} + \text{etc.}$$

§. 16. Quando autem in hoc negotio arcus fuerit inueniendus per seriem Leibnitianam, cuius tangens quidem sit parua, sed eius numerator non $= 1$, tum difficulter singulos seriei terminos euoluere liceret. His igitur casibus conueniet arcum in duos alios resolueri, quorum tangentes pro numeratore habeant unitatem, id quod facilius fieri potest. Sit enim arcus inuestigandus cuius tangens est $\frac{a}{b}$; ponatur $At \frac{a}{b} = At \frac{1}{m} + At \frac{1}{n}$; eritque $\frac{m+n}{mn-1} = \frac{a}{b}$. Hinc fiet $(ma-b)(na-b) = a^2 + b^2$. Quamobrem inquirendum est, vtrum $a^2 + b^2$ in duos factores resolui possit, quorum vterque denominatore b auctus per numeratorem a fiat diuisibilis. Quod cum acciderit erunt quoti ex istis diuisionibus orti valores pro m et n substituendi. Sic si quaerendus sit arcus cuius tangens $= \frac{7}{5}$, quia est $7^2 + 5^2 = 130 = 5 \cdot 26$ erunt valores ipsorum m et n hi $\frac{5+26}{7}$ et $\frac{26+5}{7}$ seu 2 et 5. Erit itaque $At \frac{7}{5} = At \frac{1}{2} + At \frac{1}{5}$, vnde non difficulter $At \frac{7}{5}$ reperitur.

§. 17. Saepius autem cum summa quadratorum non habet factores huius indolis, arcus in duos eiusmodi alios arcus resolui nequit. His ergo casibus propositus arcus in tres pluresue arcus resolui debet, quod sequenti modo fiet. Sit propositus arcus cuius tangens est $\frac{x}{a}$ erit

$$At \frac{x}{a} = At \frac{ax-y}{ay+x} + At \frac{1}{b}.$$

Si nunc in integris valor pro a inueniri nequeat, vt $ax - y$ fiat diuisor ipsius $ay + x$, tum saltem in fractis quaeratur, et pro $At \frac{1}{a}$ ponatur $At \frac{b-a}{ab+1} + At \frac{1}{b}$; denuoque dispiciatur, vtrum detur numerus integer, qui pro b substitu-

stitutus reddat $b-a$ diuisorem ipsius $ab+1$. Ita ergo pergendo, sequentes orientur formulae

$$\text{I. } At_{\frac{x}{y}}^{\infty} = At_{\frac{ax-y}{ay+x}}^{\infty} + At_{\frac{1}{a}}$$

$$\text{II. } At_{\frac{x}{y}}^{\infty} = At_{\frac{ax-y}{ay+x}}^{\infty} + At_{\frac{b-a}{ab+1}} + At_{\frac{1}{b}}$$

$$\text{III. } At_{\frac{x}{y}}^{\infty} = At_{\frac{ax-y}{ay+x}}^{\infty} + At_{\frac{b1-a}{ab+1}} + At_{\frac{c-b}{bc+1}} + At_{\frac{1}{c}}$$

$$\text{IV. } At_{\frac{x}{y}}^{\infty} = At_{\frac{ax-y}{ay+x}}^{\infty} + At_{\frac{b-a}{ab+1}} + At_{\frac{c-b}{bc+1}} + At_{\frac{d-c}{cd+1}} + At_{\frac{1}{d}}$$

§. 18. Si ergo $a, b, c, d,$ etc. fuerit progressio quaecunque numerorum tandem in infinitum crescentium, habebimus seriem arcuum infinitam, qui omnes simul summi dato arcui aequantur. Erit scilicet

$$At_{\frac{x}{y}}^{\infty} = At_{\frac{ax-y}{ay+x}}^{\infty} + At_{\frac{b-a}{ab+1}} + At_{\frac{c-b}{bc+1}} + At_{\frac{d-c}{cd+1}} + At_{\frac{e-d}{de+1}} + \text{etc.}$$

Neesse autem est vt progressionis $a, b, c, d,$ etc. terminus infinitesimus sit infinite magnus, quia arcus cuius ille cotangens est negligitur, hinc non contemnendae sequantur series arcuum summabiles; vt posito $\frac{x}{y} = 1$ et pro $a, b, c, d,$ etc. serie numerorum imparium 3, 5, 7, 9 etc. habebitur

$$At_1 = At_{\frac{1}{2}} + At_{\frac{1}{4}} + At_{\frac{1}{6}} + At_{\frac{1}{8}} + \text{etc.}$$

in qua tangentium denominatores sunt dupla quadrata numerorum naturalium. Simili modo erit

$$At_1 = At_{\frac{1}{3}} + At_{\frac{1}{6}} + At_{\frac{1}{9}} + At_{\frac{1}{12}} + At_{\frac{1}{15}} + \text{etc.}$$

§. 19. Coronidis loco theorema non inelegans subiungam, quod ad naturam circuli penitus inspiciendam inferuire potest. In circulo scilicet cuius radius seu sinus totus = 1, est arcus quicumque A aequalis huic valori

sin. A

CIRCULI QUADRATURAM PROXIME EXPR. 235

fin. A

cos. $\frac{1}{2}$ A. cos. $\frac{1}{4}$ A. cos. $\frac{1}{8}$ A. cos. $\frac{1}{16}$ A. cos. $\frac{1}{32}$ A. etc.

Vel quod perinde est per secantes erit

A = fin. A. sec. $\frac{1}{2}$ A. sec. $\frac{1}{4}$ A. sec. $\frac{1}{8}$ A. sec. $\frac{1}{16}$ A. etc.

quae expressio commode adhiberi potest ad logarithmum cuiusvis arcus ex datis logarithmis sinuum et secantium inueniendum: erit scilicet

l. A = l. fin. A + l. sec. $\frac{1}{2}$ A + l. sec. $\frac{1}{4}$ A + l. sec. $\frac{1}{8}$ A + etc.

vbi notandum, si tabula logarithmorum consueta vtatur, a quouis logarithmo logarithmum sinus totius auferri debere. Sic si logarithmus arcus 1 gradus quaeratur erit

$$\log. \sin. 1^\circ = (-2), 2418553$$

$$\log. \sec. 30' = 0, 0000165$$

$$\log. \sec. 15' = 0, 0000041$$

$$\log. \sec. 7\frac{1}{2}' = 0, 0000010$$

$$\log. \sec. 3\frac{3}{4}' = 0, 0000003$$

$$\log. \text{Arc. } 1^\circ = (-2), 2418762$$

$$\log. 180 = 2, 2552725$$

$$l. A. 1^\circ = (-2), 2418762$$

$$l. A. 180^\circ = 0, 4971487$$

cui logarithmo respondet numerus 3, 14159.

§. 20. Demonstratio huius-theorematis pendet a mutua relatione sinuum et cosinum angulorum, qui inter se rationem duplam tenent. Cum enim sinus anguli cu-

iusque in suum cosinum multiplicatus producat semissim
 sinus anguli dupli, aequabitur sinus cuiusvis anguli per
 cosinum dimidii anguli diuisus duplo sinus anguli dimidii
 ita erit

$$\frac{\sin. A}{\cosin. \frac{1}{2} A} = 2 \sin. \frac{1}{2} A.$$

Simili ratione cum sit

$$\frac{\sin. A}{\cosin. \frac{1}{2} A. \cosin. \frac{1}{4} A} = \frac{2 \sin. \frac{1}{2} A}{\cosin. \frac{1}{4} A}$$

erit per eandem proprietatem

$$\frac{\sin. A}{\cosin. \frac{1}{2} A. \cosin. \frac{1}{4} A} = 4 \sin. \frac{1}{4} A.$$

Atque ulterius pergendo habebitur

$$\frac{\sin. A}{\cosin. \frac{1}{2} A. \cosin. \frac{1}{4} A. \cosin. \frac{1}{8} A} = 8 \sin. \frac{1}{8} A.$$

Ex quibus concluditur, si progressio cosinum in infini-
 tum continetur, fore

$$\frac{\sin. A}{\cosin. \frac{1}{2} A. \cosin. \frac{1}{4} A. \cosin. \frac{1}{8} A. \cosin. \frac{1}{16} A \text{ etc.}} = \infty \sin. \frac{1}{\infty} A.$$

= arcui ipsi A. Q. E. D.