

DE  
DISCONTINVARVM IN ANALYSE

Auctore

L. EULER O.

I.

**Q**uae in Analyfi de functionibus, seu quantitatibus per quampiam variabilem vtcunque determinatis, tradi solent, ad eas tantum functiones restringuntur, quae continuae vocantur, et quarum formatio certa quadam lege continetur. Ex doctrina linearum curuarum hoc maxime illustratur, vbi applicatae, quatenus per absciffas determinantur, vicem gerunt functionum, ita vt indoles omnium functionum aptissime per lineas curuas repraesentari possit. Ita quomodocunque quantitas  $y$  per  $x$  determinatur, seu quaecunque functio fuerit  $y$  ipsius  $x$ , semper curua describi potest, cuius absciffae cuiusque  $x$  conueniat ea ipsa applicata  $y$ , haecque linea curua congrue naturam illius functionis repraesentare aestimatur. Hinc etiam vicissim proposita linea curua quacunque, eius applicatae certas quasdam functiones absciffarum exhibent, quarum

A 2

natura

natura in ipsa lineae curvae natura inuoluitur, dum scilicet cuique abscissae certa respondet applicata, huius valor tanquam functio quaedam abscissae recte spectatur, et quando applicata vel fit imaginaria, vel simul plures valores sortitur, haec ipsa varietas luculentissime ex natura functionis perspicitur.

2. Iam vero notissimum est, in Geometria sublimiori alias lineas curuas considerari non solere, nisi quarum natura certa quadam relatione inter coordinatas, per quampiam aequationem expressa definiatur, ita ut omnia eius puncta per eandem aequationem tanquam legem determinentur. Quae lex cum principium continuitatis in se complecti censetur, quippe qua omnes curvae partes ita vinculo arctissimo inter se cohaerent, ut nulla in illis mutatio saluo continuitatis nexu locum inuenire possit; hanc ob rem istae lineae curvae continuae appellantur, nihilque interest, siue aequatio illarum naturam continens sit algebraica siue transcendens, siue cognita siue etiamnum incognita, dummodo intelligamus dari quandam aequationem, qua natura huiusmodi linearum curuarum exprimat. Hoc loco non spectatur continuitas tractus, quo rami curuarum porriguntur: ac binae hyperbolae coniugatae aequae lineam curuam continuam constituunt, ac parabola vel ellipsis, etiam si bini eius tractus penitus a se inuicem sint seiuncti. Ob eam enim causam his separatis hyperbolis continuitas tribuitur, quod ambae in vna eademque aequatione contineantur, ex  
 eaque

eaque formari possint. Atque ex hoc fonte, quae vulgo vage de lege continuitatis disputari solent, interpretari atque ad determinatum significatum revocari conveniret.

3. Constituto continuitatis criterio sponte patet, quid sit functio discontinua, seu lege continuitatis destituta: omnes enim lineae curvae per nullam certam aequationem determinatae, cuiusmodi libero manus tractu delinearī solent, tales functiones discontinuas suppeditant, quandoquidem in iis valores applicatarum nulla certa lege abscissis definire licet. Huiusmodi lineae curvae, quatenus superiori generi continuitatis lege definito opponuntur, vulgo mechanicae, aptius vero discontinuae, seu continuitatis lege carentes vocantur: idque non quod earum partes non inter se cohaereant, sed quoniam nulla certa aequatione determinantur. Ita quicumque tractus libera manu super charta ducuntur, etiamsi continuo procedant, tamen secundum hanc definitionem pro discontinuis sunt habendae, siquidem profecto nunquam eveniet, ut huiusmodi tractus certa quadam aequatione contineatur. Atque huc etiam referri convenit lineas vulgo mixtas vocatas, quando partes ex diversis lineis curvis desumptae inter se coniunguntur, vel etiam partes eiusdem lineae alio modo vniuntur. Ita perimenter polygoni ex meris lineis rectis constans aequae huc pertinet, ac lineae ex rectis et arcibus circularibus, vel aliarum quarumcunque curvarum formatae. Et si enim hic quaevis portio

certa quadam aequatione continetur, pro toto tamen tractu nulla aequatio unica, in quo character continuitatis est statuendus, exhiberi potest, quo circa omnes huiusmodi tractus pro lineis discontinuis sunt habendi, perinde ac ii, qui libera manu ducuntur.

4. Iam omnibus huiusmodi lineis et functionibus discontinuis in Analyfi geometrica nullum locum concedi, per se est manifestum, cum vniuersa haec speculatio in linearum, quae considerantur, proprietatibus inuestigandis sit occupata, quod negotium nullo modo suscipi posset, nisi natura linearum certa quadam lege et aequatione contineretur. Hinc plerique Geometrae hac ratione induciti non dubitauerunt, omnes lineas et functiones discontinuas, tam ex Geometria, quam vniuersa Analyfi, penitus proscribere, et inter obiecta, a quibus haec scientia abhorreat, detrudere. Hanc sententiam certe palam est professus Celeb. *Alembertus*, cum ego motus cordarum vibrantium ita in genere determinauissem, vt solutio ad omnes motus et figuras, quae cordae initio fuerint impressae, pateret. Mox enim Vir excellentissimus mihi obiecit, motum plane definiri non posse, nisi figura cordae initio impressa fuerit continua ac certa quadam aequatione comprehensa, si secus acciderit, et cordae figura initio fuerit discontinua, tum motus secuturi determinationem nullo modo ad Analyfin pertinere, atque adeo nefas esse illam inuestigare velle. Cui obiectioni equidem satis respondi, ac nuper Cel. *La Grange* in Actis Taurinensi-

riensibus meam solutionem ita solide propugnauit, ut nulli amplius dubio locus sit relictus.

5. Grauiissimi ergo momenti quaestio hic exoritur, quid de functionibus discontinuis, vel lineis sine vlla certa lege descriptis, sit iudicandum, et num, et quatenus illis locus in Analyfi concedi possit? In problemate certe modo memorato nullum est dubium, quin corda, quae initio ita fuerit ducta, ut eius figura nulla aequatione comprehendi possit, motum sit consecutura, eoque durante singulis momentis ea sit certam figuram et motum receptura, cuius determinatio sane ad Analyfin motusque scientiam est referenda, siue fines cognitioni nostrae praescripti huic quaestioni soluendae sufficiant, siue secus. Vtroque casu quaestio semper foret omni nostra attentione digna, et cum circa quantitates versetur, ad Analyfin certe pertinere est censenda; neque hic quaeritur, quousque sagacitas nostra pateat, cum vix quisquam sit Geometrarum, qui non saepius in quaestionibus vires suas superantibus desudauerit. Neutiquam igitur nefas est putandum, huiusmodi quaestiones attingere; quin potius eo maiori studio in iis esset elaborandum. Omnibus autem difficultatibus diligenter perpenfis, etiamnum asseuerare audeo, solutionem meam problematis de cordis vibrantibus latissimo sensu accepti recte se habere, in eaque felici successu functionum discontinuarum rationem esse habitam. Vnum etiam agnosco, hoc problema ad peculiare Analyseos

lyseos genus adhuc parum excultum, esse referendum, cuius generis adeo vis et natura in hoc consistat, ut functiones etiam discontinuas necessario in se complectatur.

6. Ad litem hanc componendam observo, neque in Algebra communi, neque in ea Analyseos infinitorum parte, quae adhuc potissimum est tractata, functiones discontinuas admitti posse. Multo latius autem Analysis infinitorum patere, atque eiusmodi partes complecti est iudicanda, quae a functionibus discontinuis non solum non abhorreant, sed eas adeo ita natura sua innoluant, ut nullum problema eo pertinens rite solutum sit censendum, nisi functiones prorsus arbitrariae, hincque etiam discontinuae, in solutionem fuerint introductae. Ista quidem Analyseos partes etiamnum parum sunt excultae, etiam si egregia specimina passim reperiuntur; neque etiam earum vera indoles satis perspecta videtur. Quare quo hanc indolem luculenter exponam, necesse est, ut varias istas ac diuersas Analyseos partes accuratius describam, et pro cuiusque indole a se inuicem distinguam. Quemadmodum enim vulgo Analysis infinitorum defini solet, inde vix quicquam lucis ad hoc argumentum illustrandum peti potest, cum pleraeque definitiones maxime sint vagae et confusae, neque subiecti, de quo agitur, naturam satis dilucide ac distincte explicent. Ex quo frequentissimae querelae, quod idea Analyseos infinitorum nusquam accurate descripta ac stabilita reperia-

periat, fundamento non carent, hic autem illi vicio imprimis est occurrendum, quo diuersae huius scientiae partes non satis diligenter a se inuicem distinguuntur.

7. Tota autem vis Analyseos infinitorum conuenientissime ex notione et indole functionum explicatur, quae commodissime pro numero quantitatum variabilium, per quas certo quodam modo determinantur, in classes distinguuntur. Sic prima classis continebit functiones vnicae quantitatis variabilis. Tales functiones sunt applicatae quarumuis linearum, respectu abscissarum. Ita posita abscissa  $= x$  et applicata  $= y$ , erit  $y$  functio variabilis  $x$ , cuius natura per lineam curuam, seu aequationem, quae inter  $x$  et  $y$  datur, exprimitur; qua fit, vt statim atque abscissae  $x$  determinatus valor tribuitur, etiam applicata  $y$  valorem determinatum consequatur, siue is fuerit simplex, siue etiam multiplex, siue etiam imaginarius; vnde intelligitur etiam vicissim abscissam  $x$  tanquam functionem applicatae  $y$  spectari posse. Simili modo si corpus per quampiam lineam moueatur, eius celeritas in singulis locis etiam ad functiones vnicae variabilis est referenda; est quippe functio eius quantitatis variabilis, qua eius lineae puncta continuo determinantur. In hac classe pleraeque quaestiones adhuc tractatae sunt collocandae, etiamsi saepius plures variables in computum ingrediantur, siquidem cunctae tandem per vnicae determinantur. Veluti si motus lunae inuestigatur, ad

quoduis tempus eius longitudo, latitudo, ac distantia a terra quaerenda proponitur; cum autem haec singula elementa tandem per solum tempus determinari debeant, tam longitudo, quam latitudo et distantia, quaeque per se tanquam functio temporis, ideoque vnica variabilis spectari poterit.

8. At functiones binarum pluriumue variabilium per eiusmodi binas pluresue variables determinantur, quae a se inuicem nullo modo pendent, sed cuique seorsim omnes prorsus valores tribuere licet. Tales functiones occurrunt, quando natura solidorum ac superficierum expenditur. Fieri hoc solet per ternas coordinatas  $x$ ,  $y$  et  $z$ , quarum binae  $x$  et  $y$  in plano quodam accipiuntur, tertia vero  $z$ , huic plano perpendicularis ad superficiem porrigitur. Cum igitur cuique baseos puncto, quod per binas variables  $x$  et  $y$  definitur, certa perpendicularis  $z$  immineat, erit vtique  $z$  functio binarum variabilium  $x$  et  $y$  a se inuicem neutiquam pendentium. Quodsi enim omnia superficiei puncta assignare velimus, tam ipsi  $x$  quam ipsi  $y$  seorsim omnes prorsus valores tribui oportet, vt hoc modo pro omnibus basis punctis perpendiculara illa obtineantur. Deinde si corpus ex particulis heterogeneis sit compositum, vt cuique puncto intra corpus accepto sua peculiaris densitas conueniat, primo quidem situs cuiusque puncti ternis coordinatis  $x$ ,  $y$  et  $z$  definitur, nullo modo a se inuicem pendentibus, quoniam vt omnia puncta intra corpus obtineantur,

his



his tribus coordinatis omnes plane valores succ. siue assignari debent. Quare si densitas in quouis puncto quantitate  $v$  designetur, ea tanquam functio ternarum variabilium  $x$ ,  $y$  et  $z$  spectari debet. Ac si particulae huius corporis motu quocunque agitentur, cuiusque puncti motus non solum ab eius situ terminis coordinatis determinando, sed etiam a tempore pendebit, unde motus tanquam functio quatuor variabilium spectari debebit.

9. Constituta hac functionum notione ac divisione, fundamenta Analyseos infinitorum clarissime tradi poterunt, quae disciplina commodissime in tot partes distribuitur, quot dantur functionum classes, propterea quod singulae peculiaribus principiis ac praeceptis sunt superstruendae. Prima igitur pars, quae fere sola adhuc est exculta, et ad quam principia calculi differentialis et integralis potissimum sunt accommodata, circa functiones univariae variabilis versantur. Primo ergo si  $y$  fuerit functio quaecunque unius variabilis  $x$ , considerari solent incrementa vel decrementa illius functionis  $y$ , dum quantitas  $x$  quocunque augmento increfcit. Deinde hoc augmentum continuo imminui concipitur, donec tandem prorsus evanescat, quo quidem casu etiam incrementum functionis  $y$  in nihilum abit, quae augmenta evanescentia cum differentialia vocentur, evidens est, ea omnia quantitate esse destituta, nihiloque adeo aequalia; ita ut de eorum quantitate nulla quaestio institui possit. Neque etiam calculus differentialis in

quantitate differentialium, quae nulla est, indaganda occupatur, sed in eorum ratione mutua definienda; quae ratio utique certam obtinet quantitatem: Functionis scilicet  $y$  non tam ipsum differentiale  $dy$ , quam eius ratio ad differentiale  $dx$ , inuestigatur, valor nimirum fractionis  $\frac{dy}{dx}$ , qui quouis casu determinatam quantitatem fortitur, et ipse tanquam noua functio ipsius  $x$  spectari potest.

10. Cum plerisque haec differentialium notio, et rationis, quae inter quantitates euanescentes intercedit, inuestigatio, maxime suspecta videri soleat, vnico exemplo omnia dubia euanescent. Proposita igitur sit talis functio  $y = axx + bx + c$ , ac primum videamus, quantum incrementum haec functio capiat; dum quantitati  $x$  augmentum quodcunque  $\omega$  tribuitur; posito autem  $x + \omega$  loco  $x$ , functio nostra abit in  $axx + 2ax\omega + a\omega\omega + bx + b\omega + c$ , ideoque incrementum accipit  $= 2ax\omega + a\omega\omega + b\omega$ , quod hoc caractere  $\Delta y$  designemus, et ad similitudinem quantitas  $\omega$ , tanquam augmentum ipsius  $x$ , etiam hoc signo  $\Delta x$  denotetur. Cum igitur sit

$$\Delta x = \omega \text{ et } \Delta y = 2ax\omega + a\omega\omega + b\omega$$

$$\text{erit: } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2ax\omega + a\omega\omega + b\omega}{\omega} = 2ax + a\omega + b$$

ficque habetur ratio inter incrementa  $\Delta x$  et  $\Delta y$ , quae vera est, quantumuis augmentum  $\omega$  quantitas  $x$  capiat; eadem ergo ratio etiam veritati erit consentanea, si augmentum  $\omega$  plane euanescent accipiatur, quo casu incrementa illa  $\Delta x$ ,  $\Delta y$  his signis  $dx$  et  $dy$  denotari et differentia vocari solent: vnde perspicuum

cuum est, posito  $\omega = 0$  prodire  $\frac{dy}{dx} = 2ax + b$ , hancque rationem veram esse, etiam si termini, inter quos subsistit, sint euanescentes. Solum hoc exemplum sufficere videtur omnibus dubiis, quibus vulgo notio infinite parui in Analyfi vsurpata impugnari solet, diluendis, huicque calculo ab omni suspitione vindicando.

II. Quia haec differentialium ratio  $\frac{dy}{dx}$  denuo est functio ipsius  $x$ , si ea littera  $p$  indicetur, ratio eius differentialis  $dp$  ad  $dx$ , seu fractio  $\frac{dp}{dx}$  simili modo defini potest, quae, ne opus sit nouam litteram in calculum inducere, ob  $p = \frac{dy}{dx}$  tali scriptio-  
ne  $\frac{d^2y}{dx^2}$  designari solet, quae differentialia secundi gradus inuoluere dicitur; atque ita porro progrediendo differentialia in has formulas  $\frac{d^3y}{dx^3}$ ,  $\frac{d^4y}{dx^4}$  etc. ingredientia tertii, quarti, altiorumque ordinum vocantur, quorum significatus, quemadmodum de primo ordine ostendi, semper ad rationem inter differentialia binarum quantitatum, quarum altera alterius est functio, reducit. Hocque modo omnes controuersiae, quae olim circa differentialia omnium ordinum eorumque naturam sunt motae, sponte concidunt, cum quicquid in hoc calculo definitur, semper ad proportionem differentialium, cuius realitas nulli dubio est subiecta, reuocetur, neque amplius veritates per hunc calculum erutae Geometricis villo pacto postponendae videbuntur. Equidem non diffiteor, eiusmodi rationes loquendi in hac disciplina esse receptas, quae differentialibus quantitatem quampiam

valde exiguam tribuere videantur, sed cum earum significatio semper ex stabilitis principiis sit interpretanda, tales loquendi formulas, etsi minus congruas, tolerari conuenit. Quin etiam cum expressio  $p = \frac{dy}{dx}$ , prorsus sit realis, etiam haec aequalitas  $dy = p dx$  merito admittitur, tametsi in neutro membro vlla quantitas agnoscitur.

12. Haec igitur definitio calculi differentialis nullis amplius tenebris est inuoluta, qua is vocatur methodus, proposita quacunque functione vnus pluriumue variabilium, rationes, quae inter differentialia tam primi quam altiorum ordinum intercedunt, inuestigandi. De functionibus quidem vnus variabilis, ad quas solas hic etiamnum respicio, ista definitio maxime est perspicua: si enim  $y$  fuerit functio quaecunque ipsius  $x$ , calculus differentialis docet, quomodo valor fractionis  $\frac{dy}{dx}$  sit eliciendus: eademque regula, qua hoc praestatur, valet quoque pro differentialibus altioribus: cum posito  $\frac{dy}{dx} = p$ , ex hac etiam functione ipsius  $x$  eadem methodo valor  $\frac{dp}{dx}$  seu  $\frac{d^2y}{dx^2}$  obtineatur: ac si vterius statuatur  $\frac{dp}{dx} = \frac{dq}{dx} = q$  item  $\frac{dq}{dx} = \frac{dr}{dx} = r$ , tum  $\frac{dr}{dx} = \frac{ds}{dx} = s$  etc. eadem methodus sufficit his omnibus valoribus  $q, r, s$  etc. inueniendis: atque huc sunt trahenda, quae vulgo de calculo differentio-differentiali et differentialibus altiorum ordinum tradi solent, quae, si rite intelligantur, nihil sane continent, quod primis nostrae cognitionis principiis aduersetur. Quando etiam in  
elemen-

elementis calculi differentialis saepe plures quantitates variables occurrunt, et praecepta ad eas partes, quas constituo sequentes, referenda videantur, tamen semper in eas certus quidam nexus admittitur, ut tandem omnes tanquam functiones unius variabilis spectari queant. Interim tamen regulae differentiandi sequentium partium a prima non discrepant.

13. Calculum autem integralem in genere ita definio, ut sit methodus inveniendi indolem functionum ex data quacunque differentialium relatione, quam definitionem pro casu functionum unice variabilis ante clarius euoluam, quam ad functiones plurium variabilium sum progressurus. Posito scilicet pro functione unius variabilis  $\frac{dy}{dx} = p$ ,  $\frac{dp}{dx} = q$ ,  $\frac{dq}{dx} = r$  etc. Si aequatio proponatur quaecunque, in quam, praeter quantitates  $x$  et  $y$ , etiam istae  $p, q, r$  etc. ex differentialibus ortae, ingrediantur, in hoc officium calculi integralis versatur, ut ex ista aequatione seu relatione differentialium data natura functionis  $y$ , quemadmodum scilicet per  $x$  determinatur, eliciatur; quae operatio vocari solet integratio. Plurimum autem abest, quo minus haec methodus adhuc satis sit elaborata, et si omnes quaestiones in eam cadentes perpendamus, paucissimas eius ope resolvere licet; variis autem ea, quatenus est exulta, continetur praeceptis pro ordine differentialium, quae in relationem datam ingrediuntur. Ita si proponatur relatio quaecunque inter quantitates  $x, y$

et

et  $p = \frac{dy}{dx}$ , quae aequatio primi gradus differentialis vocatur; pluribus quidem casibus integratio succedit; si autem ea relatio insuper quantitatem  $q$  inuoluat, aequatio vocatur differentialis secundi gradus, duplicique integratione opus est, antequam ad desideratam relationem inter  $x$  et  $y$ , unde ratio istius functionis  $y$  innotescat, perueniatur. Hic multo pauciores sunt casus, quibus ad scopum pertingere licet; simulque patet, quid de aequationibus differentialibus tertii altiorumque ordinum sit iudicandum.

14. Verum circa has integrationes, quae functionibus vnus tantum variabilis inuestigandis interviunt, singularis quaedam affectio, qua istius methodi praecipua indoles continetur, probe est obseruanda. Affectio autem ista in hoc consistit, quod aequatio integrata semper nouam quandam constantem quantitatem recipiat, cuius in aequatione differentiali ne vestigium apparet, hancque quantitatem constantem prorsus arbitrio nostro relinqui. Ita si habeatur ista aequatio differentialis  $\frac{dy}{dx} = 2ax + b$ , seu  $dy = 2axdx + bdx$ , vbi quidem litterae  $a$  et  $b$  denotant quantitates constantes datas, aequatio integralis in omni extensione ita se habet:  $y = ax^2 + bx + C$ , vbi  $C$  designat quantitatem constantem a praecedentibus minime pendentem, et cuius valor penitus arbitrio nostro relinquatur, neque integratio cuiusquam aequationis differentialis pro completa et perfecta est habenda, nisi huiusmodi quantitas constans arbitraria fuerit introducta.

ducta Simili modo si relatio proposita inuoluat differentialia secundi gradus, quoniam duplici opus est integratione, solutio completa duas eiusmodi constantes arbitrarias complecti debet; tres vero eiusmodi constantes requiruntur, si aequationes differentiales tertii gradus perfecte resoluuntur. De his autem constantibus id praecipue est notandum, quod cum natura problematum arctissimo nexu cohaereant, atque omnia problemata, quorum resolutio ad aequationes differentiales perducitur, ita sint comparata, ut post peractam integrationem constantes illae ingressae ex ipsa rei natura et circumstantiis adiunctis determinationem suam adipiscantur.

15. His igitur constat prima pars Analy-  
 feos infinitorum, quae circa functiones vnus tantum  
 variabilis versantur, atque ex his multo facilius in-  
 telligetur, quid de reliquis partibus, in quibus fun-  
 ctiones duarum pluriumue variabilium, sit tenendum.  
 In differentialibus autem iam diuersa deprehenditur ra-  
 tio, cum ea hic non absolute inter se comparare liceat.  
 Si enim  $z$  fuerit functio quaecunque binarum va-  
 riabilium  $x$  et  $y$ , circa differentiationem quaestio bi-  
 partita est statuenda: primo scilicet quaeritur diffe-  
 rentiale ipsius  $z$ , dum seruante  $y$  eundem valorem,  
 altera variabilis  $x$  differentiali suo  $dx$  augetur, ut  
 inde valor fractionis  $\frac{d z}{d x}$  obtineatur. Simili modo  
 tractata  $x$  ut constante, altera  $y$  incrementum  $dy$  ca-  
 pere assumitur, et collecto inde incremento  $dz$ , quo  
 functio  $z$  augetur, fractio  $\frac{d z}{d y}$  rationem differentia-  
 Tom. XI. Nou. Comm. C lem

lem ex variabilitate solius quantitatis  $y$  natam exprimit. Vtraque autem haec fractio  $\frac{dz}{dx}$  et  $\frac{dz}{dy}$ , vti casu praecedente, meris terminis finitis continebitur, et ambae tanquam nouae functiones binarum variabilium  $x$  et  $y$  spectari poterunt. Inuentis autem his binis valoribus vera ratio differentialis functionis propositae  $z$  perspicitur; ex iis enim coniunctis demum patet, quomodo differentiale ipsius  $z$  ratione variabilitatis vtriusque quantitatis  $x$  et  $y$  se habeat. Hanc distinctionem ipsa rei natura postulat, sine qua ratio differentiationis huiusmodi functionum ne intelligi quidem posset, quae autem nunc per se est manifesta.

16. Quicquid igitur ad differentiationem functionum duarum variabilium spectat, id totum ad binas istas formulas  $\frac{dz}{dx}$  et  $\frac{dz}{dy}$  reducitur, quarum valores quouis casu terminis finitis per ambas variables  $x$  et  $y$  exprimentur. Ne autem huiusmodi fractiones cum praecedentibus confundantur, vncinulis includi, hocque modo  $(\frac{dz}{dx})$  et  $(\frac{dz}{dy})$  scribi solent. Quodsi has fractiones litteris  $p$  et  $q$  designemus, erit vtiq;  $dz = p dx + q dy$  differentiale completum functionis  $z$ : et quoniam  $p$  et  $q$  iterum vt functiones ipsarum  $x$  et  $y$  spectari possunt, intelligitur etiam, quid sibi velint haec formulae  $(\frac{dp}{dx}) = (\frac{d^2z}{dx^2})$ ,  $(\frac{dp}{dy}) = (\frac{d^2z}{dx dy})$ ;  $(\frac{dq}{dx}) = (\frac{d^2z}{dx dy})$  et  $(\frac{dq}{dy}) = (\frac{d^2z}{dy^2})$ , quae differentialia secundi gradus in se complectuntur, similique modo progressio fit ad differentialia altiorum graduum. Proposita ergo functione quacunque  $z$  binarum variabi-



variabilium  $x$  et  $y$ , calculus differentialis regulas præferibit, quibus valores omnium istarum formularum differentialium inueniri queant: primo scilicet primi gradus, quae sunt  $(\frac{dz}{dx})$  et  $(\frac{dz}{dy})$ , tum secundi gradus, quae sunt  $(\frac{d^2z}{dx^2})$ ,  $(\frac{d^2z}{dx dy})$  et  $(\frac{d^2z}{dy^2})$ , porro tertii gradus, quae sunt

$$(\frac{d^3z}{dx^3}), (\frac{d^3z}{dx^2 dy}), (\frac{d^3z}{dx dy^2}), (\frac{d^3z}{dy^3})$$

et sic deinceps. Vbi quidem notandum, ipsam methodum, has formulas definiendi, a prima parte non discrepare, cum in qualibet differentiatione vnica tantum quantitas pro variabili habeatur. Superfluum foret, haec eadem momenta de functionibus trium pluriumue variabilium exponere, quippe quae ex allatis iam factis sunt perspicua.

17. Integralis autem calculi munus in hoc consistit, vt proposita relatione quacunque inter quantitates  $x$ ,  $y$ ,  $z$  et formulas differentiales modo allatas, inde natura functionis  $z$ , quemadmodum ex variabilibus  $x$  et  $y$  conflatur, inuestigetur. Relatio vero illa data per aequationem exprimitur, quae si tantum formulas differentiales primi ordinis  $(\frac{dz}{dx})$  et  $(\frac{dz}{dy})$  praeter quantitates ipsas  $x$ ,  $y$ , et  $z$  complectitur, aequatio differentialis primi gradus vocatur; sin autem in eam insuper formulae differentiales secundi ordinis  $(\frac{d^2z}{dx^2})$ ,  $(\frac{d^2z}{dx dy})$ ,  $(\frac{d^2z}{dy^2})$ , vel porro tertii altiorumue ordinum ingrediantur, tum aequatio illa eiusdem ordinis differentialis dicitur. Haecque est forma generalis calculi integralis, quatenus circa

functiones duarum variabilium est occupatus; ex quo simul intelligitur, quomodo reliquae partes Analyseos infinitorum, in quibus functiones trium plurimue variabilium tractantur, sint definiendae. At calculus integralis ad functiones duarum variabilium accommodatus, plurimum differt a calculo integrali communi, vbi non nisi functiones vnus variabilis occurrunt, et praecepta omnino singularia postulat, praeterquam quod in eo omnia quoque artificia prioris partis sint in usum vocanda. Verum haud diu est, ex quo haec pars Analyseos coli est coepta, ita vt vix adhuc prima eius elementa factis sint euoluta. Eximia quidem huius calculi specimina iam passim reperiuntur, quorum tractatio autem minus ad praecepta calculi communis est adstricta; vnde latissimus campus aperitur, in quo summa ingenia ad maximum scientiae incrementum vires suas exercere poterunt.

18. Huius autem noui calculi vis et quasi proprius character minime adhuc satis perspectus videtur. Quemadmodum enim calculi integralis communis vis in eo consistit, vt qualibet integratione noua quantitas constans arbitrio nostro permiffa in calculum introducatur: ita in hac parte, circa functiones binarum variabilium occupata, singulis integrationibus, non solum noua quantitas constans, sed adeo noua functio cuiuspiam variabilis prorsus indeterminata, in calculum inuehitur, quae ita ab arbitrio nostro pendet, vt eius loco etiam functiones  
discon-

discontinuae affumi queant. Quare functionum discontinuarum vsu ab hoc fere nouo calculi genere non solum non excluditur, sed etiam quasi essentialiter ad eius naturam pertinere fit iudicandus; neque etiam vlla integratio in hoc calculo pro completa et absoluta est habenda, nisi in aequationem integram huiusmodi functio prorsus arbitraria fuerit introducta: ac si aequatio differentialis proposita fuerit secundi altiorisue gradus, ita vt binis pluribus ve integrationibus fit opus, necesse est, totidem functiones arbitrariae in vltima aequatione integrali reperiantur, quod nisi eueniat, integrale non magis pro completo haberi potest, quam in calculo integrali ordinatio, vbi introductio constantium arbitrariarum negligitur. Quando autem de functionibus trium variabilium agitur, qualibet integratione functio arbitraria binarum variabilium in calculum introducitur; qua circumstantia iste calculus a praecedentibus ita distinguitur, vt genus peculiare constituitur fit censendus, cum natura cuiusque generis, ex indole quantitatis arbitrariae per integrationem inuectae, conuenientissime diiudicetur. Tum vero si quaestio circa functiones quatuor variabilium versatur, haec quantitas arbitraria quauis integratione introducenda fit functio trium variabilium et ita porro.

19. Haec autem neququam calculi cuiuspiam morositati sunt tribuenda, quae omni vsu destituantur, et inani speculationi tantummodo inseruiant, sed potius naturae rerum maxime innituntur, et

cum veritatum concatenatione pulcherrime cohaerent. Quemadmodum enim omnia problemata circa functiones univariatae, cuiusmodi sunt fere omnia, quae adhuc in Analyfi sunt tractata, perfecte non solvuntur, nisi qualibet integratione nova quantitas constans inferatur, quam deinceps ex circumstantiis problematis determinari oportet: ita etiam omnia problemata, quorum solutio ad functiones binarum variabilium perducitur, natura sua ita sunt comparata, ut, nisi quavis integratione nova functio arbitraria, seu indefinita unius variabilis, induceretur, omnibus conditionibus problema determinantibus nullo modo satisfieri posset. Eximium huius rei specimen cernitur in problemate de cordis vibrantibus; si enim cuiusque cordae puncti, quod ab altero termino distat intervallo  $= x$ , pro tempore elapso  $= t$ , elongatio ab axe, seu statu aequilibrii, ponatur  $= z$ , evidens est,  $z$  esse functionem duarum variabilium  $t$  et  $x$ , quoniam utique ista elongatio, tam pro diversis cordae punctis, quam pro temporis fluxu, variatur. Cum igitur posito tempore  $t = 0$  is cordae status prodire debeat, qui ipsi initio fuerit inductus, et ubi elongatio  $z$  functioni cuidam datae intervalli  $x$  erat aequalis, solutio perfecta esse nequit, nisi huiusmodi functionem indefinitam complectatur, quae deinceps ex statu cordae initiali definiri queat; et quoniam iste status ab arbitrio nostro ita pendet, ut cordae figura quaecunque irregularis et discontinua induci potuerit, etiam functio illa per Analyfin introducta ita late patere debet, ut etiam discontinua, seu

seu a continuitatis lege abhorrentia, in se completur.

20. Ne autem hic vlli dubio locus relinquatur, eiusmodi problema euoluam, cuius solutio adeo ex elementis facile deducitur, et quae ita est comparata, vt in ea functiones discontinuae, seu lineae curuae pro lubitu ductae, necessario admitti debeant; deinde idem problema analytice expediam, quo clarius necessitas functionum arbitrariarum, quae integratione introducuntur, ex consensu cum priori solutione, elucescat. Problema autem ita se habet: *vt omnia solida, ad quorum superficiem in singulis punctis normales ductae, eiusdem sint quantitatis.* Quando de lineis agitur, notum est, praeter circulum nullam dari lineam curuam, cuius omnes normales sint inter se aequales; at si haec aequalitas normalium ad solida extenditur, vt omnes rectae, a dato plano tanquam basi ad superficiem normaliter ductae, debeant esse inter se aequales, infinita exhiberi possunt solida, in quae haec proprietas competit. Primo scilicet hoc manifesto euenit in hemisphaerio, vel etiam sphaera, cuius centrum in plano illo seu basi est situm, dum omnes rectae normales simul sunt radii sphaerae. Deinde si cylindrus ita collocetur, vt eius axis in basem incidat, omnes quoque normales inter se aequales habentur. Hinc autem colligitur solutio multo latius patens, quoniam salua hac proprietate axis cylindri quomodocunque incurvari potest, quam solutionem generalem ita enunciare licet. Descripta super plano fixo linea quacunque

eunque curua , siue continua siue discontinua , eiusmodi solidum super ea extruatur , cuius omnes sectiones , ad illam lineam normaliter factae , sint semicirculi , quorum centra in eam lineam incidant. Nisi ergo solutio analytica pariter ita late pateat , vt lineam pro lubitu ductam , seu , quod eodem re- dit , functionem indefinitam in se contineret , ea certe pro perfecta et absoluta haberi non posset.

21. Positis igitur binis coordinatis in plano fixo assumtis  $x$  et  $y$  , perpendicularo autem inde ad superficiem quaesitam pertingente  $=z$  , quia  $z$  consideratur vt functio binarum variabilium  $x$  et  $y$  , statuuntur formu'ae differentiales  $(\frac{d z}{d x})=p$  et  $(\frac{d z}{d y})=q$  , vt fit  $dz=pdx+qdy$ . Hinc autem normalis in superficiem ad planum vsque fixum porrecta colligitur  $=z\sqrt{1+pp+qq}$ ; quae quia debet esse constantis magnitudinis , ponatur  $z\sqrt{1+pp+qq}=a$  et pro  $z$  eiusmodi inuestigari oportet functionem binarum variabilium  $x$  et  $y$  , vt haec conditio , quae est aequatio differentialis primi gradus , impleatur. Quo facilius autem ad resolutionem per integrationem perueniamus , his vtamur substitutionibus : fit  $p=\frac{\sin. \Phi \cos. \omega}{\cos. \Phi}$  et  $q=\frac{\sin. \Phi \sin. \omega}{\cos. \Phi}$  , vt fiat  $pp+qq=\frac{\sin. \Phi^2}{\cos. \Phi^2}$  , hincque  $\frac{z}{\cos. \Phi}=a$  , seu  $z=a \cos. \Phi$  , vnde aequatio differentialis assumta transformatur in hanc :  $-a d\Phi \sin. \Phi = \frac{\sin. \Phi}{\cos. \Phi} (dx \cos. \omega + dy \sin. \omega)$  seu  $-ad\Phi \cos. \Phi = dx \cos. \omega + dy \sin. \omega$  , vbi cum pars prior integrationem admittat , etiam pars posterior in-

integrabilis est reddenda, qua conditione certa relatio inter variables  $x, y$  et  $\omega$  stabilitur. Cum igitur integrando obtineamus:

$$-a \sin. \Phi = x \cos. \omega + y \sin. \omega - \int d\omega (y \cos. \omega - x \sin. \omega)$$

evidens est, hoc integrale exhiberi non posse, nisi formula  $y \cos. \omega - x \sin. \omega$  fuerit functio vnus variabilis  $\omega$ . Statuatur ergo:  $y \cos. \omega - x \sin. \omega = F': \omega$ , vt fiat  $\int d\omega (y \cos. \omega - x \sin. \omega) = F: \omega$ , eritque  $-a \sin. \Phi = x \cos. \omega + y \sin. \omega - F: \omega$ . Vel denotet  $\Omega$  functionem quamcunque ipsius  $\omega$  vtcunque indefinitam, vt etiam functiones discontinuae inde non excludantur, etposito  $F': \omega = \Omega$ , erit  $F: \omega = \int \Omega d\omega$ , et problematis solutio ob  $a \sin. \Phi = \sqrt{(aa - zz)}$  his aequationibus continetur:

$y \cos. \omega - x \sin. \omega = \Omega$  et  $\sqrt{(aa - zz)} = \int \Omega d\omega - \cos. \omega - y \sin. \omega$   
vbi quidem signum radicale aeque negative ac positive capi potest.

22. Videamus iam, quomodo hae formulae ad constructionem perducant. Referat ipsa tabula planum illud, fixam basin corporis quaesiti constituens, in quo sint binae coordinatae  $AX = x$  et  $XY = y$ , ita vt puncto  $Y$  perpendiculariter imminet tertia coordinata  $z$ . In ipso isto plano axi  $AX$ , normaliter iungatur recta  $AO$ , ducaturque recta  $AP$ , ita vt sit angulus  $OAP = \omega$ , ad hanc ex  $Y$  agatur normalis  $YP$ , eritque  $AP = y \cos. \omega - x \sin. \omega$  et  $PY = y \sin. \omega + x \cos. \omega$ . Quibus lineis in calculum introductis ambae nostrae aequationes ita se habebunt:

$$AP = \Omega \text{ et } PY + \sqrt{(aa - zz)} = \int \Omega d\omega.$$

Producatur ergo recta PY in M, ut fit  $YM = \sqrt{aa - zz}$ , fiatque propterea  $PM = \int \Omega d\omega$ , quae relatio inter lineas AP et PM probe est. perpendenda. Cum iam in situ proximo, angulo scilicet OAP aucto suo differentiali  $PAp = d\omega$ , fit arcuus radio AP descriptus  $Pp = \Omega d\omega$ , hic arcuus simul differentiale lineae MP exhibebit, ita ut fit  $pm = PM + Pp$ , ex quo intelligitur, rectam PM altero termino M in eiusmodi curua EMF terminari, in quam ea iugiter fit normalis, qua proprietate tota nostra solutio analytica continetur. Quocirca constructio quaesita ita erit comparata: Descripta pro lubitu curua quacunque EMF, quae siue sit continua siue secus nihil refert, ad singula eius puncta M ducantur normales MP, vtrinque producendae, et ex harum rectarum singulis punctis Y verticaliter erigantur perpendicula  $YZ = z$ , ut fit  $YZ^2 + MY^2 = aa$ , quod praestabitur, si singulis centris M radio  $= a$ , cui normales debent esse aequales, describantur circuli in planis ad basin ipsamque curuam EMF normalibus; horum enim circulorum peripheriae in ipsa superficie corporis quaesiti erunt positae, et rectae in hanc superficiem normales omnes erunt  $= a$ , et in lineam EMF pro lubitu ductam incidant.

23. Leuissima autem attentione adhibita perspicuum est, hanc constructionem ex solutione analytica petitam prorsus congruere cum superiori constructione, quam sola elementorum consideratio supeditauerat. Manifestum enim est, corpus ita fore

com-



comparatum, ut omnes eius sectiones ad lineam  $EMF$  normaliter factae sint circuli inter se aequales, centra sua in ipsa hac linea habentes. Ob utriusque autem solutionis consensum hoc imprimis notandum est, solutionem analyticam non futuram esse completam, nisi functio  $\Omega$  per integrationem ingesta latissime pateret, atque adeo omnes omnino valores, tam continuos, quam discontinuos, in se complecteretur, quandoquidem linea illa  $EMF$ , functioni  $\Omega$  respondens, penitus arbitrio nostro relinquatur, ut etiam lineas libero manus tractu ductas in usum vocare liceat. Quod autem de hoc problema est ostensum, simul de omnibus aliis eiusdem generis valet, quorum scilicet solutio functiones binarum variabilium implicat, ex quo quaestio initio proposita de usu functionum discontinuarum in Analyfi ita est resoluta, ut in Analyfi quidem communi, quae circa functiones unius variabilis tantum versatur, huiusmodi functionibus nullus locus sit concedendus, in sublimioribus autem Analyseos partibus, ubi functiones binarum plurium ve variabilium tractantur, tales functiones ita necessario ad calculi essentiam pertinere sint censendae, ut nulla integratio pro absoluta et completa haberi queat, nisi simul functio maxime indefinita, atque adeo etiam discontinua, in calculum introducatur.