

<sup>q15</sup> = 0, 00000, 00006, 68803, 51098, 11467, 225  
<sup>q16</sup> = 0, 00000, 00000, 65659, 63114, 97947, 230  
<sup>q17</sup> = 0, 00000, 00000, 06066, 98573, 11061, 950  
<sup>q18</sup> = 0, 00000, 00000, 00529, 44002, 00734, 6:0  
<sup>q19</sup> = 0, 00000, 00000, 00043, 77065, 46731, 370  
<sup>q20</sup> = 0, 00000, 00000, 00003, 43773, 91790, 981  
<sup>q21</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 25714, 22892, 855  
<sup>q22</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 01835, 99165, 212  
<sup>q23</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00125, 38995, 403  
<sup>q24</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00008, 20675, 327  
<sup>q25</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 51564, 550  
<sup>q26</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 03115, 285  
<sup>q27</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 00181, 239  
<sup>q28</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 00010, 165  
<sup>q29</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 549  
<sup>q30</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 026  
<sup>q31</sup> = 0, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000, 000

98, 11467, 225  
 14, 97947, 230  
 73, 11061, 950  
 03, 00734, 6:0  
 65, 46731, 370  
 73, 91790, 981  
 14, 22892, 855  
 835, 99165, 212  
 125, 38995, 403  
 08, 20675, 327  
 00, 51564, 550  
 00, 03115, 285  
 00, 00181, 239  
 :00, 00010, 165  
 :000, 00000, 549  
 :000, 00000, 026  
 :00, 00000, 000

Hae quidem potestates diuisae sunt per certos numeros, qui autem plerumque sunt ii ipsi, per quos eadem potestates ipsius  $\pi$  in superioribus formulis diuisi occurrunt, unde euolutio in fractiones decimales eo facillor redduntur.

DE

DE  
 INSIGNI PROMOTIONE  
 SCIENTIAE NUMERORVM

§ 1.

Proxima omnino sunt, quae celeberr. *La Grange* in Comment. Academiæ Regiæ Boruſſicæ pro Anno 1773 de diuisoribus formulae generalissimæ  $Bt + Ct + Dn$  demonstrauit, et maximam lucem in scientia numerorum, quae etiamnum tantis tenetibus est inuoluta, accendunt. Ob hoc ipsum autem, quod ista tractatio maxime est generalis, ii qui non satis sunt exercitati in huiusmodi speculacionibus, non partum difficultatis offendunt, neque vim saluum sublimium demonstrationum satis perficere valent. Quamobrem haud inutile erit omnia momenta, quibus hae demonstrationes inuentionur, diligentius explicare atque ad formulas magis speciales accommodare, quaradequidem hoc modo omnia facillius intelligi poterunt. Deinde imprimis accuratius exponam, quantum firmiter hinc plurimis theorematibus, quorum veritatem per solam inductionem mihi quidem cognoscere licuit, afferri possit, unde multo clarius patebit, quantum adhuc ad eorum perfectam demonstracionem deſideretur.

Mm 2

Lcm-

**Lemma.**

§. 2. Si  $p$  et  $q$  fuerint numeri inter se primi, tum omnes plane numeri in hac forma generali  $\alpha p \pm \beta q$  comprehendi possunt, idque infinitis modis. Huius lemmae demonstratio per se facilis passim inuenitur.

**Problema I.**

§. 3. Si  $p$  et  $q$  sint numeri inter se primi,  $n$  vero denotet numerum quemcumque datum, sue posituum sue negativum, invenire omnes divisores huius formulae:  $p p + n q q$ .

**Solutio.**

Denotet  $D$  divisorem quemcumque numeri in hac forma  $p p + n q q$  contenti, itaque  $d$  quotus ex hac divisione ortus, ita ut sit  $D d = p p + n q q$ . Hic iam statim evidens est, numerum  $d$  ad  $q$  fore primum; si enim  $q$  haberet divisorem communem, eundem quoque  $p$  habere deberet, contra hypothesein, quamobrem numerus  $p$  per  $d$  et  $q$  ita exprimi poterit, ut sit  $p = \alpha d \pm \beta q$ , quo valore substituto fiet

$$D d = \alpha \alpha d d \pm 2 \alpha \beta d q + (\beta \beta + n) q q$$

ideoque divisor

$$D = \alpha \alpha d \pm 2 \alpha \beta q + (\beta \beta + n) q q,$$

vbi ergo  $\beta \beta + n$  erit numerus integer, qui sit  $= h$ , ita ut habeatur

$$D = \alpha \alpha d \pm 2 \alpha \beta q + h q q,$$

pro qua forma scribamus

$$D = f r r \pm g q r + h q q,$$

ita

er se primi, tum  
rall  $\alpha p \pm \beta q$   
Huius lemmae  
ur.

se primi,  $n$  vero  
stium sue nega-  
ae:  $p p + n q q$ .

numeri in hac  
tus ex hac divi-

Hic iam statim  
um; si enim  $q$   
quoque  $p$  habere  
umerus  $p$  per  $d$   
;  $\beta q$ , quo valore  
 $+ n) q q$

$q$ ,  
fit  $= h$ , ita ut

ita

ita ut sit  $f = d$ ,  $r = \alpha$ ,  $g = \beta$  et ob  $h = \beta \beta + n$  erit  
 $f h = \beta \beta + n$ ; hincque fiet  $4 f h - g g = 4 n$ . Hinc igi-  
tur patet, omnes divisores formae  $p p + n q q$  semper  
contineri in hac forma:

$$D = f r r \pm g q r + h q q,$$

dummodo fuerit  $4 f h - g g = 4 n$ . Ac vicissim, si fuerit

$$D = f r r \pm g q r + h q q,$$

$$4 d f = 4 f f r r \pm 4 f g q r + 4 f h q q;$$

ideoque ob  $4 f h = 4 n - g g$ , erit

$$4 D f = (2 f r \pm g q)^2 + 4 n q q,$$

quae forma a proposita non discrepat, si modo dividatur  
per 4.

**Corollarium I.**

§. 4. In genere igitur omnes divisores formulae  
propositae  $p p + n q q$  comprehendere sicebit in ista for-  
mula latissime patente:  $f r r + g r s + h s s$ , dummodo fue-  
rit  $4 f h - g g = 4 n$ , sine  $f h - \frac{1}{2} g g = n$ ; unde patet, in-  
numeras huiusmodi formulas exhiberi posse, quoniam nu-  
merum  $g$  pro lubitu accipere licet. Ex eo autem numeros  
 $f$  et  $h$  ita definiti oportet, ut fiat  $4 f h = 4 n - g g$ .

**Scholion.**

§. 5. Quoniam autem innumerabiles huiusmodi for-  
mulas:  $f r r + g r s + h s s$ , exhibere licet, in quibus sit  
 $4 f h - g g = n$ , parum hinc licet ad nostrum institutum  
affertur videntur. Proposito enim quocumque numero  $D$ , ad  
diuidendum, verum esse posse divisor formae  $p p + n q q$ ,  
omnes illae innumerabiles formulae considerari deberent,  
num

num forte iste numerus D in quapiam illarum continetur. Praecipuum igitur invenimus, quod *Mastrici la Grange* acceptum referre debemus, in hoc consistit, quod infinitam illam huiusmodi formularum multitudinem ad exiguum numerum pro quovis casu reuocare docuit, id quod in sequente problemate exponamus.

**Problema II.**

§. 6. *Formam generalem diversorum ante inventam, frr + grs + hss, in qua sit 4fh - gg = n, in aliam eiusdem formae, f'rt + g'tu + h'uv, transmutare, in qua sit g' < f' vel h'; manente proprietate 4f'h' - g'g' = n.*

**Solutio.**

Ponamus esse  $f < h$  et numerum  $g$  quantumvis esse maiorem quam  $f$ , ac facturamus  $r = t - \alpha s$ , quo valore substituto orietur ista forma:

$f'it + (g - 2\alpha f)ts + (\alpha\alpha f - \alpha g + h)ss$ ;  
 vbi manifesto & ita assumi poterit, ut fiat  $g - 2\alpha f < f$ , vbi quidem animaduertendum est, nihil referre, verum  $g - 2\alpha f$  prodcat positum an negativum. Statuatur igitur  $g - 2\alpha f = +g'$ , ita ut certe sit  $g' < f'$ , cum vero ob analogiam loco  $f$  scribatur  $f'$  et  $\alpha\alpha f - \alpha g + h = h'$  erique

$4f'h - g'g' = 4f'h - gg = n.$

Hoc igitur modo propofita reducta est, ad hanc:

$f'it + g'ts + h'ss,$

in

n continetur. *Grange* acceptam illam quam numerum in sequente

ante inventam, in aliam eiusdem formae, in qua sit  $g' < f'$  vel  $h'$ ; manente proprietate  $4f'h' - g'g' = n.$

quantumvis esse maiorem quam  $f$ , ac facturamus  $r = t - \alpha s$ , quo valore substituto orietur ista forma:

$f'it + (g - 2\alpha f)ts + (\alpha\alpha f - \alpha g + h)ss$ ;  
 vbi manifesto & ita assumi poterit, ut fiat  $g - 2\alpha f < f$ , vbi quidem animaduertendum est, nihil referre, verum  $g - 2\alpha f$  prodcat positum an negativum. Statuatur igitur  $g - 2\alpha f = +g'$ , ita ut certe sit  $g' < f'$ , cum vero ob analogiam loco  $f$  scribatur  $f'$  et  $\alpha\alpha f - \alpha g + h = h'$  erique

$4f'h - g'g' = 4f'h - gg = n.$

in

in qua certe est  $g' < f'$ . Quod si iam eveniat ut  $g'$  adhuc maius fuerit quam  $h'$ , cum simili modo ista formula in aliam transformari poterit, in qua coefficientis medius terminus extremus sit minor, unde patet formam propofitam

$f'r + g'r + h'ss$

semper in aliam similibus formae

$f'tt + g'tu + h'uv$

converteri posse, in qua  $g'$  minus sit quam  $f'$  et  $h'$ , simulque etiam fiat  $4f'h' - g'g' = n.$

**Corollarium I.**

§. 7. Hoc igitur modo infinita multitudine formularum  $f'r + g'r + h'ss$ , in qua  $4fh - gg = n$  plerumque ad factis exiguum numerum reduci potest, dum scilicet omnes illae formulae excludi possunt, in quibus coefficientis medius & maior est alterutro extremorum.

**Corollarium 2.**

§. 8. Cum igitur sit tam  $f > g$  quam  $h > g$ , erit  $4fh > 4gg$ . Sit igitur  $4fh = 4gg + \Delta$ , et cum esse debeat  $4fh - gg = 4n$ , erit  $3gg + \Delta = 4n$ , ideoque  $3gg < 4n$ , hinc ergo  $g < \sqrt{\frac{4n}{3}}$ ; quamobrem loco  $g$  sufficere eos tantum valores assumisse sufficere, qui sunt minores quam  $\sqrt{\frac{4n}{3}}$ , ex quibus singulis facile colliguntur valores iterarum  $f$  et  $h$  ex aequatione  $4fh = gg + n$ , quo factis omnes plane diversae formae  $f'r + g'r + h'ss$  certe concluduntur in quapiam harum formularum simpliciorum.

Scho-

Scholion.

§. 9. Quoniam aequatio  $4fh - gg = 4n$  locum habere nequit, nisi  $g$  sit numerus par, pro  $g$  statim scribamus  $2g$ , ut forma  $d$  fit  $fr + 2grs + hss$ , existente  $fh - gg = n$ , quae ergo forma semper ita reduci potest ut sit  $2g < f$  vel  $< h$ . Haec autem reditio commodissime per gradus institui potest, dum loco  $\alpha$  in superiori reductione scribitur unias, Ita si fuerit divisio

$$D = frr + 2grs + hss,$$

erit quoque

$$D = frr + 2g'rs + hss,$$

existente duplici modo vel

$$f = f, g' = f - g \text{ et } h = f - 2g + h,$$

vel etiam

$$h = h, g' = h - g \text{ et } f' = f - 2g + h,$$

quoniam membra extrema inter se commutare licet. Quod si hic notandum fuerit  $2g' < f'$  seu  $2g' < h'$ , ista operatio tam diu continuari debet, donec fiat  $2g < f$  vel  $h$ ; ubi notandum, in his formulis terminum medium  $2grs$  tam positivum quam negativum accipi posse, propterea quod numeri  $r$  et  $s$  denotare possunt omnes numeros, integros sine positivos sine negativos. His igitur praemissis inuestigamus omnes divisores primos numerorum vel in hac forma:  $pp + nqq$ , vel in hac:  $pp - nqq$  contentorum; si quidem divisores compositi ex primis componuntur, ita ut cognatis omnibus divisoribus primis simul omnes compositi habeantur.

Pro-

$= 4n$  locum  
 $g$  statim scri-  
 $hss$ , existente  
 reditio potest  
 commodissime  
 priori redu-

$-h$ ,

$+h$ ,

licet. Quod  
 ista operatio  
 $f$  vel  $h$ ; ubi  
 $2grs$  tam  
 operata. quod  
 eros, integros  
 niss inuesti-  
 l in hac for-  
 contentorum; si  
 untur, ita ut  
 nes compositi

Pro-

Problema III.

§. 10. Invenire omnes divisores primos numerorum in hac forma:  $pp + nqq$ , contentorum, existentibus numeris  $p$  et  $q$  tam inter se primis quam respectu numeri  $n$ .

Solutio.

1. Quia enim hic de divisoribus primis tantum sermo est, nisi  $p$  esset quoque primus ad  $n$ , formula  $pp + nqq$  etiam admitteret omnes divisores numeri  $n$ , qui propterea nullam investigationem requirunt et sponte se produnt. Sit ergo  $D$  divisor quicumque formae  $pp + nqq$ , ac modo vidimus semper fore

$$D = frr + 2grs + hss,$$

existente  $fh - gg = n$ , ita ut sit tam  $2g < f$  quam  $2g < h$ ; quare cum hinc sit  $f > 2g$  et  $h > 2g$ , erit  $fh > 4gg$ . Sit igitur  $fh = 4gg + \Delta$ , et quia  $fh - gg = n$ , erit  $3gg + \Delta = n$  ideoque  $gg < \frac{n}{3}$  et  $g < \sqrt{\frac{n}{3}}$ . Hac igitur conditione multitudine formarum pro divisore  $D$  ad eo minore numerum reduci- tur, quo minor fuerit numerus  $n$ . Cum igitur sit

$$D = frr + 2grs + hss, \text{ erit}$$

$$Df = ffr + 2fgrs + fhss,$$

ideoque ob  $fh = gg + n$  fiet

$$Df = (fr + gs)^2 + nss,$$

quae est ipsa forma propofita. Simili modo permutatis literis  $f$  et  $h$  erit quoque

$$Dh = (hs + gr)^2 + nrr,$$

vnde patet, si fuerit  $Df$  numerus formae  $pp + nqq$ , tum etiam productum  $Dh$  fore eiusdem formae, ita ut sit *Euleri Op. Anal. Tom. II.* N n fiat

fieri alterutram invenisse. Pro quovis ergo casu quaerantur omnes valores litterae  $f$ , qui sint  $f, f', f'', f'''$ , etc. acque omnes divisores primi  $D$  ita erunt comparati, ut vel  $D$ , vel  $Df$ , vel  $Df'$ , etc. sint numeri formae  $pp + nqq$ . Haecque sequuntur ex demonstrationibus Illustris in *Grange*.

II. Haec igitur coniungamus cum his, quae iam olim de formis horum divisorum primorum sum commentatus, ubi ostendi, omnes hos divisores comprehendendi posse in huiusmodi expressione:  $4ni + a$ , dum scilicet  $a$  denotat certos numeros primos ad  $4n$  similibus: minores quam  $4n$ , ubi tantum semissis talium numerorum occurrit, reliquis hinc proventus exclusis. Unde si  $a$  denotet hos numeros exclusos, affirmari poterit, nullos numeros, in forma  $4ni + a$  contentos, esse posse divisores formae  $pp + nqq$ . Itaque autem formae egregie conveniunt cum praecedentibus. Si enim fuerit  $D = pp + nqq$ , alteruter numerorum  $p$  et  $q$  debet esse impar, ideoque  $q$  vel par vel impar. Sic primo  $q$  par, ideoque  $qq$  numerus formae  $4i$ , fiet  $D = 4ni + pp$ . Unde patet, litteram illam  $a$  completi omnes numeros quadratos impares et primos ad  $4n$ , siue resida, quae ex divisione horum quadratorum, per  $4n$  facta, remanent. Sin autem fuerit  $q$  numerus impar, ideoque  $qq$  formae  $4i + 1$ , hinc fiet  $D = 4ni + pp + n$ . Unde patet, litteram  $a$  etiam completi omnes numeros formae  $pp + n$ , qui quidem ad  $4n$  sint primi, vel eorum resida ex divisione per  $4n$  remanentia. Item vero etiam numeri pro  $a$  resistant, si fuerit  $Df$  numerus formae  $pp + nqq$ , id quod in exemplis facilius ostendi poterit.

III.

III. His expostis, cum forma  $4ni + a$  completae tur omnes divisores formae  $pp + nqq$ ; altera autem forma  $4ni + a$  excludi debebunt omnes numeri divisibiles per quempiam numerum formae  $4ni + a$ . Quod si igitur demonstrari possit, hoc modo ex formula  $4ni + a$  omnes plane numeros excludi, qui nequeant esse divisores formae  $pp + nqq$ , tum manifesto sequeretur, omnes numeros primos formae  $4ni + a$  certe esse divisores formae  $pp + nqq$ , quandoquidem tantum numeros compositos hoc modo excludimus. Totum ergo negotium huc redit, ut demonstretur, formulam  $4ni + a$  omnes plane continere numeros primos, qui nequeant esse divisores formae  $pp + nqq$ ; quod si demonstrari possit, nihil amplius in hoc genere desideraretur.

Corollarium I.

§. 11. Pro quovis ergo numero  $n$  omnes numeri ipso  $4n$  minores ad eumque primi in duas classes distribuentur, quarum alteram littera  $a$ , alteram vero littera  $a$  designavimus, ita ut formula  $4ni + a$  contineat omnes divisores formae  $pp + nqq$ , altera vero formula,  $4ni + a$ , divisores illos penitus excludat, neque vllus numerus istius formae vquam esse possit divisor formulae  $pp + nqq$ . Mutataque autem numerorum vtriusque classis semper est eadem; scilicet si multiundo omnium numerorum minorum quam numerus  $4n$  ad eumque primorum fuerit  $= 2\lambda$  (semper enim iste numerus est par). Prior forma  $a$  continet  $\lambda$  numeros, totidemque etiam continebit altera forma  $a$ .

N n 2

Corol.

ipol bu fig for re ma cit. scil nu. eni me

III.

Corollarium 2.

§. 12. Circa has formulas:  $4ni + a$  et  $4ni + a'$ , tam oim demonstrari, si numeri  $a$  et  $a'$  in priore classe occurrant, tum ibi quoque occurrere productum  $aa'$ , id quod etiam de pluribus numeris huius classis est intelligendum, qui si fuerint  $a, a', a'', a'''$  etc. etiam producta tam ex binis quam pluribus horum numerorum, atque adeo etiam omnes eorum potestates in eadem classe reperientur, postquam scilicet per  $4n$  diuisi ad residua minora quam  $4n$  fuerint reducti. Deinde etiam demonstrari, si  $a$  fuerit numerus posterioris classis, tum in eadem quoque reperiri debere numeros  $a\alpha, a'\alpha, a''\alpha, a'''\alpha$ , etc. Unde patet, multitudinem numerorum posterioris classis minorem esse non posse quam primae classis. Quod autem multitudine utrinque sit profusus aequalis, id etiam facile demonstrari potest. Tum vero etiam hoc certum est, si  $a, a', a'', a'''$ , etc. fuerint numeri posterioris classis, tum tam eorum quadrata quam eorum producta ex binis in priorem classem ingredi, producta autem ex ternis iterum in classe posteriore reperiri.

Corollarium 3.

§. 13. Omnia igitur, quae adhuc in hoc genere desiderari possunt, huic redeant, ut demonstretur, classem  $4ni + a$  omnes continere numeros primos, qui nequeant esse diuisores formae  $pp + nqq$ ; cum enim cuiusdam erit, omne numeros primos formae prioris  $4ni + a$  certe esse diuisores cuiuspiam numeri formae  $pp + nqq$ .

Problema IV.

§. 14. Invenire omnes diuisores primos numerorum in hac forma:  $pp - nqq$  contentorum, ubi quidem, ut ante

ante,  $P$  et  $q$  non solum sunt primi inter se, sed etiam primi ad  $n$ .

Solutio.

1. Conditio, quod  $p$  sit etiam primus ad  $n$ , ideo tantum hic adicitur, quia alias etiam omnes diuisores numeri  $n$  hic in centum ventrent, quos tamen hic excludimus, verpote per se manifestos. Hic igitur primo patet, si fuerit Diuisor primus formae:  $pp - nqq$ , eum etiam fore diuisorem formae  $nqq - pp$ , siquidem fuerit  $nqq$  maior quam  $pp$ . Nam si fuerit Diuisor formae  $pp - nqq$ , erit quoque diuisor formae  $pp - nqq$ , quae forma, si loco  $nq$  scribamus  $r$ , abit in hanc:  $pp - rr$ . Deinde eodem modo ut ante patet, semper fore

$$D = frr + 2grs + hss,$$

existente  $fh - gg = -n$ , hancque formam semper ita reducti posse, ut fiat  $2g < f$  simulque  $2g < h$ , ubi quidem signa numerorum  $f$  et  $h$  non respiciuntur, si forte alterutrum membrum fiat negativum; quare cum, ob  $f > 2g$  et  $h > 2g$ , sit  $fh > 4gg$ , evidens est fieri non posse

$$fh - gg = -n$$

nisi vel  $f$  vel  $h$  fuerit negativum, unde forma diuisoris ita debet constitui, ut sit

$$D = frr + 2grs - hss$$

fieri que debet  $-fh - gg = -n$ , siue  $fh + gg = +n$ . Quoniam igitur  $fh > 4gg$ , necesse est ut sit  $5gg < n$ , ideoque  $g < \sqrt{\frac{n}{5}}$ , ita ut hoc casu pauciores valores pro  $g$  relinquatur. Tum autem erit

$$Df = frr + 2grs - fhss, \text{ siue}$$

$$Df = (fr + gs)^2 - nss$$

N n 3

quae

$a$  et  $4ni + a'$ , in priore classe ductum  $aa'$ , id est est intelligendum producta tam atque adeo etiam sentur, postquam iam  $4n$  fuerint licet numerus posterioris debere multitudinem non posse quam inque sit profusus Tum vero etiam sint numeri priorem eorum producta autem

in hoc genere nstretur, classem is, qui nequeant im cuiusdam erit,  $i + a$  certe esse  $nqq$ .

rimos numerorum ubi quidem, ut ante

quae est forma ipsa propofita. Porro autem erit

$$Dh = nrr - (gr - ks)^2,$$

quae est forma noſtra inuenta  $np p - q q$ . Hinc igitur intelligitur, ſi fuerit  $Df$  numerus formae  $pp - nqq$ , cum eo ipſo formulam  $Dh$  fore numerum formae  $np p - q q$ .

II. Accommodemus haec etiam ad eam formam di-  
viſorum, quam olim exhibui; ac primo quidem ſi fuerit  
 $D = pp - nqq$ , pro caſibus quibus  $q$  eſt numerus par, ideoque  
 $q q$  formae  $4h$ , fiet  $D = pp - 4ni$ ; vnde ſi ponatur  $D = 4ni + a$ ,  
ob  $pp > 4ni$ , ſi ponatur  $pp = 4nk + b$  prodibit talis  
forma:  $D = 4ni + b$ , ita vt ſit  $a = b$ , ideoque omnes nu-  
meros quadratos ad  $4n$  primos in ſe complectantur. Sin au-  
tem ſit  $q$  numerus impar, ideoque  $q q$  formae  $4i + 1$ , fiet  
 $D = pp - n - 4ni$ , poſſitque iterum  $pp = 4nk + b$ , prodit  
 $D = 4ni + b - n$ , ita vt hoc caſu ſit  $a = b - n$ , vbi  $b$  denota-  
re poteſt omnes numeros quadratos, vel reſidua inde orta.  
Simili modo ſi fuerit  $D = np p - q q$ , euident eſt, valores  
pro  $a$  hinc prodituros praecedentium fore negativos, ita vt  
 $a$  comprehendat omnes numeros quadratos, deinde etiam  
omnes numeros formae  $pp - n$ , tam poſſitue quam nega-  
tue ſuntos; quamobrem forma omnium diuiſorum ita ex-  
hiberi poterit, vt ſit  $4ni \pm a$ , forma autem pro numeris  
ex claſſe diuiſorum excluſis erit  $4ni \pm a$ , quorum mul-  
titudo aequalis eſt priori, ſcilicet  $a$  ſemper totidem fortietur  
valores, quot habet littera  $a$ .

III. Quo igitur etiam in hoc genere nihil amplius  
deſiderari queat, id tantum ſuperſtit, vt demonſtraretur, for-  
mam

man poſteriozem  $4ni \pm a$  omnes plane continere nume-  
ros primos, qui nunquam eſſe queant diuiſores vilius nu-  
meri vel formae  $pp - nqq$ , vel  $np p - q q$ .

Corollarium I.

§. 15. De his binis formis:  $4ni \pm a$  et  $4ni + a$ ,  
quarum illa omnes diuiſores inuoluit, haec vero excluſit,  
eadem valent, quae ante ſunt tradita. Scilicet ſi  $a, a', a''$ , etc.  
ad priorẽ claſſem pertineant, ibidem quoque reperientur  
tam omnes poteſtates quam producta ex binis pluriuſue  
horum numerorum; tum vero ſi  $a$  ſit numerus poſterioris  
claſſis, ibidem quoque occurrunt omnes numeri  $a, a', a''$ , etc.,  
ita vt multitudine horum numerorum minor eſſe  
nequeat quam prioris claſſis.

Corollarium 2.

§. 16. Quoniam littera  $a$  complectitur omnia qua-  
drata, ante omnia eius valor erit  $= 1$ , cum vero eiaz  $9$ ,  
 $25$ , etc. niſi numerus  $n$  habeat diuiſorem vel  $3$ , vel  $5$ , etc.  
His enim caſibus iſta quadrata excluſi oportet, quia alioquin  
forma  $4ni \pm a$  numerus primus fieri non poſſet.

Schoſion.

§. 17. His igitur generalibus praecipis expoſitis  
omnia clariora euadent, ſi caſus particulares enoluamus;  
hic enim plura adhuc occurrunt, quae in genere attingere  
non liceat. Sufficere autem id in aliquibus exemplis oſten-  
diſſe, quibus pertractatis non difficile erit tabulam conſtru-  
ere, quae pro omnibus caſibus formas diuiſorum primo-  
rum exhibeat.

Exam-

rit  
tunc igitur in-  
 $r - nqq$ , cum  
 $c = np p - q q$ .  
mam formam di-  
idem ſi fuerit  
; par, ideoque  
aur  $D = 4ni + a$ ,  
prodibit talis  
que omnes nu-  
ctantur. Sin au-  
ae  $4i + 1$ , fiet  
. $nk + b$ , prodit  
i, vbi  $b$  denota-  
idua inde orta-  
ans eſt, valores  
negativos, ita vt  
, deinde etiam  
ue quam nega-  
uſorum ita ex-  
m pro numeris  
quorum mul-  
totidem fortietur  
re nihil amplius  
emonſtraretur, for-  
mam

Exemplum 1.

§. 18. Invenire omnes divisores primos numerorum in formula  $p^2 + n^2$  contentorum, dum scilicet pro  $p$  et  $q$  assumatur numeri inter se primi.

Solutio.

Posito divisore primo

$$D = fr + 2grs + hss,$$

ob  $n = 1$  debet esse  $fh = gg + 1$ , cum vero  $g < \sqrt{V}$ ; unde patet, pro  $g$  alium valorem assumi non posse praeter 0; tum autem erit  $fh = 1$  ideoque tam  $f = 1$  quam  $h = 1$ ; sicque omnes divisores in hac forma  $D = r^2 + s^2$  continentur, ita ut summa duorum quadratorum alios divisores non admittat, nisi qui ipsi sint summae duorum quadratorum. Altera autem forma divisorum erit  $4i + 1$ , et excludentur omnes numeri formae  $4n + 3$  sive  $4n - 1$ . Quod si ergo demonstrari possit, formulam  $4i - 1$  omnes plane continere numeros primos, qui nequeunt esse divisores formae  $p^2 + q^2$ , tum simul demonstratum erit, etiam omnes divisores primos formae  $4i + 1$  fore summam duorum quadratorum. Hoc autem iam dudum a me post Remanum est demonstratum.

Exemplum 2.

§. 18. Invenire omnes divisores primos formae

$$p^2 - q^2.$$

Solutio.

Hoc exemplum ad problema quartum referur, estque  $n = 1$ , et quia debet esse  $g < \sqrt{V}$ , necessario fieri oportet

$g = 0$ , ideoque  $fh = 1$ , unde oritur haec forma divisorum:

$D = r^2 - s^2$ , quae videtur continet omnes plane numeros primos excepto binario. Quamquam enim haec forma habet factores  $r + s$  et  $r - s$ , tamen continet omnes primos, si fuerit  $r - s = 1$ , cuius ratio est peculiaris. Id etiam altera divisorum forma declarat, quae, ob  $a = 1$ , sit  $4i + 1$ , in qua omnes plane numeri imparis continentur, ita ut hoc casu nulli excludantur, alteraque forma  $4i + a$  hoc solo casu nullum locum habeat. Ceterum hic casus proprie huc non pertinet, quia divisores formae  $p^2 - q^2$  per se constant.

Exemplum 3.

§. 19. Invenire omnes divisores primos formae

$$p^2 + 2q^2.$$

Solutio.

Hic casus pertinet ad problema tertium, existente  $n = 2$ , unde cum debeat esse  $g < \sqrt{V}$ , erit  $g = 0$ , ideoque  $fh = 2$ , hinc forma divisorum erit  $= r^2 + 2s^2$ . Unde patet, numeros formae  $p^2 + 2q^2$  alios non admittere divisores, nisi qui sint eiusdem formae, quod quidem etiam iam dudum est demonstratum. Altera autem forma  $D = 8i + a$ , ob  $a = p^2$ , vel etiam  $a = p^2 + 2$ , pro  $a$  hos dat valores: 1 et 3, ita ut omnes divisores formae  $p^2 + 2q^2$  sint vel  $8i + 1$  vel  $8i + 3$ . Formae ergo, quae ex classe divisorum excluduntur, sunt  $8i + 5$  et  $8i + 7$ , quas igitur sub forma  $8i + a$  completi oportet. Quod si ergo demonstrari possit, solos numeros primos harum formarum exclusisse divisorum excludi, simul demonstratum erit, omnes numeros primos priorum formarum  $8n + 1$  et  $8n + 3$  contineri in formula  $p^2 + 2q^2$ , id quod quidem iam est ostendit in *Euclidi Op. Anal. Tom. II.*

O



sum. Ceterum binæ posteriores formulæ etiam ita exprimi possunt:  $8i \dots 1$  et  $8i - 3$ , ita ut valores ipsius  $a$  sint negativi ipsius  $a$ , id quod in genere de divisioribus formulæ  $p p + n q q$  est tenendum.

**Exemplum 4.**

§. 20. *Invenire omnes divisores primos formulæ*  
 $p p - 2 q q$  sive  $2 p p - q q$ .

**Solutio.**

Ex problemate quarto est  $n = 2$ , ideoque, ob  $g < \sqrt{2}$ , erit iterum  $g = 0$  et  $f h = 2$ , unde pro divisoribus erit  $D = r r - 2 s s$ , vel etiam  $D = 2 r r - s s$ ; unde patet has formas nullos alios divisores admittere, nisi qui ipsi sint eisdem formulæ. Pro forma autem  $D = 8 i : a$ , quia est  $a = p p$ , vel etiam  $a = p p - 2$ , valores pro  $a$  erunt  $+ 1$ , ergo omnes divisores continentur in forma  $8 i + 1$ ; excluduntur ergo omnes numeri formulæ  $8 i + 3$ . Unde si soli numeri primi formulæ  $8 i + 3$  ex classe divisorum excludantur, necesse est, ut omnes numeri primi formulæ  $8 i + 1$  in forma propofita continentur.

**Corollarium 1.**

§. 21. Cum in Problemate tertio reductio divisorum ad formam  $p p + n q q$  plerumque unico tantum modo succedat, in casu problematis quarti talis reductio semper in finis modis succedit; semper enim numeros  $p$  et  $q$  infinitis modis ita assumere liceat, ut vel ipse divisor  $D$  vel  $D f$  formulæ  $p p - n q q$  aequetur.

Corol.

iam ita exprimi  
 lius et sint nega-  
 divisoribus formulæ

primos formulæ

que, ob  $g < \sqrt{2}$ ,  
 divisoribus erit  
 patet has for-  
 it ipsi sint eius-  
 quia est  $a = p p$ ,  
 ergo omnes  
 xcluduntur ergo  
 si numeri primi  
 tur, necesse est,  
 formula propofita

ductio divisorum  
 unum modo suc-  
 cedito semper in-  
 $p$  et  $q$  infinitis  
 alior  $D$  vel  $D f$

Corol.

**Corollarium 2.**

§. 22. Casu autem huius exempli notari merebit, si fuerit  $D = p p - 2 q q$ , cum etiam fore  $D = 2 r r - s s$ , quoniam hæc duæ formulæ inter se æquales fieri possunt, his enim æquatis fit

$$p p + s s = 2 (q q + r r) = (q + r)^2 + (q - r)^2,$$

ita ut sit  $p = q + r$  et  $s = q - r$ .

**Exemplum 5.**

§. 23. *Invenire divisores primos formulæ*  $p p + 3 q q$ .

**Solutio.**

Quia hic est  $n = 3$ , ideoque  $g < 1$ , tantum erit  $g = 0$ , hincque divisor  $D = r r + 3 s s$ , ita ut etiam hoc casu omnes divisores primi sint formulæ  $p p + 3 q q$ . Quia autem limes pro  $g$  inventus ipsi unitati æquatur, quam superare non debet, eucliamus etiam casum  $g = 1$ , unde fit  $f h = 4$  ideoque vel  $f = 1$  et  $h = 4$ , vel  $f = 2$  et  $h = 2$ . Priori casu fit

$$D = r r + 2 r s + 4 s s = (r + s)^2 + 3 s s,$$

quæ est ipsa forma propofita. Altero casu fit

$$D = 2 r r + 2 r s + 2 s s,$$

quæ forma cum factorem habeat 2 statim debet

$$D = r r + r s + s s$$

quæ autem pariter ad propofitam reducitur. Nam si  $s$  est numerus par, puta  $s = 2 t$ , erit

$$D = r r + 2 r t + 4 t t = (r + t)^2 + 3 t t;$$

002

fit

fin autem  $s$  est numerus impar, etiam  $r$  debebit esse impar, quia aliquam ad casum praecedentem reuolueretur; erit ergo  $r + s$  numerus par, unde posito  $r = 2t - s$  fiet

$$D = 4tt - 2ts + ss = 3tt + (t - s)^2,$$

unde patet superiorem conclusionem etiamnum valere, semperque esse  $D = r^2 + 3ss$ . Deinde pro formula  $12i + a$ , ob  $a = pp$  erit  $a = 1$ , tum vero formula  $a = pp + 3$  dat  $a = 2$ , unde omnes diuisores continebuntur in alterutra harum formularum:  $12i + 1$  vel  $12i + 7$ , quas coniunctim ha repraesentamus:  $12i + 1, + 7$ , vel etiam hoc modo  $12i + 1, - 5$ . Si enim omnes valores ipsius  $a$  infra  $2n$  in genere deprimere liceat, admittendis scilicet numeris negativis, tum altera formula  $12i = a$ , in qua nullus diuisor continetur, erit  $12i + 5$  et  $12i + 11$ , vel  $12i - 1, + 5$ , unde patet in genere valores ipsius  $a$  negativos esse ipsius  $a$ .

**Exemplum 6.**

§. 23. *Invenire diuisores formulae*  $p^2 - 3q^2$  *etiam*  $3p^2 - 9q^2$ .

**Solutio.**

Applicando hic problema quartum erit  $n = 3$ , ideoque  $g < \frac{1}{2}i$ , consequentur  $g = 0$  et  $fh = 3$ , unde diuisor erit  $D = rr - 3ss$ . Hinc patet, hos numeros nullos alios diuisores admittere, nisi qui sint eiusdem formae. Deinde pro formula  $12i + a$ , ob  $a = pp$ , vel  $a = 3 - pp$ , alii valores non procedunt, praeter  $a = 1$ , ita ut omnes diuisores contineantur in hac forma:  $12i + 1$ . Formula igitur diuisores excludens erit  $12i + 5$ .

Scho-

**Scholion.**

§. 24. Ihas formulas iam olim expediti, et demonstrant eas alios diuisores non admittere, nisi qui sint eiusdem formae, id quod in maioribus numeris pro  $n$  affirmatis non semper contingit. Conveniet autem eos casus excludere, quibus  $n$  est vel numerus quadratus, vel per quadratum diuisibilis. Si enim foret  $n = km$ , tum formula  $pp - kmnq$  conueniret cum hac:  $pp + kqq$ .

**Exemplum 7.**

§. 25. *Invenire diuisores numerorum*  $p^2 + 5q^2$ .

**Solutio.**

Ob  $\frac{1}{2}i > g$  erit vel  $g = 0$  vel  $g = 1$ ; priori casu fit  $fh = 5$ , posteriori vero  $fh = 6$ . Prior casus dat diuisorem  $D = r^2 + 5s^2$ , quae est ipsa formula proposita; posterior vero dat vel

$$D = r^2 + 2rs + 6s^2 \text{ vel}$$

$$D = 2r^2 + 2rs + 3s^2,$$

quarum formarum illa per reductionem ad primam restit, cum fit

$$D = (r + s)^2 + 5s^2,$$

haec vero ab illa discrepat, cum inde fiat

$$2D = 4r^2 + 4rs + 6s^2 = (2r + s)^2 + 5s^2;$$

unde patet, omnes diuisores vel ipsos esse numeros huius formae, vel eorum dupla, ita ut, si ipse diuisor  $D$  non fuerit formae  $pp + 5qq$ , eius duplum  $2D$  certe futurum sit huius formae. Deinde pro forma  $20i + a$ , ob  $a = pp$  eius valores hinc nati erunt 1 et 9, ex altera autem formula

O o 3

Scho-

debit esse impar, reuolueretur;  $r = 2t - s$  fiet  $-(s)^2$ , nec valere, semperque formula  $12i + a$ ,  $a = pp + 3$  hinc in alterutra quas coniunctim iam hoc modo datus  $a$  infra  $2n$  numeris negativis, tum altera formula  $12i = a$ , in qua nullus diuisor continetur, vel  $12i - 1, + 5$ , hinc esse ipsius  $a$ .

$p^2 - 3q^2$  *etiam*

rit  $n = 3$ , ideoque  $g < \frac{1}{2}i$ , consequentur  $g = 0$  et  $fh = 3$ , unde diuisor erit  $D = rr - 3ss$ . Hinc patet, hos numeros nullos alios diuisores admittere, nisi qui sint eiusdem formae. Deinde pro formula  $12i + a$ , ob  $a = pp$ , vel  $a = 3 - pp$ , alii valores non procedunt, praeter  $a = 1$ , ita ut omnes diuisores contineantur in hac forma:  $12i + 1$ . Formula igitur diuisores excludens erit  $12i + 5$ .

Scho-

numla =  $p^2 p + 5$  colliguntur idem valores 1 et 9. Quia vero hic tantum de divisioribus agitur, pro  $a$  etiam sumi poterit  $2r \pm 1$ ; unde oriuntur valores 3, 7, sicque formula omnes divisores continens erit  $20i + 1, + 3, + 7, + 9$ , contra vero formula divisores excludens erit  $20i - 1, - 3, - 7, - 9$ . Si iam demonstrari possit, istam postremam formulam continere omnes numeros primos, qui nequeunt esse divisores formae propositae, simul demonstratum foret, omnes numeros primos in priore forma contentos certo esse divisores cuiuspiam numeri formae  $p^2 + 5q^2$ , ideoque vel ipsos vel eorum duplam eundem formam habere debere. Tales autem numeri vsque ad centum sunt

- 1, 3, 7, 23, 29, 41, 43, 47, 61, 67, 83, 89.

**Exemplum 8.**

§. 26. *Invenire divisores numerorum formae  $pp - 5q^2$ .*

**Solutio.**

Hic ex problemate quarto est  $n = 5$ , Unde ob  $g < \sqrt{\frac{1}{2}}$  sumi poterit  $g = 0$ , vel etiam  $g = 1$ . Nihil enim nocet sumere  $g = 1$ ; superfluum tantum foret, ipsi maiorem valorem tribuere. At  $g = 0$  dat divisorem  $rr - 5ss$ , hoc est formae propositae; alter vero valor  $g = 1$  dat  $fh = 4$  ideoque vel

$$D = rrr + 2rss - 4ss, \text{ vel}$$

$$D = 2rrr - 1 - 2rs - 2ss.$$

Prior reducitur ad  $D = (r+s)^2 - 5ss$ , hoc est ad propositam, posterior vero per 2 divisa dat divisorem,

$$D = r^2 + r^2 - ss,$$

quae

1 et 9. Quia veteriam sumi poterit formula omnes  $7, + 9$ , contra  $-1, -3, -7, -9$  formulam continere divisores formae numeros primos cuiuspiam vel eorum duplam numeri vsque

- 83, 89.

formae  $pp - 5q^2$ .

unde ob  $g < \sqrt{\frac{1}{2}}$  Nihil enim nocet ipsi maiorem valorem  $rr - 5ss$ , hoc est dat  $fh = 4$

est ad propositam,

quae

quae forma etiam ad propositam reducitur, quod ita ostendo. Vel ambo numeri  $r$  et  $s$  erunt impares, vel altera par, alter impar. Pro casu posteriore fit  $s = 2t$  erique

$$D = rr + 2rt - 4tt, \text{ sine } D = (r+t)^2 - 5tt.$$

Sin autem ambo numeri sint impares, erit eorum summa  $r+s$  par, puta  $2t$ , ideoque  $r = 2t - 5$ , unde sit

$$D = 4tt - 2ts - ss = 5tt - (t+s)^2$$

Paret igitur, omnes divisores numerorum formae propositae quoque eiusdem esse formae. Iam pro forma  $20i + a$  valor  $a = p^2$  praebet 1 et 9, alter autem valor  $a = 5 - p^2$  praebet hndem 1 et 9, ita vt omnes divisores continentur in hac forma  $20i + 1, \pm 9$ . Altera autem forma divisores excludens erit  $20i + 3, \pm 7$ .

**Scholion.**

§. 27. Quoniam ex his exemplis iam factis liquet, quomodo pro minoribus numeris  $n$  singulas has operationes institui oporteat, aliquot exempla circa numeros maiores adhuc afferamus.

**Exemplum 9.**

§. 28. *Invenire omnes divisores primos numerorum formae  $pp - 17q^2$ .*

**Solutio.**

Cum sit  $\sqrt{\frac{1}{2}} < 3$ , pro  $g$  habebimus tres valores 0, 1, 2. Primo fit  $g = 0$ , ideoque  $fh = 17$ , hinc divisores oriuntur  $G = r^2 + 17s^2$ , ideoque ipsius formae propositae. secundo sumatur  $g = 1$ , erit  $fh = 18 = 1. 18 = 2. 9 = 3. 6$ , unde nascuntur hae formae:

2. D

$$1^{\circ}. D = rrr + 2rs + 18ss = (r+s)^2 + 17ss$$

$$2^{\circ}. D = 2rr + 2rs + 9ss, \text{ unde fit}$$

$$2D = 4rr + 4rs + 18ss = (2r+s)^2 + 17ss;$$

Ita ut 2D fit formae propolifae:

$$3^{\circ}. D = 3rr + 2rs + 6ss$$

cuius triplum induit formam propolifam:

Tertio fit  $g = 2$  ideoque  $fh = 2r = 1, 2r = 3, 7;$  unde

ortur

$$1^{\circ}. D = rrr + 4rs + 2xss = (r+2s)^2 + 17ss$$

$$2^{\circ}. D = 3rr + 4rs + 7ss$$

cuius triplum iterum formam propolifam induit. Quamobrem omnes diuisores ita erunt comparati, ut vel ipsi, vel eorum dupla, vel eorum tripla habeant formam propolifam. Quod deinde ad formam  $68i + a$  attinet, valor  $a = pp$  praebet numeros, 1, 9, 25, 49, 13, 53, 33, 21; aliter autem valor  $a = pp + 17$  dat 21, 33, qui numeri cum praecedentibus conveniunt. Qui autem hic etiam subdupla et subtripla occurrere possunt, primo patet formam  $a = \frac{pt+12}{2}$  nullos valores idoneos: at  $a = \frac{pt}{2}$  sequentes praebet numeros: 3, 27, 7, 11, 39, 23, 31, 63. Deinde vero formula  $a = \frac{pt+12}{2}$  dat 9, 21, etc. qui numeri iam occurrunt. Denique formula  $a = \frac{pt+12}{2}$  praebet 7, 11, 27, etc. qui idem iam adsunt. Quamobrem omnes valores idonei pro  $a$  erunt

$$1, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 49, 53, 63.$$

Hic autem numeri multo facilius inveniiri possunt; statim enim atque aliquos tantum reperimus, quoniam nominus, eorum producta ex binis pluribusque etiam occurrere debent, ante omnia autem omnes numeri quadrati per se occurrunt, ex

ex 1  
runt  
numi  
figno  
tem

Si h  
nebu  
ex q

nibus  
literi  
quam  
alii f

hac j

de hi  
que  
fores  
fiexqu  
Ei

7ss

17ss;

3, 7; unde

17ss

Quamobrem vel ipsi, vel propolifam, lor  $a = pp$  et autem valores praecedentibus subtripla occurrere debent, primo patet formam  $a = \frac{pt+12}{2}$  nullos valores idoneos: at  $a = \frac{pt}{2}$  sequentes praebet numeros: 3, 27, 7, 11, 39, 23, 31, 63. Deinde vero formula  $a = \frac{pt+12}{2}$  dat 9, 21, etc. qui numeri iam adsunt.

$$1, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 49, 53, 63.$$

ostunt; statim in nominus, irtere debent, se occurrunt, ex

ex quibus, quia etiam 3 occurrit, iam omnes plane reperuntur. Quod si iam omnes hos numeros infra sensum numeri 68 deprimamus, dum maiorum complementa ad 68 figno — affecta apponimus, tum valores ipsius  $a$  sequentem feriem constituent:

$$+1, +3, -5, +7, +9, +11, +13, -15, -19, +21, +23, +25, +27, -29, +31, +33.$$

Si iam omnium horum numerorum signa mutemus, obinebimus omnes valores literae  $a$ , pro formula  $68i + a$ , ex qua omnes diuisores sunt exclusi.

### Corollarium 3.

§. 29. Hinc igitur perspicuum est, etiam pro omnibus aliis numeris positivis loco  $n$  assumtis in valoribus literae  $a$  omnes plane occurrere numeros impares minores quam  $2n$ , et qui simul ad  $n$  sint primi, dum alii figno  $+n$  alii figno — sunt affecti.

### Exemplum 10.

§. 10. *Invenire omnes diuisores primos numerorum in hac formula:  $pp - 199q$ , vel etiam  $19pp - 9q$  contentorum.*

### Solutio.

Hic igitur ob  $n = 19$  erit  $g < \sqrt{19}$ , ideoque  $g < 2$ , unde habebimus vel  $g = 0$  vel  $g = 1$ . Sit primo  $g = 0$  eritque diuisor  $D = rr - 19ss$  ob  $fh = 19$ , ideoque hi diuisores iam sunt ipsius formae propolifae. Sit porro  $g = 1$  fiexque

Exteri Op. Anal. Tom. II.

P P

f h

$$fh = 19 - 1 = 18 = 1, 18 = 2, 9 = 3, 6;$$

unde tres casus sunt euoluenti :

$$1. D = rrr + 2rs - 18ss = (r+s)^2 - 19ss$$

quae forma iam in propofita continetur.

$$2. D = 2rr + 2rs - 9ss,$$

cuius duplum ad formam propofitam redit.

$$3. D = 3rr + 2rs - 6ss$$

cuius triplum in forma propofita continetur. Siquae omnes diuifores quaefiti vel ipfi, vel eorum dupla, vel eorum tripla in forma propofita continentur. Deinde pro forma  $4ni + a$ , fine  $76i + a$  valores ipsius  $a$  ex fequentibus formulis derivari debent:

$$1. a = pp \text{ dat } 1, 9, 25, 49, 5, 45, 17, 73, 61.$$

2.  $a = \frac{2}{3}p$  dat nullos valores idoneos, quia omnes fortent pares. 3.  $a = \frac{1}{2}p$ , fine  $a = 3it$ , praebet hos valores :

$$3, 27, 75, 71, 15, 59, 51, 67, 31.$$

$$4. a = 19 - pp \text{ dat } 15, 3, \text{ etc.}$$

qui iam occurrunt,

$$5. a = \frac{12 - 2}{3}p \text{ dat } 9, 5, 3, \text{ etc.}$$

qui iidem iam adfunt.

$$6. a = \frac{11 - p}{3} \text{ dat } 5, 1, 15, \text{ etc.}$$

qui etiam adfunt. Quamobrem omnes numeri idonei pro  $a$  affumendi, quoniam cum poffine quam negatiae accipi poffunt, infra 38 deprimi poffunt, dum fcilicet maiorum complementa ad 76 apponuntur.

$$1, 3, 5, 9, 15, 17, 25, 27, 31.$$

Pro

Pro altera autem forma  $76i + a$ , in qua nulli diuifores occurrere poffunt, valores ipsius  $a$  funt fequentes:

$$7, 11, 13, 21, 23, 29, 33, 35, 37.$$

### Scholion.

§. 31. Haecenus alios numeros pro  $n$  non affumimus, praeter primos, quamobrem etiam adhuc adtingamus duo exempla circa numeros compofitos.

### Exemplum II.

6, 32. *Invenire omnes diuifores primos numerorum in hac forma contentorum: pp + 30qq.*

### Solutio.

Hic ob  $n = 30$  et  $g < \sqrt{10}$ , loco  $g$  quatuor valores affumi conveniet, 0, 1, 2, 3 quos ergo singulos percurramus

I.  $g = 0$  praebet  $fh = 30$ , unde pro diuifore D fequentes formulae nascuntur:

$$1. D = rrr + 30ss,$$

$$2. D = 2rr + 15ss;$$

$$3. D = 3rr + 10ss$$

$$4. D = 5rr + 6ss$$

quarum prima cum forma propofita congruit, tum vero fecundae duplum, certitae triplum et quartae quintuplum; vbi noctetur, loco quintupli etiam feptuplum sumi poffe, quandoquidem si fuerit

$$5D = pp + 30qq,$$

P p 2

tum

Pr

cu

fm  
m

in

res  
cum  
I  
form

quat  
eunc  
noeci  
doge

ne omnes  
el eorum  
ro forma  
aquentibus

I.  
es fortent  
res :

idnei pro  $a$   
accipi poff-  
rumi com-

Pro

tum etiam erit

$$6D = pp + 30qg$$

II. Sit iam  $g=1$ , erit  $fh=31$ , unde unica forma nascitur

$$D = rr + 2rs + 3rs = (r+s)^2 + 30ss,$$

quae est ipsa forma propofita.

III. Sit  $g=2$ , erit  $fh=34=1 \cdot 34=2 \cdot 17$ ; unde duae

formae nascuntur

$$1. D = rr + 4rs + 34ss = (r+2s)^2 + 30ss.$$

$$2. D = 2rr + 4rs + 17ss,$$

eius duplum ad formam propofitam reduceatur.

IV. Sit  $g=4$ , eritque  $fh=39=1 \cdot 39=3 \cdot 13$ , unde iterum

duae nascuntur formae

$$1. D = rr + 6rs + 39ss = (r+3s)^2 + 30ss$$

$$2. D = 3rr + 6rs + 13ss,$$

eius triplum induit formam propofitam. Ex his igitur fequitur, omnes diftiores D ita esse comparatos, ut vel D, vel 2D, vel 3D, vel 6D in forma propofita continentur.

Deinde vero pro forma  $4ni + a = 120i + a$  ante omnia noceat, multitudinem omnium numerorum minorum quam 120 finitque ad 120 primorum esse 32, unde iam certo inferte poffimus, numerum valorum tam literae  $a$  quam  $\alpha$  effe 16. Cum igitur primo in  $a$  omnes numeri quadrati occurrant, formula  $a = pp$  dabit hos tantum numeros: 1 et 49: at vero formulae  $2p^2$ ,  $3p^2$  et  $4p^2$  nullos plane praebent numeros ad 120 primos. Altera vero forma  $a = pp + 30$  praebet hos tantum numeros: 31, 79. Hinc autem porro  $a = 2p + 15$ , sine haec:  $a = 2it + 15$  praebet 17, 23, 47, 113. Porro  $a = 2t + 10$ , sine  $a = 3it + 10$  praebet 13, 37. Haec igitur

tur

$$a = 1$$

tant

huc

multa

simae

Sic

prael

mus

Quoc

comp

ia di

forma nascitur

ss,

unde duae

$$+ 30ss.$$

unde iterum

$$- 30ss$$

unde iterum

$$- 30ss$$

unde iterum

$$- 30ss$$

vbi o  
vel fi  
tur o  
tus o

his igitur fe-  
s, ut vel D,  
1 continentur.  
ante omnia  
minorum quam  
iam certo in-  
rae  $a$  quam  $\alpha$   
ri quadrati oc-  
ri numeros: 1 et  
numeros: 1 et  
2 praebent ni-  
 $a = pp + 30$   
autem porro  
17, 23, 47, 113.  
37. Haec igitur

pp +  
contin  
classis  
quorum  
vel et  
Hae i  
litera  
praese

pp + 30  
quorum  
vel et  
Hae i  
litera  
praese

tur forma tantum dat duos valores. Denique  $a = 2p + 10$ , sine

$a = 6t + 5$  dat hofae: 11, 29, 59, 101. Hoc autem modo tantum 14 proferunt valores pro litera  $a$ , ita ut duo ad huc deliderentur. Verum hic perpendendum est, loco formulae  $pp + 30$  generalius poni poffit  $pp + 30qg$ , unde fumendo  $p = 3t$  et per 3 dividendo factui poterit  $a = 3it + 10qg$ . Sic nunc  $g = 2$ , fietque  $a = 3it + 40$ , unde casus  $t = 1$  praebet  $a = 43$ , at  $t = 3$  dat  $a = 67$ ; hocque modo natu huius omnes 16 valores ipsius  $a$ , qui ordine ita procedunt: 1, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 49, 59, 67, 79, 101, 113.

Quod si iam loco numerorum maiorum quam 60 eorum complementa ad 120 cum signo - ferbantur, isti numeri ita difponi poterunt: +1 - 7, +11, +17, -19, +23, +29, +31, +37, -41, +43, +47, +49, -59, +59,

vbi omnes plane numeri impares ad 30 primi occurrunt: vel signo + vel - affecti, vbi si signa mutantur, habebuntur omnes valores literae  $\alpha$  pro formula  $120i + \alpha$ , cuius omnes numeri ex classe diftiorum excluduntur.

**Corollarium I.**

§ 33. Omnes ergo diftiores numerorum formae  $pp + 3 \cdot qg$  in quatuor classes diftribuantur, quarum prima continet eos, qui ipsi funt formae  $pp + 30qg$ ; fecunda classis vero eos, quorum dupla funt eius formae, tertia, quorum tripla et quarta denique eos, quorum quintupla vel etiam fextupla ad formam  $pp + 30qg$  reduci poffunt. Hae igitur quatuor classes, si formam propofitam  $pp + 30qg$  litera  $p$ , diftiores vero litera  $D$  designemus, hoc modo repraesentari poffunt:

I.  $D = F$ ; II.  $2D = F$ ; III.  $3D = F$ ; IV.  $5D = F$ ;  
 ubi notasse iuvabit, si fuerit  $2D = F$ , tum etiam fore  
 $15D = F$ ; similique modo si fuerit  $3D = F$ , erit etiam  
 $10D = F$ ; at si fuerit  $5D = F$ , erit etiam  $6D = F$ .

Corollarium 2.

§. 34. Quando dicimus, omnes divisores numero-  
 rum formae propositae  $pp + 30qq$  in forma  $120i + a$  con-  
 tineri, id non ita est intelligendum, quasi omnes numeri  
 in formula  $120i + a$  contenti essent divisores, sed inde ex-  
 cludi debent omnes illi, qui per quempiam numerum for-  
 mae  $120i + a$  sunt divisibiles. His autem sublati maxime  
 probable videtur, omnes reliquos numeros formulae  $120i + a$ ,  
 ideoque imprimis numeros primos, certe fore divisores cu-  
 iuspiam numeri formae  $pp + 30qq$ . Illi autem numeri  
 primi in formula  $120i + a$  contenti facili negotio quousque  
 libenter assignari possunt, quippe qui hoc ordine vsque ad  
 240 progrediantur

- 1, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 59, 67, 79, 101, 113,
- 131, 137, 149, 151, 157, 163, 167, 179, 199, 233.

Corollarium 3.

§. 35. Quoniam omnes divisores sunt quadruplexis  
 generis, inde etiam valores ipsius  $a$  in quatuor classes distri-  
 bui conveniet, prouti inde oriuntur divisores vel primae,  
 vel secundae, vel tertiae, vel quartae classis, quibus ergo  
 subscriptus characteres cuiusque classis 1, 2, 3, 6, hoc modo:  
 1, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 49, 59, 67, 79, 101, 113  
 1, 6, 3, 2, 2, 6, 1, 3, 3, 2, 1, 6, 3, 1, 6, 2.

Hic igitur notari meretur, singulas classes quater occurrere.  
 Exem-

IV.  $5D = F$ ;  
 I etiam fore  
 $15D = F$ , erit etiam  
 $10D = R$ .

fores numero-  
 $120i + a$  con-  
 tines numeri  
 sed inde ex-  
 cludi maxime  
 numerum for-  
 mae  $120i + a$ ,  
 sublati maxime  
 divisores cu-  
 iuspiam numeri  
 primo quousque  
 line vsque ad  
 240, 101, 113,  
 233.

he quadruplexis  
 r classes distri-  
 s vel primae,  
 quibus ergo  
 6, hoc modo:  
 1, 11, 13, 17, 23,  
 1, 6, 3, 2, 2,  
 later occurrere.  
 Exem-

Exemplum II.

§. 36. Invenire omnes divisores primos numerorum is  
 hac forma:  $pp - 30qq$ , sive in hac:  $30pp - qq$  contentorum.

Solutio.

Cum hic sit  $\sqrt{3} < 3$ , pro littera  $g$  habemus tan-  
 tum tres valores 0, 1, 2. Hinc cum sit  $fh = 30 - gg$ , pro  
 primo casu erit  $fh = 30$ , pro secundo  $fh = 29$  et pro tertio  
 $fh = 26$ , quos igitur calus evolvamus.

I. Sit  $g = 0$  et hinc nascuntur sequentes valores:

- 1°.  $D = rr - 30ss$ ,
- 2°.  $D = 2rr - 15ss$ ,
- 3°.  $D = 2rr - 10ss$ ,
- 4°.  $D = 5rr - 6ss$ .

II. Si  $g = 1$  vicia forma nascitur

$D = rr + 2rs - 29ss = (r + s)^2 - 30ss$ ,

quae ergo est ipsa forma proposita.

III. Si  $g = 2$  oriuntur duae formulae

1°.  $D = rr + 4rs - 26ss = (r + 2s)^2 - 30ss$ ;  
 hanc ipsa proposita;

2°.  $D = 2rr + 4rs - 13ss$ ,

cuius duplum sit numerus formae propositae. Hinc ergo  
 nascuntur quadruplexis generis divisores, qui posita littera  $g$   
 pro formula proposita sunt

I.  $D = E$ , II.  $2D = F$ , III.  $3D = F$ , IV.  $6D = F$ .

Deinde vero pro formula omnes divisores contentae  $120i + a$   
 erit primo vel  $a = pp$ , vel  $a = 2r$  vel  $a = 2s$  vel  $a = \frac{r+s}{2}$ ;  
 unde

Corollarium 1.

§. 37. Hoc igitur casu, admisso meo Theoremate, quod omnes numeri primi in forma  $4ni + a$  contenti sunt sint divisores numerorum formae  $pp + nqq$ ; numeri primi ex nostra formula  $120i + a$  ordi vsque ad 240 sunt sequentes:

- 1, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 71, 83, 101, 103, 107, 113, 127, 137, 139, 149, 157, 191, 223, 227, 233.

Corollarium 2.

§. 38. Quoniam in hac evolutione vidimus, eosdem numeros ex diversis classibus ortos esse, manifestum est nequicquam quatuor classes diversas esse constitutas, sed binas earum in vnam coalescere posse. Primo enim omnes divisores quartae classis, pro quibus erat  $5D = F$ , sine etiam  $6D = F$ , iam in prima classe  $D = F$  reperitur, ita ut semper, quoties fuerit  $5D = F$ , etiam futurum sit  $D = F$ . Simili modo divisores tertiae classis etiam continentur in classe secunda. Quod si enim fuerit  $3D = F$ , semper etiam erit  $2D = F$ , quamobrem omnes divisores pro forma proposita  $pp - 30qq$ , vel  $30pp - qq$  ad duas tantum classes priores reuocari possunt: semper enim erit vel  $D = F$  vel  $2D = F$ .

Corollarium 3.

§. 39. Omnes igitur numeri primi ex nostra formula  $120i + a$  oriundi dupliciter erunt generis, dum vel ipsi vel eorum dupla formam propositam haberi possunt, quos simili modo ut ante distingui conueniet, subscribendo singulis valoribus characteres vel 1 vel 2

Euleri Op. Anal. Tom. II. Q 9 1, 7,

unde alii numeri ad 30 primi orti nequeunt nisi ex prima forma  $a = pp$ , ideoque duo tantum valores hinc nascuntur: scilicet 1 et 49. Altera autem forma erat  $a = 30 - pp$ , vel  $1 - pp$ , vel  $2 - pp$ , vel  $3 - pp$ , quarum prima  $a = 30 - pp$  praebet hos numeros: 29, 19, 9. Quia autem loco 30 ponere possumus  $30qq$ , formula  $a = 120 - pp$  praebet insuper hos valores: 119, 71. Secunda ad formam  $a = 211 - 15$  reducta dat hosce numeros: 13, 7, 17, 83, 103, 107. Haec vero formulae aequivalent  $15pp - 2qq$ ; ergo summo  $p = 3$  erit quoque  $a = 135 - 2qq$ ; unde procedunt 13, 7, 103; ideoque insuper notus 103 accedit. Ex tertia forma  $a = 311 - 10$  hosce novos numeros nascimur: 7, 17, forma autem affinis  $a = 1011 - 3$  praebet insuper 37. Ex vltima forma  $511 - 6$  nascuntur hi valores: 1, 119; ex forma vero affini  $a = 611 - 5$  isti: 1, 19, 49, 91. Hinc imprimis notandum est, eosdem numeros ex diversis classibus orti posse. Proderunt autem hactenus

1, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 49, 71, 83, 91, 103, 107, 113, 119 quorum valorum numerus quidem tantum est 15, cum esse deberet 16; quia autem notimus, cuiusque numeri complementum ad 120 etiam occurrere debere, iste defectus facile suppletur. Deera scilicet 101 tanquam complementum ipsius 19, Quia autem numeri  $a$  tam possitue quam negative accipi possunt, complementa reuocare licet, ita ut pro  $a$  habeamus octo sequentes valores:

1, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 49  
 reliqui igitur numeri praebent valores litterae  $a$ , qui erunt totidem  
 11, 23, 31, 41, 43, 47, 53, 59.

Corol-

qui prima  
 leuntur:  
 $10 - pp$ ,  
 $1 - 30 - pp$   
 $30$  po-  
 ebet in-  
 $1 - 211 - 15$   
 hic vero  
 $= 3$  erit  
 que in-  
 $11 - 10$   
 n affinis  
 $1 - 511 - 6$   
 $= 611 - 5$   
 eosdem  
 t autem  
 $113, 119$   
 rum esse  
 eri com-  
 elus fi-  
 ementum  
 un nega-  
 a ut pro  
 qui erunt

Corol-



1, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 49  
1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1.

Vbi notetur, ambos characteres eisdem occurrere.

Scholion.

§. 40. Quod si ergo pro numeris cuiuscunque formae  $pp \pm nqg$  omnes divisores primi d. siderentur, eos facillime ex nostra forma generali  $4ni + a$  assignare licet, dum contra, si formulis ab Illustri *La Grange* exhibitis vitellimus, opus foret maxime molestum, ex singulis formis  $frs + 29rs + hs$  omnes numeros primos elicere; quamobrem maxime est optandum, vt demonstratio firma illius mei afferri debeat, quippe quo demum ista Theoria ad summum perfectionis gradum euehatur. Arbitror autem, talem demonstrationem mox fortasse sperari posse; si sequentia momenta probe perpendantur.

1). Postquam pro formula propofita quacunquē  $pp \pm nqg$  ambae meae formulae  $4ni + a$  et  $4ni + a$  fuerint constitutae, eae simul omnes plane numeros impares ad propofitum  $n$  primos complectuntur; tum vero omnes divisores ad formam priorem  $4ni + a$  referuntur; nulli autem numeri alterius formae  $4ni + a$  possunt esse divisores propofitae, sine omnes numeri posterius formae ex classe divisorum penitus excludantur.

2). Probe perpendatur, quovis casu omnes valores ipsius  $a$  egregia lege inter se cohaerere, iam vt omnes constantem quasi ambitum quendam compleant constituent, in quo nihil deficiat nihilque abundet, grandaequidem omnia producta ex hinc pluribus horum numerorum iterum in eadem

et idem  
si fin  
et tu  
re in  
m m  
se di  
m se  
di di  
cl

etc.

scunque for-  
entur, eos  
ignare licet,  
exhibitis vi  
ignis formis  
ios elicere;  
ratio firma  
ista Theo-  
r. Arbitror  
erari posse;

quacunquē  
r  $4ni + a$   
veros impares  
vero omnes  
untur; nulli  
unt esse divi-  
formae ex  
fis

omnes valores  
omnes con-  
stantiam, in  
videm omnia  
m iterum in  
eadem

eadem classe occurrunt, iam vt simul atque aliqui valores idonei pro  $a$  fuerint inventi, ex iis reliqui omnes facie defini queant, praecipue quoniam omnes numeri quadrati eorumque residua respectu divisoris  $4n$  certe ingrediuntur. Vnde si hoc modo omnia producta, atque etiam potestates numerorum iam iuuentorum inferantur, mox tota ista classis ita adimplebitur, vt multitudine omnium numerorum huc pertinentium semper sit semel omniplane numerorum ad  $4n$  primorum eoque minorum; altera vero semel praebit classem numerorum  $a$ , qui nullo modo divisores evadere possunt.

3). Hinc igitur patet, ambas istas classes discrimine maxime memorabili et in natura ipsa numerorum fundato a se invicem discrepare, atque adeo essentialiter a se invicem distingui, iam vt numeri alterius classis natura sua ab altera classe prorsus sint diuersi.

4). Quoniam nulli numeri classis  $4ni + a$  vquam esse possunt divisores vilius numeri formae  $pp \pm nqg$ : ista classis tanquam origo spectari debet omnium numerorum, quorum natura ab indole divisorum abhorret, quae repugnantia quoque ad omnes numeros extendi debet, qui divisibiles sunt per vllum numerum classis  $4ni + a$ . Si enim tales numeri possent esse divisores, etiam isti huius classis numeri forent divisores, id quod naturae rei repugnat.

5). Cum autem producta ex hinc numeris classis  $4ni + a$  in classem divisorum  $4ni + a$  transeant, manifestum est, in prima classe plurimos occurrere debere ab indole divisorum alienis; omnes scilicet eos, qui per vllum numerum alterius classis sunt divisibiles.

Q q 2

6).

6). Quod si iam omnes isti numeri in classe  $4ni+a$  delectantur sine excludantur, qui natura diuisorum refragantur, maxime probabile videtur, reliquos numeros omnes indole diuisorum fore praedictos. Cum hoc modo tantum numeri compositi expungantur, evidens est omnes plane numeros primos in forma  $4ni+a$ , contentos reuera fore diuisores cuiuspiam numeri formae  $pp+ngq$ . Totum ergo negotium huc redit, ut isti probabiliter vis perfectae demonstrationis concilietur. Haec autem veritas si qua est elegantius ita proponi potest.

**Theorema demonstrandum.**

§. 41. Si fuerit  $a$  diuisor cuiuspiam numeri formae  $pp+ngq$ , ita ut sit  $aD=pp+ngq$ , cum quoties  $4ni+a$  est numerus primus, toties quoque erit  $D(4ni+a)$ , numerus formae  $pp+ngq$ . Hic autem sequentia notari oportet. 1) Numeros  $p$  et  $q$  inter se esse debere primos. 2) Diuisorem  $a$  etiam primum esse debere ad  $n$ , quoniam diuisores ipsius  $n$  hinc excludantur. 3) Quod si forte eueniat, ut numerus  $D(4ni+a)$  non videatur in forma  $pp+ngq$  contineri, tum semper eius quadruplum, vel etiam eius productum per aliud quadratum, certe in ea contineri. Quoniam igitur hoc casu erit

$$D(4ni+a) = (2)^2 + n(2)^2,$$

haec resolutio nullam exceptionem mereri est censenda. Ita cum sit  $27=4^2+11.1^2$ , erit  $a=27$  et  $n=11$  et  $D=1$ , unde formula  $4ni+a$  enatit  $44i+27$ , quae casu  $i=1$  praebet 71, hoc est numerum primum; neque tamen in incognis esse potest  $71=pp+11q$ . Est vero

471 = 284 = 3^2 + 11.5^2 ideoque  
 $71 = (\frac{1}{2})^2 + 11.(\frac{5}{2})^2$ .

Tales autem casus raro occurrunt et ideo non sunt excipiendi, quia numeri formulae  $4ni+a$  ita ex classe diuisorum excluduntur, ut, etiam si pro  $p$  et  $q$  numeri fracti accipiantur, tamen nunquam diuisores esse queant.

**Scholion.**

§. 42. Superfluum foret has investigationes ad huiusmodi formulas:  $mp+ngq$  extendere, cum omnes diuisores numerorum formae  $mp+ngq$  semper sint etiam diuisores numerorum formae  $pp+mnq$ . Quae igitur olim in Tomo XIV Comment. Ver. Academiae de diuisoribus numerorum formae  $mp+ngq$ , sim commentatus et magnam partem ex sola inductione conclusi, nunc per egregias proprietates ab illustri La Grange demonstratas non solum plurimum illustrantur, sed etiam ad multo maiorem certitudinis gradum perducuntur, ita ut iam nihil amplius desideretur, nisi ut solida demonstratio Theorematis allati detegatur, quam nunc quidem mox expectare licebit. Mea autem methodus imprimis hac gaudet praerogativa, quod eius ope omnes plane diuisores huiusmodi formularum  $mp+ngq$  assignari et, quousque liberit, continuari possunt, id quod insuper sequenti exemplo declarabo.

**Exemplum.**

§. 43. Invenire omnes diuisores formae  $pp+39q$ .

Primo igitur per formulas illustris La Grange quarumvis omnes duersas formas horum diuisorum, et cum se

# = 39 ideoque  $\sqrt{\frac{p}{q}} < 4$ , sufficet pro  $g$  assumere hos quatuor valores : 0, 1, 2, 3.

I. Valor igitur  $g = 0$  praebet  $fh = 39$ , vnde haec duae formae nascuntur :

1°.  $rr + 39ss$ , 2°.  $3rr + 13ss$ ;

quarum prior dat divisores  $D = F$  et altera 3  $D = F$ ; denotante  $F$  formam propolitam.

II. Valor  $g = 1$  dat  $fh = 40$ , vnde nascuntur istae formae :

1°.  $D = rr + 2rs + 40ss = (r+s)^2 + 39ss$ ,

ideoque  $D = F$ .

2°.  $D = 2rr + 2rs + 20ss$ ,

quae forma autem numerus primus esse nequit.

3°.  $D = 4rr + 2rs + 10ss$ ,

quae forma iidem non dat numeros primos.

4°.  $D = 5rr + 2rs + 8ss$ ,

vnde fit 5  $D = F$ , vel etiam 8  $D = F$ .

III. Casus  $g = 2$  dat  $fh = 43$ , vnde unica forma oritur

$D = rr + 4rs + 43ss = (r+2s)^2 + 39ss$

ideoque  $D = F$ .

IV. Casus denique  $g = 3$  praebet  $fh = 48$ , vnde sequentes formae numeros primos continentes oriuntur :

1°.  $D = rr + 6rs + 48ss = (r+3s)^2 + 39ss$ ,

ideoque  $D = F$ .

2°.  $D = 3rr + 6rs + 16ss$

dat

os qua-	d	v	c	v	h	m	ci	er	vb	rel	dec	Pr	fun	per	nui	per	fecit	le sequent-	Sit	mac	per	aur	bns	cutit	
39	0	F; de-	F; de-	ur istae	5,							ma oritur	39ss						9ss,						dat

dat 3  $D = F$ , vel etiam 16  $D = F$ . Hinc igitur patet, omnino dari tria genera divisorum :

1)  $D = F$ , 2) 3  $D = F$ , 3) 5  $D = F$ .

Quibus conficiendis euoluantur formulae  $4n^2 + a = 156i + a$ , vbi primo notetur, omnium numerorum ad 156 primorum ipsoque minorum multitudinem esse 48, vnde vaeque ad sensum 78 erunt 24, quorum singuli vel positivae vel negativae summi praebent valores pro littera  $a$ . Illi ergo numeri erunt.

1, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 51, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 73, 77

vbi primo quadrata habent signum +, qui ergo sunt

+1, +25, +49;

reliquorum vero numerorum quadrata divisione per 356 deprimentur infra 78, vnde fiet

$11^2 = -35$ ,  $17^2 = -23$ ,  $19^2 = +49$ ,  $23^2 = +61$ .

Pro reliquis numericis consideremus formam  $p^2 + 39$ , vnde summo  $p = 1$  prodit 40, cuius numeri ad genus tertium pertinentis divisor 5 habet signum +. Iam quia praecedentes numeri ad genus primum sunt referendi, eorum producta per 5 etiam ad genus tertium referri debebunt, vnde nascuntur sequentes numeri :

+5, +41, -31, -19, -67, -7.

Sit nunc  $p = 2$  erique  $4 + 39 = 43$ , qui est divisor primae classis, vnde etiam numeri huius classis iam inveniuntur per 43 multiplicari dabunt divisores primae classis, qui autem, cum numerus 43 sit minimus magnus, facilius ex frequentibus reperiuntur. Sumatur igitur  $p = 3$  erique  $p^2 + 39 = 48$ , cuius divisor 3 iam est exclusus. Sit ergo  $p = 4$ , erique

que 16 + 39 = 55, cuius divisorum 5 iam tractavimus; aliter vero divisor 11 etiam ad tertiam classem pertinet, per hunc ergo numerum primae classis multiplicati erunt

$$+ 11, + 59, - 37, - 73, + 71, + 47.$$

Multiplicentur etiam numeri tertiae classis per 11 et producta depressa, qui sunt

$$+ 55, - 17, - 29, - 53, + 43, - 77.$$

referentur ad classem primam. Hoc modo omnes nostri numeri signa sua debita sunt adepti, qui cum vel ad primam vel ad tertiam classem referantur, manifestum est nullos divisores secundae classis relinquunt. Omnes scilicet hi numeri iam in prima classe continentur, quamobrem omnes valores ipsius  $a$  cum characteribus suis I vel III subscriptis ita se habebunt:

$$+ 1, + 5, - 7, + 11, - 17, - 19, - 23, + 25, - 29, - 31, 35, - 37$$

$$I \quad III \quad III \quad III \quad I \quad III \quad I \quad I \quad I \quad III \quad I \quad III$$

$$+ 41, + 43, + 47, + 49, - 53, + 55, + 59, + 61, - 67, + 71, - 73, - 77$$

$$III \quad I \quad III \quad I \quad I \quad I \quad III \quad I \quad III \quad III \quad III \quad I.$$

Neque vero classis secunda prorsus est inutilis: dantur enim numeri primi, quos ad primam classem reduimus, quorum resolutio in integris non succedit, atque adeo denominatorem quadratum 16 postulat, cuiusmodi numerus est 61, qui aliter ad primam classem redigi nequit, nisi hoc modo:  $61 = (\frac{2}{3})^2 + 39(\frac{1}{3})^2$ . Est vero  $3 \cdot 61 = 183 = 1 \cdot 1^2 + 39 \cdot 1^2$ . Quod si iam valores negativi pro  $a$  inventi in positivos convertantur, sumendis complementis ad 156, sequentes valores probantur:

$$1, 5, 11, 25, 41, 43, 47, 49, 55, 59, 61, 71, 79, 83, 89, 113,$$

$$I \quad III \quad III \quad I \quad III \quad I \quad III \quad I \quad III \quad I \quad III \quad III \quad I$$

Nunc

nus; aliter, per et pro-

es nostri primam et nullos hi numerus valores subscriptis

$$, 35, - 37$$

$$I \quad III$$

$$, - 73, - 77$$

$$I \quad III \quad I.$$

inquit enim quorum arithmetico-nernus est nisi hoc  $- 1 + 39 \cdot 1^2$  positivos valentes va-

$$, 3, 89, 113,$$

$$I \quad III \quad I$$

Nunc

Nunc igitur omnes numeri primi in forma  $156l + a$  contenti certe erunt divisores cuiuspiam numeri formae  $pp + 39q$ , atque adeo vel ipsi, vel eorum quadrupla, vel etiam tripla erunt numeri huius formae. Hinc ergo omnes divisores primi ab 1 vsque ad 312 erunt sequentes:

$$1, 5, 11, 41, 43, 47, 59, 61, 71, 79, 83, 89, 113, 127, 137, 139, 149, 157, 167, 181, 197, 199, 211, 227, 239, 269, 277, 281, 283, 293.$$

Corollarium I.

§. 44. Quo facilis intelligatur, cur hoc casu classis secundae ad primam sit revoluta, iam supra ostendimus, si divisor fuerit

$$D = fr^2 + 2grs + hss,$$

existente  $fh = g^2 + n$ , tum non solum  $Df$ , sed etiam  $Dh$  ad formam  $pp + nqq$  reduci possit. Hinc autem generalius si fuerit

$$k = fit + 2gtu + huu,$$

tum productum  $Dh$  etiam erit numerus formae  $pp + nqq$ ; factio enim calculo reperitur

$$Dh = (fit + g(is + ru) + hsu)^2 + n(is - ru)^2.$$

Quod si ergo  $k$  fieri queat quadratum, vel divisibile per quadratum, tum hoc quadratum omiti poterit. Nam si fuerit  $Dhll$  numerus formae  $pp + nqq$ , tum, etiam admissis fractionibus, erit quoque  $Dh$  eiusdem formae. Ita nostro casu pro divisoribus secundae classis erat

$$D = 3r^2 + 13s^2,$$

ideoque  $k = 3it + rgun$ , cuius valor summo  $t = 1$  et  $u = 1$  fiet  $k = 16$ , qui cum sit numerus quadratus, haec forma ad primam reducitur.

Euleri Op. Anal. Tom. II.

R r

Corol-

Corollarium 2.

§. 45. Nunc igitur omnia Theoremata, quae circa huiusmodi diuisores olim in Comment. veter. Tomo XIV. dederam, multo maiorem gradum certitudinis sunt adeptura, postquam a celeb. *la Grange* formae istorum diuisorum sunt demonstratae; atque nullum dubium esse videtur, quin mox quod in hoc genere adhuc desideratur perfecta Demonstratio inueniatur.

Corollarium 3.

§. 46. Antequam hoc argumentum penitus delectam, inmemorabilem adhuc observationem adiungam circa signa numerorum  $n$ , dum scilicet omnes eius valores infra  $2n$  designantur. Cum enim horum numerorum primus et vltimus simul sumi fiant  $2n$ , dispiciendum est, utrum hi duo numeri habeant vel paria signa vel disparia, utroque enim casu bini quicunque horum numerorum ab extremis acquiriffantes, quorum ergo summa semper est  $2n$ , etiam habebunt sine eadem signa sine contraria. Ita nostro casu, quo erat  $2n = 78$ , vltimus  $77$  habebat signum —, dum primus  $1$  semper habet signum +, vnde etiam signa binorum ab extremis acque distantium perpetuo erunt contraria. E contrario autem in Exemplo 11, vbi erat  $2n = 6c$ , vltimus numerus  $59$  habebat signum +, vnde etiam bini quicunque alii ab extremis acquiriffantes eodem signo affecti deprehenduntur, cuius quidem phaenomeni ratio haud difficile inuestigari poterit. Huiusmodi autem observationes laborem inuestigationis Diuisorum non mediocriter subleuant.

SOLVTIO QVAESTIONIS

AD

CALCVLVM PROBABILITATIS

PERTINENTIS.

QVANTVM DVO CONIVGES PERSOLVERE DEBEANT, VT SVIS HAEREDIBVS POST VTRIVSQVE

MORTEM CERTA ARGENTI SVMMA

PERSOLVATVR.

§. 1.

**A**stinimus hic eiusmodi aetiarum publicum esse constitutum, cuius facultates quotannis vicissima sui parte augeriqueant, ita vt summa 100 Rubellonum post annum ad 105 Rth. excreseat; quare si breuitatis gratia ponamus  $\frac{105}{100} = \lambda$ , praesens pecuniae summa = C post  $n$  annos aestimanda erit  $\lambda^n C$ . Vltimum autem quaeus pecuniae summa C post  $n$  annos solvenda praesenti tempore valorem habere censenda est =  $\frac{C}{\lambda^n}$ .

R r 2

§. 2.