

DE
SUMMATIONE SERIERVM
IN QVIBVS TERMINORVM SIGNA
ALTERNANTVR.

Auctore

L. EVLERO.

Conuent. exhib. d. 22 Febr. 1776.

Cum olim esset perscrutatus quemadmodum ex dato termino generali cuiusque seriei eius summam definiri conveniat, casus quo termini seriei signis alternantibus + et - sunt affecti; non parum molestiae facebat, ac demum post longas ambages mihi licuit ad formulam satis simplicem pertingere. Hac re igitur accuratius perpenſa modum inveni qui directe ad istas formulas perducit, quem igitur hoc loco exponere constitui, quandoquidem aptus videtur hanc partem Analyseos ulterius perficiendi.

Problema I.

Sit X functio quaecunque ipsius x, quae, dum loco x successue scribuntur valores $x + 1$, $x + 2$, $x + 3$, etc. induat hos valores: X' , X'' , X''' , etc. propositaque sit ista series infinita: $X - X' + X'' - X''' + X'''' -$ etc. in infinitum = S, eius summam S inuestigare.

Solutio

Solutio.

§. 1. Cum igitur S quoque sit certa functio ipsius x, abeat ea in S', si loco x scribatur x + 1, ac perspicuum est fore $S' = X' - X'' + X''' - X'''' + X''''' - \text{etc.}$ in infinitum, cui ergo seriei si proposita addatur, orietur ista aequatio $S + S' = X$, ex qua valorem functionis quaesitae S inuestigari oportet.

§. 2. Quoniam igitur functio S' nascitur ex functione S, dum loco x scribatur x + 1, ex natura differentialium erit

$$S' = S + \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial^2 S}{2 \partial x^2} + \frac{\partial^3 S}{6 \partial x^3} + \frac{\partial^4 S}{24 \partial x^4} + \frac{\partial^5 S}{120 \partial x^5} + \text{etc.}$$

Unde nobis resoluenda proponitur ista aequatio:

$$2S + \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial^2 S}{2 \partial x^2} + \frac{\partial^3 S}{6 \partial x^3} + \frac{\partial^4 S}{24 \partial x^4} + \text{etc.} = X,$$

vbi evidens est valorem ipsius S per seriem infinitam expressum iri, cuius primus terminus sit $S = \frac{1}{2} X$; ipsam vero hanc seriem huiusmodi formam esse habituram:

$$S = \frac{1}{2} X + \frac{\alpha \partial X}{\partial x} + \frac{\beta \partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{\gamma \partial^3 X}{\partial x^3} + \frac{\delta \partial^4 X}{\partial x^4} + \text{etc.}$$

§. 3. Substituamus igitur hanc seriem in nostra aequatione, et pro eius singulis partibus erit vt sequitur:

$$\begin{aligned} 2S &= X + \frac{2\alpha \partial X}{\partial x} + \frac{2\beta \partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{2\gamma \partial^3 X}{\partial x^3} + \frac{2\delta \partial^4 X}{\partial x^4} + \frac{2\epsilon \partial^5 X}{\partial x^5} + \frac{2\zeta \partial^6 X}{\partial x^6} \\ \frac{\partial S}{\partial x} &= \frac{1}{2} \dots + \alpha \dots + \beta \dots + \gamma \dots + \delta \dots + \epsilon \dots \\ \frac{\partial^2 S}{2 \partial x^2} &= \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{2} \alpha \dots + \frac{1}{2} \beta \dots + \frac{1}{2} \gamma \dots + \frac{1}{2} \delta \dots \\ \frac{\partial^3 S}{6 \partial x^3} &= \frac{1}{12} \dots + \frac{1}{6} \alpha \dots + \frac{1}{6} \beta \dots + \frac{1}{6} \gamma \dots \\ \frac{\partial^4 S}{24 \partial x^4} &= \frac{1}{48} \dots + \frac{1}{24} \beta \dots + \frac{1}{24} \gamma \dots \\ \frac{\partial^5 S}{120 \partial x^5} &= \frac{1}{240} \dots + \frac{1}{120} \alpha \dots \\ \frac{\partial^6 S}{720 \partial x^6} &= \frac{1}{1440} \dots \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

etc.
qua-

quarum serierum summa quia aequari debet functioni X, hinc sequentes orientur aequalitates:

$$2a + \frac{1}{2} = 0$$

$$2\beta + a + \frac{1}{4} = 0$$

$$2\gamma + \beta + \frac{1}{2}a + \frac{1}{12} = 0$$

$$2\delta + \gamma + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}a + \frac{1}{48} = 0$$

$$2\varepsilon + \delta + \frac{1}{2}\gamma + \frac{1}{6}\beta + \frac{1}{24}a + \frac{1}{240} = 0$$

$$2\zeta + \varepsilon + \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}\gamma + \frac{1}{24}\beta + \frac{1}{120}a + \frac{1}{1440} = 0,$$

etc.

§. 4. Quoniam hae formulae iam sufficiunt ad valores singularum litterarum α , β , γ , δ , etc. tamen hic labor nimis fieret molestus propter continuo plures fractiones in vnam summam colligendas, praecipue autem quoniam, vt mox videbimus, harum litterarum alternae sponte in nihilum abeunt; quamobrem aliam viam inire conueniet veros valores harum litterarum expeditius determinandi, quae in hoc consistit, vt euoluamus sequentis seriei summationem:

$$s = \frac{1}{2} + at + \beta t^2 + \gamma t^3 + \delta t^4 + \text{etc.}$$

Quod si enim huius seriei summam s assignare valuerimus, ex ea vicissim valores singulorum coefficientium α , β , γ , δ , etc. inuestigare licebit; vbi probe notetur, hos coefficientes profus conuenire cum iis qui in praecedentem aequationem ingrediuntur.

§. 5. Hac iam serie constituta ex inuentis relationibus inter litteras α , β , γ , δ , etc. sequentes formemus series:

$$2s = 1$$

$$\begin{aligned}
 2s &= 1 + 2at + 2\beta t^2 + 2\gamma t^3 + 2\delta t^4 + 2\varepsilon t^5 + 2\zeta t^6 + 2\eta t^7 + 2\iota t^8 + \text{etc.} \\
 st &= \frac{1}{2}t + a.. + \beta.. + \gamma.. + \delta.. + \varepsilon.. + \zeta.. + \eta.. \\
 \frac{1}{2}stt &= \frac{1}{4}.. + \frac{1}{2}a.. + \frac{1}{2}\beta.. + \frac{1}{2}\gamma.. + \frac{1}{2}\delta.. + \frac{1}{2}\varepsilon.. + \frac{1}{2}\zeta.. \\
 \frac{1}{6}st^3 &= \frac{1}{12}.. + \frac{1}{2}a.. + \frac{1}{2}\beta.. + \frac{1}{2}\gamma.. + \frac{1}{2}\delta.. + \frac{1}{2}\varepsilon.. \\
 \frac{1}{24}st^4 &= \frac{1}{48}.. + \frac{1}{24}a.. + \frac{1}{24}\beta.. + \frac{1}{24}\gamma.. + \frac{1}{24}\delta.. \\
 \frac{1}{120}st^5 &= \frac{1}{240}.. + \frac{1}{120}a.. + \frac{1}{120}\beta.. + \frac{1}{120}\gamma.. \\
 \frac{1}{720}st^6 &= \frac{1}{1440}.. + \frac{1}{720}a.. + \frac{1}{720}\beta.. \\
 &\text{etc.} \qquad \qquad \qquad \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Hae igitur series in vnam summam collectae ob relationes supra §. 3. assignatas praebunt hanc aequationem:

$$s(2 + t + \frac{1}{2}tt + \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{24}t^4 + \frac{1}{120}t^5 + \frac{1}{720}t^6 + \text{etc.}) = 1.$$

§. 6. Cum igitur, denotante e numerum cuius logarithmus hyperbolicus $= 1$, fit $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}tt + \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{24}t^4 + \text{etc.}$ evidens est aequationem inuentam reduci ad hanc formam finitam: $s(1 + e^t) = 1$, vnde totum negotium huc redit, vt valor litterae s per seriem exprimat, cuius singuli termini secundum potestates litterae t progrediantur; tum enim semper coefficientes istius seriei cum supra assumtis a, β, γ, δ congruant necesse est. Quamobrem in hoc nobis erit incumbendum, quemadmodum istam aequationem $s(1 + e^t) = 1$ aptissime in seriem infinitam conuertamus.

§. 7. Ante omnia igitur hanc aequationem a quantitate exponentiali e^t liberemus, et cum fit $e^t = \frac{1}{s} - 1$, erit $t = l \frac{1-s}{s}$, hincque differentiendo $\partial t = \frac{-\partial s}{s(1-s)}$. Ponamus hic $s = \frac{1}{2} + v$, et ista aequatio fiet.

$$\partial t = \frac{-\partial v}{(\frac{1}{2} + v)(\frac{1}{2} - v)} = \frac{+\partial v}{v^2 - \frac{1}{4}}$$

Nunc autem v aequabitur isti seriei:

$$\alpha t + \beta t^2 + \gamma t^3 + \delta t^4 + \text{etc.}$$

cuius coefficientes quaerimus.

§. 8. Aequationi inuentae tribuamus hanc formam:
 $v v - \frac{1}{4} = \frac{\partial v}{\partial t}$, ex qua facile intelligitur, cum primus terminus seriei pro v inuestigandae debeat esse αt , sequentes terminos tantum per potestates impares ipsius t esse ascensuros, quam ob rem pro v constituamus sequentem seriem:

$$v = A t + B t^3 + C t^5 + D t^7 + E t^9 + \text{etc.}$$

eritque hinc

$$\frac{\partial v}{\partial t} = A + 3 B t^2 + 5 C t^4 + 7 D t^6 + 9 E t^8 + 11 F t^{10} + 13 G t^{12} + \text{etc.}$$

pro parte vero aequationis nostrae sinistra erit

$$v v - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} + A A t + 2 A B t^4 + 2 A C t^6 + 2 A D t^8 + 2 A E t^{10} + 2 A F t^{12} + \text{etc.}$$

$$+ B B + 2 B C + 2 B D + 2 B E + \text{etc.}$$

$$+ C C + 2 C D + \text{etc.}$$

ex quarum serierum aequalitate statim concluditur fore: $A = -\frac{1}{4} = \alpha$, tum vero reliqui termini praebebunt has relationes:

$$3 B = A A,$$

$$5 C = 2 A B,$$

$$7 D = 2 A C + B B,$$

$$9 E = 2 A D + 2 B C,$$

$$11 F = 2 A E + 2 B D + C C,$$

$$13 G = 2 A F + 2 B E + 2 C D,$$

etc.

vnde patet, cum valor ipsius A sit negativus $= -\frac{1}{4}$, reliquorum valores alternatim fore positivos et negativos.

§. 9.

§. 9. Hac iam serie cum primum inuenta comparata colligitur fore:

$\alpha = A, \beta = 0, \gamma = B, \delta = 0, \varepsilon = C, \zeta = 0, \eta = D, \text{ etc.}$
 ita vt alternae litterarum graecarum sponte euanescent, vt iam supra inuimus, reliquarum vero determinatio per has nouas formulas multo facilius et promptius expediatur quam per relationes initio inuentas. Ante enim verbi gratia valores ipsius ε per quinque fractiones colligere oportebat, dum nunc littera C illi aequalis vnico membro exprimitur. His igitur nouis litteris A, B, C, D introductis summatio seriei propositae ita contrahetur vt sit

$$S = \frac{1}{2} X + \frac{A \partial x}{\partial x} + \frac{B \partial^3 x}{\partial x^3} + \frac{C \partial^5 x}{\partial x^5} + \frac{D \partial^7 x}{\partial x^7} + \text{etc.}$$

§. 10. Quo autem inuestigatio harum litterarum A, B, C, D, etc. facilior reddatur, quoniam $A = -\frac{1}{4}$ et sequentium litterarum valores euadunt alternatim positiui et negatiui, denuo nouas litteras in calculum introducamus, ponendo

$$A = -\frac{\mathfrak{A}}{4}, B = +\frac{\mathfrak{B}}{4^2}, C = -\frac{\mathfrak{C}}{4^3}, D = +\frac{\mathfrak{D}}{4^4}, E = -\frac{\mathfrak{E}}{4^5}, \text{ etc.}$$

et nunc determinaciones harum nouarum litterarum sequenti modo se habebunt.

$$\mathfrak{A} = 1,$$

$$\mathfrak{E} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{D} + 2 \mathfrak{B} \mathfrak{C}}{9},$$

$$\mathfrak{B} = \frac{\mathfrak{A} \mathfrak{A}}{3},$$

$$\mathfrak{F} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{E} + 2 \mathfrak{B} \mathfrak{D} + \mathfrak{C} \mathfrak{C}}{11},$$

$$\mathfrak{C} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{B}}{5},$$

$$\mathfrak{G} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{F} + 2 \mathfrak{B} \mathfrak{E} + 2 \mathfrak{C} \mathfrak{D}}{13},$$

$$\mathfrak{D} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{C} + \mathfrak{B} \mathfrak{B}}{7},$$

$$\mathfrak{H} = \frac{2 \mathfrak{A} \mathfrak{G} + 2 \mathfrak{B} \mathfrak{F} + 2 \mathfrak{C} \mathfrak{E} + \mathfrak{D} \mathfrak{D}}{15},$$

etc.

atque ex his litteris summatio nostra ita se habebit:

$$S = \frac{1}{2} X - \frac{\mathfrak{A} \partial x}{4 \partial x^2} + \frac{\mathfrak{B} \partial^3 x}{4^2 \partial x^3} - \frac{\mathfrak{C} \partial^5 x}{4^3 \partial x^5} + \frac{\mathfrak{D} \partial^7 x}{4^4 \partial x^7} - \text{etc.}$$

§. 11. Harum igitur litterarum A, B, C, D , etc. valores numerice euoluamus et calculo non admodum molesto expedito reperiemus sequentes valores:

$$A = 1, B = \frac{1}{3}, C = \frac{2}{3 \cdot 5}, D = \frac{17}{3^2 \cdot 5 \cdot 7}, E = \frac{62}{3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9},$$

$$F = \frac{1382}{3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11}, G = \frac{21844}{3^5 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13}.$$

Vbi numerator penultimi termini 1382 = 2.691 commonefacere potest, hos numeros in arcto nexu cum numeris Bernoullianis dictis consistere.

§. 12. Designemus igitur numeros istos Bernoullianos litteris latinis minusculis a, b, c, d , etc. ita vt fit

$$a = 1, b = \frac{1}{3}, c = \frac{1}{3}, d = \frac{3}{3}, e = \frac{5}{3}, f = \frac{691}{103}, g = \frac{35}{5}, h = \frac{3617}{15},$$

quemadmodum hos numeros in Introductione mea in *Analyfin Infinitorum*, pag. 131. exhibui, atque examine instituto valores nostrarum litterarum A, B, C, D , etc. sequenti modo exprimi poterunt:

$$A = \frac{2^1 (2^2 - 1)}{2 \cdot 3} \cdot a$$

$$B = \frac{2^3 (2^4 - 1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot b$$

$$C = \frac{2^5 (2^6 - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 7} \cdot c$$

$$D = \frac{2^7 (2^8 - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 9} \cdot d$$

$$E = \frac{2^9 (2^{10} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 11} \cdot e$$

$$F = \frac{2^{11} (2^{12} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 13} \cdot f$$

$$G = \frac{2^{13} (2^{14} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 15} \cdot g$$

$$H = \frac{2^{15} (2^{16} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 17} \cdot h$$

$$I = \frac{2^{17} (2^{18} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 19} \cdot i$$

$$K = \frac{2^{19} (2^{20} - 1)}{2 \cdot \dots \cdot 21} \cdot k$$

etc.

§. 13. In gratiam eorum, quibus non vacat istos numeros Bernoullianos ex mea Introductione depromere, eos hic, quousque equidem eos sum profecutus, hic subiungam:

$$a = 1,$$

$$a = 1,$$

$$b = \frac{1}{3},$$

$$c = \frac{1}{5},$$

$$d = \frac{3}{5},$$

$$e = \frac{5}{3},$$

$$f = \frac{611}{103},$$

$$g = \frac{35}{1},$$

$$h = \frac{3617}{14},$$

$$i = \frac{43867}{21},$$

$$k = \frac{1222277}{55},$$

$$l = \frac{854513}{3},$$

$$m = \frac{1181820155}{273},$$

$$n = \frac{76977927}{1},$$

$$o = \frac{28749461029}{15},$$

$$p = \frac{8615841276005}{231},$$

$$q = \frac{84202531453387}{85},$$

$$r = \frac{90272075042845}{3}.$$

§. 14. His igitur numeris Bernoullianis in subsidium vocatis summa nostrae seriei propositae

$$S = X - X' + X'' - X''' + X'''' - \text{etc.}$$

in infinitum sequenti modo exprimetur:

$$S = \frac{1}{2}X - \frac{(2^2-1)}{2 \cdot 3} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{(2^4-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot \frac{b}{2} \cdot \frac{\partial^3 X}{\partial x^3} - \frac{(2^6-1)}{2 \cdot \dots \cdot 7} \cdot \frac{c}{2} \cdot \frac{\partial^5 X}{\partial x^5} \\ + \frac{(2^8-1)}{2 \cdot \dots \cdot 9} \cdot \frac{d}{2} \cdot \frac{\partial^7 X}{\partial x^7} - \frac{(2^{10}-1)}{2 \cdot \dots \cdot 11} \cdot \frac{e}{2} \cdot \frac{\partial^9 X}{\partial x^9} + \frac{(2^{12}-1)}{2 \cdot \dots \cdot 13} \cdot \frac{f}{2} \cdot \frac{\partial^{11} X}{\partial x^{11}} - \text{etc.}$$

sicque Problemati nostro penitus satisfacimus.

Alia solutio Problematis propositi.

§. 15. Cum summa quaesita S sit functio ipsius x , abeat ea in T , si loco x scribatur $x + \frac{1}{2}$, atque vicissim ex hac functione T obtinebitur ipsa summa S , si loco x scribatur $x - \frac{1}{2}$, ita vt, quando inuenerimus valorem litterae T , ex eo etiam ipsa summa quaesita S innotescat. Tum vero manifestum est, si in hac functione T loco x scribatur $x + \frac{1}{2}$, tum proditurum esse valorem litterae S' . Hinc igitur ex natura differentialium habebimus

G 3

S =

$$S = T - \frac{\partial T}{2 \cdot \partial x} + \frac{\partial \partial T}{4 \cdot 2 \cdot \partial x^2} - \frac{\partial^3 T}{8 \cdot 6 \cdot \partial x^3} + \frac{\partial^4 T}{16 \cdot 24 \cdot \partial x^4} - \text{etc.}$$

$$S' = T + \frac{\partial T}{2 \cdot \partial x} + \frac{\partial \partial T}{4 \cdot 2 \cdot \partial x^2} + \frac{\partial^3 T}{8 \cdot 6 \cdot \partial x^3} + \frac{\partial^4 T}{16 \cdot 24 \cdot \partial x^4} + \text{etc.}$$

Quare cum solutio problematis contineatur in hac aequatione:
 $S + S' = X$; his valoribus substitutis emergit ista aequatio:

$$T + \frac{\partial \partial T}{4 \cdot 2 \cdot \partial x^2} + \frac{\partial^4 T}{16 \cdot 24 \cdot \partial x^4} + \frac{\partial^6 T}{64 \cdot 720 \cdot \partial x^6} + \text{etc.} = \frac{1}{2} X.$$

§. 16. Hinc statim manifestum est seriei pro T affluendae hanc formam tribui debere:

$$T = \frac{1}{2} X + \frac{\alpha \partial \partial x}{\partial x^2} + \frac{\beta \partial^4 x}{\partial x^4} + \frac{\gamma \partial^6 x}{\partial x^6} + \text{etc.};$$

hoc igitur valore in nostram aequationem introducto habebimus

$$T = \frac{1}{2} X + \frac{\alpha \partial \partial x}{\partial x^2} + \frac{\beta \partial^4 x}{\partial x^4} + \frac{\gamma \partial^6 x}{\partial x^6} + \frac{\delta \partial^8 x}{\partial x^8} + \frac{\epsilon \partial^{10} x}{\partial x^{10}} + \frac{\zeta \partial^{12} x}{\partial x^{12}} + \text{etc.}$$

$$\frac{\partial \partial T}{4 \cdot 2 \cdot \partial x^2} = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 2} + \frac{\alpha}{4 \cdot 2} + \frac{\beta}{4 \cdot 2} + \frac{\gamma}{4 \cdot 2} + \frac{\delta}{4 \cdot 2} + \frac{\epsilon}{4 \cdot 2} + \text{etc.}$$

$$\frac{\partial^4 T}{16 \cdot 24 \cdot \partial x^4} = \frac{1}{2 \cdot 16 \cdot 24} + \frac{\alpha}{16 \cdot 24} + \frac{\beta}{16 \cdot 24} + \frac{\gamma}{16 \cdot 24} + \frac{\delta}{16 \cdot 24} + \text{etc.}$$

$$\frac{\partial^6 T}{64 \cdot 720 \cdot \partial x^6} = \frac{1}{2 \cdot 64 \cdot 720} + \frac{\alpha}{64 \cdot 720} + \frac{\beta}{64 \cdot 720} + \frac{\gamma}{64 \cdot 720} + \text{etc.}$$

etc.

etc.

Quia igitur summa harum serierum aequari debet ipsi $\frac{1}{2} X$, hinc nascentur sequentes determinaciones:

$$\alpha + \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 2} = 0,$$

$$\beta + \frac{\alpha}{4 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 16 \cdot 24} = 0,$$

$$\gamma + \frac{\beta}{4 \cdot 2} + \frac{\alpha}{16 \cdot 24} + \frac{1}{2 \cdot 64 \cdot 720} = 0,$$

$$\delta + \frac{\gamma}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\beta}{2^4 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 4} + \frac{\alpha}{2^6 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 6} + \frac{1}{2 \cdot 256 \cdot 5040} = 0,$$

$$\epsilon + \frac{\delta}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\gamma}{2^4 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 4} + \frac{\beta}{2^6 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 6} + \frac{\alpha}{2^8 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 8} + \frac{1}{2 \cdot 2^{10} \cdot 1 \cdot \dots \cdot 10} = 0.$$

etc.

§. 17. Quanquam haud difficile foret hinc valores $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \text{etc.}$ elicere, siquidem prodiret $\alpha = -\frac{1}{12}$ et $\beta = \frac{5}{768}$; tamen

tamen simili modo, quō supra vñ sumus, in aliam legem, qua isti valores progrediuntur, inquiramus. Hunc in finem ponamus

$$s = \frac{1}{2} + \alpha t t + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \epsilon t^{10} + \text{etc.}$$

vnde formemus sequentes series:

$$s = \frac{1}{2} + \alpha t t + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \epsilon t^{10} + \zeta t^{12} + \eta t^{14} + \text{etc.}$$

$$\frac{s t t}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot 2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\alpha}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\beta}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\gamma}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\delta}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\epsilon}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{\zeta}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \text{etc.}$$

$$\frac{s t^4}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} = \frac{1}{2 \cdot 2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{\alpha}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{\beta}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{\gamma}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{\delta}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{\epsilon}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \text{etc.}$$

$$\frac{s t^6}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} = \frac{1}{2 \cdot 2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{\alpha}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{\beta}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{\gamma}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{\delta}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \text{etc.}$$

etc.

etc.

Hae igitur series in vnam summam collectae, ob superiores litterarum $\alpha, \beta, \gamma, \text{etc.}$ determinationes, nobis suppeditabunt hanc aequationem:

$$s \left(1 + \frac{t t}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{t^4}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{t^6}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \frac{t^8}{2^8 \cdot 1 \cdot 8} + \text{etc.} \right) = \frac{1}{2}.$$

Sicque totum negotium huc est reductum, vt valor litterae s per idoneam seriem secundum potestates ipsius t procedentem exprimatur. Vbi tantum notetur, posito $t = 0$ fieri debere $s = \frac{1}{2}$.

§. 18. Cum iam, denotante e numerum cuius logarithmus hyperbolicus $= 1$, fit

$$e^{\frac{1}{2}t} = 1 + \frac{t}{2^1 \cdot 1} + \frac{t t}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{t^3}{2^3 \cdot 1 \cdot 3} + \frac{t^4}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{t^5}{2^5 \cdot 1 \cdot 5} + \text{etc. et}$$

$$e^{-\frac{1}{2}t} = 1 - \frac{t}{2^1 \cdot 1} + \frac{t t}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} - \frac{t^3}{2^3 \cdot 1 \cdot 3} + \frac{t^4}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} - \frac{t^5}{2^5 \cdot 1 \cdot 5} + \text{etc.}$$

harum duarum serierum semi-summa nobis praebit

$$\frac{1}{2} (e^{\frac{1}{2}t} + e^{-\frac{1}{2}t}) = 1 + \frac{t t}{2^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{t^4}{2^4 \cdot 1 \cdot 4} + \frac{t^6}{2^6 \cdot 1 \cdot 6} + \text{etc.},$$

hinc

hinc patet nostram aequationem futuram esse $s(e^{\frac{1}{2}t} + e^{-\frac{1}{2}t}) = 1$,
 unde valorem ipsius s per seriem euolui oportet.

§. 19. Ex ista aequatione igitur deducimus statim

$$e^{\frac{1}{2}t} + e^{-\frac{1}{2}t} = \frac{1}{s},$$

quae differentiata et bis sumpta praebet

$$e^{\frac{1}{2}t} + e^{-\frac{1}{2}t} = -\frac{2\partial s}{s s \partial t^2},$$

quarum aequalitatum summa dat

$$2e^{\frac{1}{2}t} = \frac{1}{s} - \frac{2\partial s}{s s \partial t};$$

differentia vero

$$2e^{-\frac{1}{2}t} = \frac{1}{s} + \frac{2\partial s}{s s \partial t};$$

harum autem productum praebet

$$4 = \frac{1}{s s} - \frac{4\partial s^2}{s^4 \partial t^2} \text{ siue } \frac{4\partial s^2}{\partial t^2} = s s - 4s^4.$$

Differentietur iam ista aequatio denuo, sumto ∂t constante, ac
 habebimus $\frac{4\partial \partial s}{\partial t^2} = s - 8s^3$, siue $\frac{4\partial \partial s}{\partial t^2} + 8s^3 - s = 0$.

§. 20. Pro hac aequatione resoluenda statuamus vti
 supra assumimus

$$s = \frac{1}{2} + \alpha t t + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \text{etc.}$$

unde fit

$$\frac{\partial \partial s}{\partial t^2} = 1.2\alpha + 3.4\beta t t + 5.6\gamma t^4 + 7.8\delta t^6 + 9.10\epsilon t^8 + \text{etc.}$$

Deinde ob $2s = 1 + 2\alpha t t + 2\beta t^4 + 2\gamma t^6 + 2\delta t^8 + \text{etc.}$
 erit cubum sumendo

$$\begin{aligned}
 s^3 &= 1 + 6\alpha i + 6\beta i^2 + 6\gamma i^3 + 6\delta i^4 + 6\varepsilon i^5 + 6\zeta i^6 + \text{etc.} \\
 &+ 12\alpha^2 + 24\alpha\beta + 24\alpha\gamma + 24\alpha\delta + 24\alpha\varepsilon + \text{etc.} \\
 &+ 8\alpha^3 + 12\beta\beta + 24\beta\gamma + 24\beta\delta + \text{etc.} \\
 &+ 24\alpha\alpha\beta + 24\alpha\alpha\gamma + 12\gamma\gamma + \text{etc.} \\
 &+ 24\alpha\beta\beta + 24\alpha\alpha\delta + \text{etc.} \\
 &+ 48\alpha\beta\gamma + \text{etc.} \\
 &+ 8\beta^3 + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

quae series aequalis esse debet $s - \frac{4\partial\partial s}{\partial i^2}$.

§. 21. Haec igitur series aequalis statui debet isti:

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{1}{2} + \alpha i + \beta i^2 + \gamma i^3 + \delta i^4 + \varepsilon i^5 + \zeta i^6 + \eta i^7 + \text{etc.} \\
 \frac{4\partial\partial s}{\partial i^2} &= -8\alpha - 4.3.4\beta - 4.5.6\gamma - 4.7.8\delta - 4.9.10\varepsilon - 4.11.12\zeta - \text{etc.}
 \end{aligned}$$

vnde deducuntur sequentes determinaciones:

$$\begin{aligned}
 4. 1. 2\alpha + \frac{1}{2} &= 0; \\
 4. 3. 4\beta + 5\alpha &= 0; \\
 4. 5. 6\gamma + 5\beta + 12\alpha^2 &= 0; \\
 4. 7. 8\delta + 5\gamma + 24\alpha\beta + 8\alpha^3 &= 0; \\
 4. 9. 10\varepsilon + 5\delta + 24\alpha\gamma + 12\beta\beta + 24\alpha\alpha\beta &= 0. \\
 &\text{etc.}
 \end{aligned}$$

§. 22. Quoniam vero hae relationes multo magis sunt complicatae quam eae ad quas primo sumus perducti, istis potius inhaereamus earumque evolutionem sequenti modo suble-
vemus. Ponamus scilicet

$$\alpha = -\frac{A}{23}, \beta = +\frac{B}{25}, \gamma = -\frac{C}{27}, \delta = +\frac{D}{29}, \varepsilon = -\frac{E}{31}, \text{etc.}$$

vnde summatio nostra induet hanc formam:

$$T = \frac{1}{2} X - \frac{A}{23} \cdot \frac{\partial\partial X}{\partial x^2} + \frac{B}{25} \cdot \frac{\partial^4 X}{\partial x^4} - \frac{C}{27} \cdot \frac{\partial^6 X}{\partial x^6} + \frac{D}{29} \cdot \frac{\partial^8 X}{\partial x^8} - \text{etc.}$$

ac relationes pro his novis litteris sequenti modo se habebunt:

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{1.2}; \\
 B &= \frac{A}{1.2} - \frac{1}{1.2.4}; \\
 C &= \frac{B}{1.2} - \frac{A}{1.2.4} + \frac{1}{1.2.4.6}; \\
 D &= \frac{C}{1.2} - \frac{B}{1.2.4} + \frac{A}{1.2.4.6} - \frac{1}{1.2.4.6.8}; \\
 E &= \frac{D}{1.2} - \frac{C}{1.2.4} + \frac{B}{1.2.4.6} - \frac{A}{1.2.4.6.8} + \frac{1}{1.2.4.6.8.10}; \\
 &\text{etc.} \qquad \qquad \qquad \text{etc.}
 \end{aligned}$$

§. 23. Quo calculum istarum litterarum magis contrahamus atque adeo totum negotium ad numeros integros reducamus, ponamus porro $A = \frac{a}{1.2}$, $B = \frac{b}{1.2.4}$, $C = \frac{c}{1.2.4.6}$, etc. vt nostra summatio fiat

$$T = \frac{1}{2} X - \frac{a}{2^2 \cdot 1.2} \frac{\partial^2 x}{\partial x^2} + \frac{b}{2^3 \cdot 1.2.4} \frac{\partial^4 x}{\partial x^4} - \frac{c}{2^7 \cdot 1.2.4.6} \frac{\partial^6 x}{\partial x^6} + \text{etc.}$$

et nunc istae novae litterae per sequentes formulas commodissime determinabuntur:

$$a = \frac{2 \cdot 1}{1.2}, \text{ siue } a = 1;$$

$$b = \frac{4 \cdot 3}{1.2} a - \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1.2 \cdot 3 \cdot 4},$$

$$\text{siue } b = 6a - 1 = 5;$$

$$c = \frac{6 \cdot 5}{1.2} b - \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1.2 \cdot 3 \cdot 4} a + \frac{6 \cdot \dots \cdot 1}{1.2 \cdot \dots \cdot 6},$$

$$\text{siue } c = 15b - 15a + 1 = 61;$$

$$d = \frac{8 \cdot 7}{1.2} c - \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1.2 \cdot 3 \cdot 4} b + \frac{8 \cdot \dots \cdot 3}{1 \cdot \dots \cdot 6} a - \frac{8 \cdot \dots \cdot 1}{1 \cdot \dots \cdot 8},$$

$$\text{siue } d = 28c - 70b + 28a - 1 = 1385;$$

$$e = \frac{10 \cdot 9}{1.2} d - \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1.2 \cdot 3 \cdot 4} c + \frac{10 \cdot \dots \cdot 5}{1 \cdot \dots \cdot 6} b - \frac{10 \cdot \dots \cdot 3}{1 \cdot \dots \cdot 8} a + \frac{10 \cdot \dots \cdot 1}{1 \cdot \dots \cdot 10},$$

$$\text{siue } e = 45d - 210c + 210b - 45a + 1 = 50521;$$

$$f = \frac{12 \cdot 11}{1.2} e - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1.2 \cdot 3 \cdot 4} d + \frac{12 \cdot \dots \cdot 7}{1 \cdot \dots \cdot 6} c - \frac{12 \cdot \dots \cdot 5}{1 \cdot \dots \cdot 8} b + \frac{12 \cdot \dots \cdot 3}{1 \cdot \dots \cdot 10} a - \frac{12 \cdot \dots \cdot 1}{1 \cdot \dots \cdot 12};$$

$$\text{siue } f = 66 \cdot e - 495 \cdot d + 924 \cdot c - 495 \cdot b + 66 \cdot a - 1;$$

etc.

Mani-

Manifestum autem est coefficients harum formularum congruere cum iis qui in potestatibus binomii occurrunt, si modo alterni omittantur.

§. 24. Valoribus igitur harum litterarum a, b, c, d inuentis series ante allata dabit valorem litterae T , qui quouis casu erit certa functio ipsius x , ex qua, si loco x scribatur $x - \frac{1}{2}$, oriatur summa seriei propositae S . Veluti si fuerit $X = x^4$, haecque series summanda proponatur:

$$S = x^4 - (x+1)^4 + (x+2)^4 - (x+3)^4 + (x+4)^4 - \text{etc.}$$

ob $\frac{\partial^2 x}{\partial x^2} = 4 \cdot 3 x x$ et $\frac{\partial^4 x}{\partial x^4} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, altiora vero differentialia euanescentia, erit

$$T = \frac{1}{2} x^4 - \frac{3}{4} x x + \frac{5}{32}, \text{ hincque}$$

$$S = \frac{1}{4} (x - \frac{1}{2})^4 - \frac{3}{4} (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{5}{32}.$$

Hinc ergo sumto $x = 1$, vt series summanda sit

$$S = 1 - 2^4 + 3^4 - 4^4 + 5^4 - 6^4 + \text{etc.}$$

reperietur $S = 0$, vti aliunde constat. Alia exempla non subiungimus, quoniam olim iam copiose sunt tractata.

Problema II.

Si X vt ante fuerit functio quaecunque ipsius x , ex qua, dum loco x ordine scribantur valores $x+1, x+2, x+3, \text{etc.}$ nascantur functiones X', X'', X''' , inuenire summam huius seriei in infinitum excurrentis:

$$n^x X - n^{x+1} X' + n^{x+2} X'' - n^{x+3} X''' + n^{x+4} X'''' - \text{etc.}$$

Solutio.

§. 25. Ponatur huius seriei summa quaesita $n^x S$, vt sit

$$S = X - n X' + n^2 X'' - n^3 X''' + n^4 X'''' - \text{etc.}$$

H 2

Hic

Hic iam loco x scribatur $x+1$, ac reperietur

$$S' = X' - nX'' + n^2X''' - n^3X'''' + \text{etc.}$$

quae series ducta in n et priori addita praebet $S + nS' = X$.

Quare cum sit

$$S' = S + \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial^2 S}{1 \cdot 2 \partial x^2} + \frac{\partial^3 S}{1 \cdot 2 \cdot 3 \partial x^3} + \text{etc.}$$

habebitur ista aequatio:

$$(1+n)S + \frac{n \partial S}{\partial x} + \frac{n \partial^2 S}{2 \partial x^2} + \frac{n \partial^3 S}{6 \partial x^3} + \frac{n \partial^4 S}{24 \partial x^4} + \text{etc.} = X,$$

ex qua valorem litterae S erui oportet.

§. 26. Statuamus ergo pro S hanc seriem:

$$S = \alpha X + \frac{\beta \partial X}{\partial x} + \frac{\gamma \partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{\delta \partial^3 X}{\partial x^3} + \text{etc.}$$

et facis singulis substitutionibus obtinebimus:

$$\begin{aligned} (1+n)S &= (1+n)\alpha X + (1+n)\frac{\beta \partial X}{\partial x} + (1+n)\frac{\gamma \partial^2 X}{\partial x^2} + (1+n)\frac{\delta \partial^3 X}{\partial x^3} + (1+n)\frac{\varepsilon \partial^4 X}{\partial x^4} \\ \frac{n \partial S}{\partial x} &= n\alpha + n\beta + n\gamma + n\delta \\ \frac{n \partial^2 S}{2 \partial x^2} &= +\frac{1}{2}n\alpha + \frac{1}{2}n\beta + \frac{1}{2}n\gamma \\ \frac{n \partial^3 S}{6 \partial x^3} &= +\frac{1}{6}n\alpha + \frac{1}{6}n\beta \\ \frac{n \partial^4 S}{24 \partial x^4} &= +\frac{1}{24}n\alpha \\ \text{etc.} & \end{aligned}$$

quarum ferierum summa quia aequari debet ipsi X , hinc sequentes determinaciones resultabunt:

$$(n+1)\alpha = 1;$$

$$(n+1)\beta + n\alpha = 0;$$

$$(n+1)\gamma + n\beta + \frac{1}{2}n\alpha = 0;$$

$$(n+1)\delta + n\gamma + \frac{1}{2}n\beta + \frac{1}{6}n\alpha = 0;$$

$$(n+1)\varepsilon + n\delta + \frac{1}{2}n\gamma + \frac{1}{6}n\beta + \frac{1}{24}n\alpha = 0.$$

etc.

§. 27. Resolutio igitur harum aequalitatum nobis sup-
peditabit sequentes valores :

$$\alpha = \frac{1}{n+1};$$

$$\beta = -\frac{n}{(n+1)^2};$$

$$\gamma = \frac{n(n-1)}{2(n+1)^3};$$

$$\delta = -\frac{n(nn-4n+1)}{6(n+1)^4}.$$

etc.

Nimis autem molestum foret evolutionem harum formularum
ulterius proficere, quamobrem conueniet, loco horum coeffi-
cientium alios in calculum introducere, qui sint

$$\alpha = \frac{A}{n+1}, \beta = -\frac{B}{(n+1)^2}, \gamma = +\frac{C}{(n+1)^3}, \delta = -\frac{D}{(n+1)^4}, \text{ etc.}$$

ita ut series nostra pro S inuenta hanc induat formam:

$$S = \frac{A}{(n+1)} X - \frac{B}{(n+1)^2} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{C}{(n+1)^3} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{D}{(n+1)^4} \frac{\partial^3 X}{\partial x^3} + \text{ etc.}$$

§. 28. Nunc igitur istae nouae litterae A, B, C, D etc.
per sequentes formulas determinabuntur:

$$A = 1,$$

$$B = n A,$$

$$C = n B - \frac{1}{2} n (n+1) A,$$

$$D = n C - \frac{1}{2} n (n+1) B + \frac{1}{6} n (n+1)^2 A,$$

$$E = n D - \frac{1}{2} n (n+1) C + \frac{1}{6} n (n+1)^2 B - \frac{1}{24} n (n+1)^3 A, \text{ etc.}$$

vnde facilius iam colliguntur sequentes valores:

$$A = 1,$$

$$B = n,$$

$$C = \frac{1}{2} n (n-1),$$

$$D = \frac{1}{6} n (nn-4n+1),$$

$$E = \frac{1}{24} n (n^3 - 11nn + 11n - 1).$$

§. 29. Quo indolem horum numerorum A, B, C, D penitius perscrutemur, contemplemur istam seriem eandem literas inuoluentem:

$$s = A + Bt + Ctt + Dt^3 + \text{etc.}$$

ex qua secundum relationes ante inuentas formemus sequentes series:

$$\begin{aligned} s &= A + Bt + Ctt + Dt^3 + Et^4 + Ft^5 + \text{etc.} \\ -n s &= -nA - nBt - nCtt - nDt^3 - nEt^4 - nFt^5 - \text{etc.} \\ +\frac{1}{2}n(n+1)st &= \frac{1}{2}n(n+1)A + \frac{1}{2}n(n+1)Bt + \frac{1}{2}n(n+1)Ctt + \frac{1}{2}n(n+1)Dt^3 + \text{etc.} \\ -\frac{1}{6}n(n+1)^2st^2 &= -\frac{1}{6}n(n+1)^2A - \frac{1}{6}n(n+1)^2Bt - \frac{1}{6}n(n+1)^2Ctt - \text{etc.} \\ +\frac{1}{24}n(n+1)^3st^3 &= \frac{1}{24}n(n+1)^3A + \frac{1}{24}n(n+1)^3Bt + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

His igitur seriebus in unam summam collectis impetrabimus hanc aequationem:

$$s(1 - nt + \frac{1}{2}n(n+1)tt - \frac{1}{6}n(n+1)^2t^3 + \frac{1}{24}n(n+1)^3t^4 - \text{etc.}) = 1.$$

§. 30. Vt nunc hanc aequationem ad formam finitam reducamus, in subsidium vocemus hanc progressionem:

$$e^{-(n+1)t} = 1 - (n+1)t + \frac{1}{2}(n+1)^2tt - \frac{1}{6}(n+1)^3t^3 + \frac{1}{24}(n+1)^4t^4 - \text{etc.}$$

unde fit

$$\frac{e^{-(n+1)t} - 1}{n+1} = -t + \frac{1}{2}(n+1)tt - \frac{1}{6}(n+1)^2t^3 + \frac{1}{24}(n+1)^3t^4 - \text{etc.}$$

consequenter

$$\frac{n}{n+1}(e^{-(n+1)t} - 1) = -nt + \frac{1}{2}n(n+1)t^2 - \frac{1}{6}n(n+1)^2t^3 + \frac{1}{24}n(n+1)^3t^4 - \text{etc.}$$

Hinc igitur nanciscemur sequentem aequationem finitam:

$$s(1 + \frac{n}{n+1}(e^{-(n+1)t} - 1)) = s(\frac{1}{n+1} + \frac{n}{n+1}e^{-(n+1)t}) = 1.$$

Ex hac autem aequatione, si valor ipsius s per seriem eliciatur, ipsa

ipfa series assumpta prodire debet, ex qua idcirco nostrae litterae a, b, c, d innotescunt. Hinc igitur erit

$$e^{-(n+1)t} = \frac{1+n-s}{ns},$$

ideoque $-(n+1)t = l(1+n-s) - lns$ et differentiando
 $-(n+1) \partial t = -\frac{\partial s}{1+n-s} - \frac{\partial s}{s} = -\frac{(1+n)\partial s}{s(1+n-s)}$;

ex qua aequatione colligitur $s(1+n-s) = \frac{\partial s}{\partial t}$.

§. 31. Statuatur nunc $s = \frac{1}{2}(n+1) + v$, ut fiat

$$v = -\frac{1}{2}(n+1)A + Bt + Ctt + Dt^3 + \text{etc.}$$

eritque nostra aequatio $\frac{1}{2}(n+1)^2 - vv = \frac{\partial v}{\partial t}$. Ad calculi igitur compendium ponamus $\frac{1}{2}(n+1) = m$, sitque $A - \frac{1}{2}(n+1) = \Delta$, ut series nostra sit

$$v = \Delta + Bt + Ctt + Dt^3 + Et^4 + Ft^5 + Gt^6 + Ht^7 + \text{etc.}$$

tum vero habebimus:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = mm - vv, \text{ siue } \frac{\partial v}{\partial t} + vv = mm.$$

In hac ergo aequatione loco v seriem assumptam substituamus eritque

$$\frac{\partial v}{\partial t} = B + 2Ct + 3Dtt + 4Et^3 + 5Ft^4 + 6Gt^5 + \text{etc.}$$

$$vv = \Delta\Delta + 2\Delta B + 2\Delta C + 2\Delta D + 2\Delta E + 2\Delta F + \text{etc.}$$

$$+ BB + 2BC + 2BD + 2BE + \text{etc.}$$

$$+ CC + 2CD + \text{etc.}$$

quarum ergo serierum summa debet esse $= mm$, vnde deducuntur sequentes determinationes:

$$B + \Delta\Delta = mm;$$

$$\text{hinc } B = mm - \Delta\Delta;$$

$$2C + 2\Delta B = 0;$$

$$2C = -2\Delta B;$$

$$3D + 2\Delta C + BB = 0;$$

$$3D = -2\Delta C - BB;$$

$$4E + 2\Delta D + 2BC = 0;$$

$$4E = -2\Delta D - 2BC,$$

$$5F + 2\Delta E + 2BD + CC = 0;$$

$$5F = -2\Delta E - 2BD - CC.$$

etc.

etc.

§. 32.

§. 32. Cum iam posuerimus $\Delta = A - \frac{1}{2}(n+1) = A - m$,
 ob $A = 1$ erit $\Delta = 1 - m = \frac{1-n}{2}$. Retineamus autem lit-
 teram m in calculo, existente $m = \frac{1}{2}(n+1)$, ac reperiemus
 $B = n$, et quia est $-2\Delta = n-1$, formulae nostrae evadent

$$\begin{aligned} 2C &= (n-1)B; \\ 3D &= (n-1)C - BB; \\ 4E &= (n-1)D - 2BC; \\ 5F &= (n-1)E - 2BD - CC; \\ 6G &= (n-1)F - 2BE - 2CD. \end{aligned}$$

etc.

haeque formulae ad calculum magis accommodatae videntur
 quam superiores §. 28. quia hic occurrit minor terminorum
 numerus atque etiam factores sunt simpliciores. Ex his igitur
 valores supra inchoatos ulterius prosequemur:

$$\begin{aligned} A &= 1; \\ B &= n; \\ C &= \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}; \\ D &= \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}; \\ E &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}; \\ F &= \frac{n(n^2 - 26n^3 + 66n^2 - 26n + 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}; \\ G &= \frac{n(n^5 - 57n^4 + 302n^3 - 302n^2 + 57n - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}. \end{aligned}$$

§. 33. Hae expressiones eo magis sunt notatu dignae,
 quod coefficients in numeratoribus ad formulas generales re-
 duci possunt; namque coefficients terminorum secundorum,
 qui sunt 0, 0, 1, 4, 11, 26, 57, 120, etc. nascuntur ex for-
 ma generali $2^{n-1} - 1$, coefficients vero terminorum tertio-
 rum,

rum, qui sunt 0, 0, 0, 1, 11, 66, 302, etc. oriuntur ex formula generali $3^{z-1} - 2^{z-1} z + \frac{z(z-1)}{1 \cdot 2}$; simili modo terminorum quatorum, qui sunt 0, 0, 0, 0, 1, 26, 302, etc. terminus generalis est

$$4^{z-1} - 3^{z-1} \cdot z + 2^{z-1} \cdot \frac{z(z-1)}{1 \cdot 2} - \frac{z(z-1)(z-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3};$$

quintorum vero terminorum coefficientes, qui sunt 0, 0, 0, 0, 0, 1, 57, etc. oriuntur ex forma generali hac:

$$5^{z-1} - 4^{z-1} \cdot z + 3^{z-1} \cdot \frac{z(z-1)}{1 \cdot 2} - 2^{z-1} \cdot \frac{z(z-1)(z-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{z(z-1)(z-2)(z-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4};$$

vnde iam satis clarum est, quomodo pro sequentibus terminis formulae generales constitui debeant.

§. 34. Inuentis igitur secundum has regulas valoribus litterarum A, B, C, D, etc. seriei propositae infinitae

$$n^x X - n^{x+1} X' + n^{x+2} X'' - n^{x+3} X''' + \text{etc.}$$

summa erit

$$n^x \left(\frac{A}{n+1} X - \frac{B}{(n+1)^2} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{C}{(n+1)^3} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} - \frac{D}{(n+1)^4} \frac{\partial^3 X}{\partial x^3} + \text{etc.} \right).$$

Ita si fuerit $X = 1$ et series summanda

$$n^x - n^{x+1} + n^{x+2} - n^{x+3} + n^{x+4} - \text{etc.}$$

ob $\frac{\partial X}{\partial x} = 0, \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = 0$, erit summa quaesita $= n^x \frac{A}{n+1} = \frac{n^x}{n+1}$.

At si sumatur $X = x$, vt series summanda fit

$$n^x \cdot x - n^{x+1} (x+1) + n^{x+2} (x+2) - n^{x+3} (x+3) + \text{etc.}$$

ob $\frac{\partial X}{\partial x} = 1$, sequentia vero differentialia $= 0$, erit summa quaesita

$$= n^x \left(\frac{Ax}{n+1} - \frac{B}{(n+1)^2} \right) = n^x \left(\frac{x}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right).$$

Hinc ergo si sumatur $x = 1$, huius seriei:

$$n - 2n^2 + 3n^3 - 4n^4 + 5n^5 - 6n^6 + \text{etc.}$$

summa erit $= \frac{n}{(n+1)^2}$, cuius fractionis euolutio manifesto producit istam seriem. Plura exempla adiungere superfluum foret, quia hoc argumentum iam alias fusius est tractatum.

Problema III.

Si ut ante X denotet functionem quamcunque ipsius x, quae loco x scribendo successiue x + 1, x + 2, x + 3, abeat in X', X'', X''', ac proponatur sequens series infinita cum progressionem hypergeometrica commista:

$$\begin{array}{r}
 1. \ 2. \ 3. \ 4. \ \dots \ x. \ X \\
 - \ 1. \ 2. \ 3. \ 4. \ \dots \ (x+1) \ X' \\
 + \ 1. \ 2. \ 3. \ 4. \ \dots \ (x+2) \ X'' \\
 - \ \text{etc.}
 \end{array}$$

eius summam inuestigare.

Solutio.

§. 35. Statuatur ista summa quaesita $= 1. 2. 3. \dots x S$, ita ut tantum functionem S indagari oporteat, eritque $S = X - (x+1)X' + (x+1)(x+2)X'' - (x+1)(x+2)(x+3)X''' + \text{etc.}$

Hinc ergo si loco x vbique scribamus $x + 1$, fiet

$$\begin{aligned}
 S' = X' - (x+2)X'' + (x+2)(x+3)X''' \\
 - (x+2)(x+3)(x+4)X'''' + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

quae posterior series per $x + 1$ multiplicata ac priori adiecta producet istam aequationem: $S + (x + 1)S' = X$, ex qua ergo valorem ipsius S definire oportet.

§. 36. Hic autem pro S talem seriem per differentialia ipsius X procedentem fingere non licet ut supra, propterea quod functio

$$S' = S + \frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial \partial S}{1. 2. \partial x^2} + \frac{\partial^3 S}{1. 2. 3. \partial x^3} + \text{etc.}$$

per factorem variabilem $x + 1$ est multiplicata, quamobrem pro S assumamus seriem generalem $p + q + r + s + t + \text{etc.}$ quae

quae ita sit comparata, ut differentiale cuiusque partis cadat in locum sequentem. Cum igitur nostra aequatio sit

$$(x+2)S + (x+1)\frac{\partial s}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial \partial s}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial^3 s}{6\partial x^3} + \text{etc.} = X,$$

hic loco S eiusque differentialium secundum legem praescriptam series assumpta substituatur, ac pervenietur ad hanc aequationem:

$$\begin{aligned} X = & (x+2)p + (x+2)q + (x+2)r + (x+2)s + (x+2)t + (x+2)u + \text{etc.} \\ & + (x+1)\frac{\partial p}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial q}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial r}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial s}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial t}{\partial x} + \text{etc.} \\ & + (x+1)\frac{\partial \partial p}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial \partial q}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial \partial r}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial \partial s}{2\partial x^2} + \text{etc.} \\ & + (x+1)\frac{\partial^3 p}{6\partial x^3} + (x+1)\frac{\partial^3 q}{6\partial x^3} + (x+1)\frac{\partial^3 r}{6\partial x^3} + \text{etc.} \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

hicque primum statuatur $X = (x+2)p$, ita ut sit $p = \frac{x}{x+2}$, tum vero pro reliquis habebuntur sequentes aequationes:

$$(x+2)q + (x+1)\frac{\partial p}{\partial x} = 0,$$

$$(x+2)r + (x+1)\frac{\partial q}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial \partial p}{2\partial x^2} = 0,$$

$$(x+2)s + (x+1)\frac{\partial r}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial \partial q}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial^3 p}{6\partial x^3} = 0,$$

$$(x+2)t + (x+1)\frac{\partial s}{\partial x} + (x+1)\frac{\partial \partial r}{2\partial x^2} + (x+1)\frac{\partial^3 q}{6\partial x^3} + (x+1)\frac{d^4 p}{24\partial x^4} = 0.$$

etc.

§. 37. Ex his igitur aequationibus haud difficile erit valores singularum litterarum q, r, s, t per praecedentes iam inuentas definire. In genere autem haec evolutio mox ad formulas nimis complicatas perduceret, namque cum sit $p = \frac{x}{x+2}$,

erit $\partial p = \frac{\partial x}{x+2} - \frac{x \partial x}{(x+2)^2}$, unde colligitur

$$(x+2)q + \frac{(x+1)}{x+2} \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{(x+1)x}{(x+2)^2} = 0,$$

hincque

$$q = -\frac{(x+1)}{(x+2)^2} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{x+1}{(x+2)^2};$$

I 2

cuius

cuius ergo differentiale non solum denuo sumi deberet, sed etiam differentio-differentiale ipsius p , ut inde deriuetur valor ipsius r . Interim tamen hi valores in genere commodius exprimuntur sequenti modo:

$$\begin{aligned} q &= - \frac{(x+1)}{(x+2) \partial x} \cdot \partial p, \\ r &= - \frac{(x+1)}{(x+2) \partial x} \partial \left(q + \frac{\partial p}{2 \partial x} \right), \\ s &= - \frac{(x+1)}{(x+2) \partial x} \partial \left(r + \frac{\partial q}{2 \partial x} + \frac{\partial \partial p}{6 \partial x^2} \right), \\ t &= - \frac{(x+1)}{(x+2) \partial x} \partial \left(s + \frac{\partial r}{2 \partial x} + \frac{\partial \partial q}{6 \partial x^2} + \frac{\partial^3 p}{24 \partial x^3} \right), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

§. 38. In genere autem has formulas eoluere non est opus, quia quouis casu proposito eolutio haud difficulter institui poterit, quod vnico casu ostendisse sufficiet. Sumatur igitur $X = 1$ eruntque etiam omnes valores inde deriuati X' , X'' , etc. vnitati aequales. Ac primo hoc casu habebitur $p = \frac{1}{x+2}$, cuius ergo differentialia erunt

$$\frac{\partial p}{\partial x} = - \frac{1}{(x+2)^2}, \quad \frac{\partial \partial p}{\partial x^2} = \frac{2}{(x+2)^3}, \quad \frac{\partial^3 p}{\partial x^3} = - \frac{6}{(x+2)^4}, \quad \text{etc.}$$

hinc igitur primo colligimus $q = + \frac{x+1}{(x+2)^3}$, qui valor resolvatur in has partes: $q = \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{(x+2)^3}$, vnde fiet

$$\begin{aligned} \frac{\partial q}{\partial x} &= - \frac{2}{(x+2)^3} + \frac{3}{(x+2)^4} \quad \text{et} \\ \frac{\partial \partial q}{\partial x^2} &= \frac{6}{(x+2)^4} - \frac{12}{(x+2)^5}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Ex his igitur porro fit

$$r = - \frac{x+1}{x+2} \left(- \frac{1}{(x+2)^3} + \frac{3}{(x+2)^4} \right).$$

Cum nunc fit $-\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = -1 + \frac{1}{x+2}$, fiet

$$r = + \frac{1}{(x+2)^3} - \frac{4}{(x+2)^4} + \frac{3}{(x+2)^5},$$

vnde fit

$$\frac{\partial r}{\partial x} = - \frac{3}{(x+2)^4} + \frac{16}{(x+2)^5} - \frac{15}{(x+2)^6}$$

ex quo valore colligitur

$$s = -\frac{x+1}{x+2} \left(-\frac{1}{(x+2)^2} + \frac{10}{(x+2)^3} - \frac{15}{(x+2)^4} \right).$$

His igitur valoribus inuentis seriei infinitae

$$\begin{array}{r} 1. \ 2. \ 3. \ 4. \ . \ . \ . \ . \ x \\ -1. \ 2. \ 3. \ 4. \ . \ . \ . \ . \ (x+1) \\ +1. \ 2. \ 3. \ 4. \ . \ . \ . \ . \ (x+2) \\ -1. \ 2. \ 3. \ 4. \ . \ . \ . \ . \ (x+3) \end{array}$$

etc.

summa erit

$$1. \ 2. \ 3. \ . \ . \ . \ x (p + q + r + s + \text{etc.}).$$

§. 39. Sumamus hic pro casu specialissimo $x = 0$, vt summanda proponatur haec series hypergeometrica $1 - 1 + 2 - 6 + 24 - 120 + \text{etc.}$, pro qua ergo erit $1 x = 1$, tum vero reperietur

$$p = \frac{1}{2}, \ q = \frac{1}{8}, \ r = -\frac{1}{32}, \ s = -\frac{1}{128}.$$

Calculo ergo hucusque producto summa desiderata prodit

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{32} - \frac{1}{128} = \frac{75}{128} = 0,5859,$$

quae non multum discrepat ab ea quam olim omni studio elicui.

§. 40. Sumamus nunc $x = 1$, vt summanda sit haec series $1 - 2 + 6 - 24 + 120 - \text{etc.}$, eritque $1 x = 1$, tum vero $p = \frac{1}{3}, \ q = \frac{2}{27}, \ r = 0, \ s = -\frac{4}{729}$. Hinc ergo erit nostra summa $\frac{1}{3} + \frac{2}{27} - \frac{4}{729} = \frac{293}{729} = 0,40192$, quae summa cum praecedente fati exacte conspirat, quoniam hinc ambae series iunctae prodeunt 0,9878: prodire enim deberet unitas; vnde patet, si ulterius seriem p, q, r, s effemus profecuti, tum etiam ad veritatem multo propius accessissemus.