

SOLUTIO PROBLEMATIS FERMATIANI

DE DUOBUS NUMERIS,
QUORUM SUMMA SIT QUADRATUM,
QUADRATORUM VERO SUMMA BIQUADRATUM,
AD MENTEM ILL. *LAGRANGE* ADORNATA

AUCTORE

L. EULER O.

Conventui exhib. die 5 Junii 1780.

I. 1. In solutionibus hujus problematis, quae hactenus passim in medium sunt allatae, Ill. *La Grange* id potissimum merito reprehabet, quod nimium casui et vagis tentaminibus tribuatur, unde ut certi esse nequeamus, omnesne solutiones, atque adeo simplicissimas, hoc modo inventas esse. Huic igitur desiderato sequenti analysi satisfactum iri confido.

I. 2. Sint x et y bini numeri quaesiti, ita ut esse debet $x + y = \square$ et $xx + yy = \square^2$, si pro conditione posteriore sumamus $x = pp - qq$ et $y = 2pq$, fiet $xx + yy = (pp + qq)^2$. Quod si porro statuatur $p = rr - ss$ et $q = 2rs$, fiet $pp + qq = (rr - ss)^2$, ideoque $xx + yy = (rr - ss)^4$, uti requiritur. Hinc autem erit $x = r^4 - 6rrss + s^4$ et $y = 4rs(rr - ss)$.

1 *

§. 3. Pro conditione priore ergo summa numerorum erit

$$x + y = r^4 + 4r^3s - 6rrss - 4rs^3 + s^4,$$

quae formula idecirco quadratum est efficienda. Hunc in finem, quidquam tentamini tribuatur, istam expressionem sub hac formam repreaesento :

$$x + y = (rr + 2rs - ss)^2 - 8rrss,$$

ita ut jam talis formula: AA - 2BB quadratum reddi debeat, quod fit sumendo A = tt + 2uu et B = 2tu; tum enim fiet

$$AA - 2BB = (tt - 2uu)^2.$$

§. 4. Nunc loco A et B scribamus nostros valores et habebimus $rr + 2rs - ss = tt + 2uu$ et $2rs = 2tu$, hocque modo summa numerorum nostrorum erit $x + y = (tt - 2uu)^2$, ideoque jam ambabas conditionibus erit satisfactum, dummodo formulae modo inventae fuerint expeditae.

§. 5. Quoniam autem haec duo producta rs et tu inter se aequalia esse debent, loco litterae s hic tuto unitatem assumere licet. Quamquam enim tum pro r fractiones sint proditurae, id solutioni neutiquam officit, quia solutio in fractis inventa facile ad integrlos reducitur. Hoc igitur modo erit $r = tu$; qui valor in altera aequatione substitutus dabit $tluu + 2tu - 1 = tt + 2uu$, siveque tum negotium reductum est ad justam relationem inter t et u invniendam. Sive ergo t per u, vel u per t, definire velimus, resolutio aequationis quadraticae binas sequentes suppeditabit formulas:

$$t = \frac{u + \sqrt{2u^4 - 1}}{1 - uu} \text{ et } u = \frac{t + \sqrt{t^4 - 2}}{2 - tt}.$$

Quin etiam hinc statim valores radicalium pro sequenti usu sponte produnt, ut extractione radicis non amplius indigeamus. Ex prima enim erit $\sqrt{2u^4 - 1} = t(1 - uu) - u$; ex altera vero $\sqrt{t^4 - 2} = u(2 - tt) - t$. Hic autem commode usu venit, utraque formula geminos praebeat valores.

§. 6. Incipiamus a formula priore, quia casus $u = 1$ statim in oculos incurrit. Quoniam vero hoc casu denominator $1 - uu$

rum erit evanescere accurrendum est ad remedium notissimum, quo ponni solet
inem, nomen denotante ω quantitate in evanescentem, ita ut ejus po-
tentes aliores tuto rejicere liceat. Hinc igitur erit $2u^4 - 2 - 8\omega$
ideoque $\sqrt{2u^4 - 1} = \sqrt{1 - 8\omega} = 1 - 4\omega$ et $1 - uu = 2\omega$,
hincque colligitur $t = \frac{3}{2}$, qui valor in altera formula substitutus dat
 $t = \frac{113}{84}$.

§. 7. Progrediamur nunc ad alteram aequationem, pro qua
jam novimus valores: $u = 1$, et $t = \frac{3}{2}$, et quia geminos valores com-
pliciunt, novum valorem pro u elicimus, scil. $u = -13$. Hunc
valorem inferamus in priorem formulam, pro qua jam novimus alte-
rum, valorem esse $t = \frac{3}{2}$, ex quo innoscit

$$\sqrt{2u^4 - 1} = t(i - uu) - u,$$

unde ob $u = -13$ et $t = \frac{3}{2}$, erit $\sqrt{2u^4 - 1} = -239$. Nunc
vero haec ipsa aequatio nobis insuper praebet novum valorem pro
 t , scil. $t = -\frac{113}{84}$.

§. 8. Simili modo istum valorem inferamus in alteram ae-
quationem, et quia erat $u = -239$, inde deducimus

$$\sqrt{t^4 - 2} = u(2 - tt) - t = -\frac{311485}{7656},$$

quo valore adhibito altera radix nobis nobis dabit novum valorem pro
 u , scil. $u = \frac{301993}{1343}$. Quod si denuo iste valor in priore formula as-
sumatur, pro t iterum novum adipiscimur valorem, sicque quo-
unque libuerit facile progredi licebit. Mox autem, ob numeros im-
mensos, laborem abrumpere cogemur.

§. 9. Vis igitur istius novae methodi in hoc consistit, quod
singulis valoribus ipsius t gemini valores ipsius u , eodemque modo
singulis ipsius u gemini valores ipsius t respondeant, quos ergo,
quoque sumus progressi, hic conspectui exhibeamus

$$u = 1; t = \frac{3}{2},$$

$$u = -13; t = -\frac{113}{84},$$

$$u = \frac{301993}{1343}.$$

quorum valorum quilibet cum binis adjacentibus combinari potest.
Ex talibus autem binis valoribus ipsi numeri quaesiti x et y modo determinantur

$$x = t^4 u^4 - 6ttuu + 1$$

$$y = 4tu(ttuu - 1).$$

Facile autem perspicitur hoc modo omnes plane solutiones possibles necessario prodire debere.

§. 10. Hic imprimis notatu dignum est, quod valores litteris t et u successive inventi egregio ordine progrediantur, ut ex singulis facile sequentes definiri queant. Ita si habeantur quicunque valores pro t et u , qui formulae $t = \frac{u \pm \sqrt{2u^4 - 1}}{1 - uu}$ satisfacient, cum sit $\sqrt{2u^4 - 1} = t(1 - uu) - u$, ob signum radicale ambiguum insuper aliis valor pro t eruetur, quem si ponamus $= t'$, erit quoque $t'(1 - uu) = 2u - t(1 - uu)$, ideoque $t' = \frac{2u}{1 - uu} - t$.

§. 11. Eodem modo ex iisdem valoribus t et u cogniti per alteram formulam $u = \frac{t \pm \sqrt{t^4 - 2}}{2 - tt}$, ob $\sqrt{t^4 - 2} = u(2 - tt) -$ alias valor pro u elici poterit, qui si ponatur $= u'$, erit

$$u'(2 - tt) = 2t - u(2 - tt), \text{ ideoque } u' = \frac{2t}{2 - tt} - u.$$

Hic valores cum sint cogniti, per utramque formulam denuo alii noterui poterunt, qui si ordine designentur per t'' , u'' ; t''' , u''' ; et ob $t' = \frac{2u}{1 - uu} - t$ et $u' = \frac{2t}{2 - tt} - u$, simili modo habebimus $t'' = \frac{2u'}{1 - u'u'} - t'$ et $u'' = \frac{2t'}{2 - t't'} - u'$, tum vero $t''' = \frac{2u''}{1 - u''u''} - t''$ et $u''' = \frac{2t''}{2 - t''t''} - u''$; et ita porro.

